30; P 192

Lehrbuch der Symptomatologie

Band XIV

HE
14
IGW

Inhaltsverzeichnis

B

Kap III
5) Zerfall der Radioisotope (Fortsetzung) - 1 -
6) Halbwertszeiten s. 8.
7) Elementarteilchen s. 17

Kap IV Organische Naturstoffe - 40 -
1.) Organismen s. 40.
2) Die geistige Evolution der Lebensformen s. 55
3) allgemeine Eigenschaften des Lebensprozesses s. 66
4) Komplexe Koordinationen s. 145
5.) die zonische Aktivität der komplexen Verbindungen s. 236
6) Metabolismus der empfindenden Elemente s. 333

Kap IX Symmetrie in Naturgebilden - 248 -
1.) Kristallsymmetrien und Kristallgitter s. 248
2) Flächensymmetrien und Spiralgitter s. 249
3) Das symmetrische Raumausfüllproblem 273
4 Dynamik der Koordinationsformen 387

Kap V (Naturgesetze)
1) die mechanischen Eigenschaften der Spiralgitter s. 310
3. die Ordnung des Weltmeeres s. 322
4 historische Theoreme räumlich projizierter Kristallgitter s. 324

Kap I 7) Evolution der Populationen - 360 -
(Bd IV)

B

Kap III

5.) Zerfall der Radioisotope (Fortsetzung)

In diesem Zusammenhang der Zerfälle der bekannten Radioisotopen bedeutet die Bezeichnung i.ü., daß sich ein Übergang zwischen zwei benachbarten Gitterstrukturen abspielt. Die Dimensionierung a, D und d der Halbwertzeiten bedeutet Jahre, Tage und Stunden.

Aus dem Zerfallsschema der Elemente $Z > 83$ geht hervor, daß die Zerfallsreihen das $4n$ und $4n+2$ sind, welche die natürliche Radioaktivität bestimmen, nicht so einfach verlaufen wie ohne die Erfahrung verschiedener Isotope anzunehmen war. Denn neben dem reinen α-Zerfall kommt es bei anderen

Isotopen zu reinen β^- = Prozessen und zum K = Einfang, wodurch sich die Zerfallsreihen verzweigen und in einander übergehen. Bemerkenswert ist die β^- = Aktivität des Pu^{241}, dem schließlich mit dem Element $Z = 95$ entstehen. Tatsächlich können die Isotope dieses als Amerikium = Am bezeichneten Elementes nachgewiesen werden. Für den Zerfall des Am gilt nach den vorliegenden Ergebnissen:

Am :	238	(K	1,5 h)
	239	(K (≈ 100%) + γ α (≈ 0,1%),	12 h)
	240	(K γ +	53 h)
	241	(α γ	490 a)
	242	(β^-	17 h)
	242	(α (≈ 0,2%)	≈ 400 a)

Das durch Neutroneneinfang entstehende isomere Isotop Am^{242} zeigt einfache

neue β^- = Aktivität, die nach dem Gesetz des β^- = Zerfalls zu dem Element $Z = 96$ führen müßte. Auch die Radioisotopen dieses als Cäsium = Cm bezeichneten Elementes sind nachweisbar. Für ihren Zerfall gilt:

Cm :	238	(α	≈ 2,5 h)
	240	(α	26,8 D)
	241	(K	55 D)
	242	(α	150 D)

11.5.62 Aus den Kernumsetzungen, insbesondere durch den Neutroneneinfang, sind die Bindungsenergien der Atomkerne zu berechnen bekannt. Im Folgenden werden die gemessenen Bindungsenergien in MeV für die Isotopen von H bis Fe zusammengestellt. Es gilt, wenn jeweils für das betreffende Element A (ΔE) die Bindungsener-

Sie für das Isotop A ist:

H:	1 (0),	B:	9 (55,96)
	2 (2,18)		10 (64,29)
	3 (8,33)		11 (75,71)
He:	3 (7,60)		12 (78,28)
	4 (28,11)		13 (85,01)
	5 (27,30)	C:	10 (59.05)
	6 (28,90)		11 (72.99)
Li:	5 (26.64)		12 (91.66)
	6 (31,81)		13 (94,54)
	7 (38,96)		14 (104,70)
	8 (40,94)		15 (104,79)
Be:	6 (26,47)	N:	12 (72.78)
	7 (37,33)		13 (93.58)
	8 (56.17)		14 (104,10)
	9 (57,80)		15 (114,85)
	10 (64,49)		16 (121,66)
	11 (62,62)		16 (117,47)
			17 (122,99)

O:	14 (98,14)	Na:	21 (163,00)
	15 (111,39)		22 (174,66)
	16 (126,96)		23 (186,44)
	17 (131,08)		24 (193,52)
	18 (139,02)		25 (202,57)
	19 (138,95)	Mg:	22 (168.05)
F:	16 (109,92)		23 (181.94)
	17 (127.54)		24 (197,52)
	18 (136,78)		25 (204,52)
	19 (146,95)		26 (216.56)
	20 (155,54)		27 (222,07)
	20 (150,88)	Al:	25 (199.77)
	21 (162,27)		26 (212,92)
Ne:	18 (131.47)		27 (224,02)
	19 (143,12)		28 (231.96)
	20 (159,85)		29 (241,20)
	21 (167,35)		30 (243,83)
	22 (176,77)	Si:	27 (218,62)
	23 (182,42)		28 (234,66)
			29 (242,97)
			30 (254,44)
			31 (259,96)
			32 (269,48)

P:	29 (237,28)	Ar:	38 (326,49)
	30 (249,87)		39 (333,40)
	31 (260,98)		40 (341,62)
	32 (270,78)		41 (348,62)
	33 (279,18)	K:	37 (309,05)
S:	31 (255,01)		38 (320,62)
	32 (271,71)		39 (333,39)
	33 (280,85)		40 (340,49)
	34 (291,86)	Ca:	40 (340,40)
	35 (298,59)		42 (360,93)
	36 (307,64)		43 (368,12)
Cl:	33 (274,51)		45 (388,74)
	34 (288,32)	Sc:	45 (389,02)
	35 (297,96)	Ti:	46 (397,32)
	36 (306,15)		47 (406,93)
	37 (315,67)		48 (416,73)
	38 (320,72)		49 (423,65)
	39 (330,52)		50 (434,28)
Ar:	35 (291,32)		51 (445,76)
	36 (306,14)	V:	51 (445,94)
	37 (314,73)		

Cr:	51 (444,91)	Mn:	55 (478,33)
	52 (455,08)	Fe:	54 (469,27)
	53 (463,39)		56 (486,08)
			57 (494,20)

Für alle diese Isotopen sind zugleich die Massendefekte Δm gemäß $A - M = \Delta m$ aus den massenspektroskopisch gemessenen Atommassen M bekannt. Die Äquivalenzprinzipkonstante des $\Delta E, \Delta m$-Diagrammes liefert unmittelbar für alle diese Bindungsenergien und Massendefekte $\Delta E \sim \Delta m$. Wird Δm in [kg] und mit $1\,MeV = 10^6\,eV$ sowie $1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ [Wattsec] in Wattsekunden ausgedrückt, dann folgt für den Proportionalitätsfaktor $9 \cdot 10^{16}$ also $\Delta E = 9 \cdot 10^{16} \cdot \Delta m$. Aus Dimensionsüberlegungen folgt auch die rechte Seite dieser Beziehung

Einheit ist Watsec = kg · $\frac{m^2}{sec^2}$
erscheinen, d.h. $q \cdot 10^{16} = \frac{\Delta E}{\Delta m}$ hat
die Dimension eines Ge-
schwindigkeitsquadrats. Für die
Lichtgeschwindigkeit gilt weiter
$c = 3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{sec}\right]$, also ist
$q \cdot 10^{16} \left[\frac{m^2}{sec^2}\right] = c^2$. Die Er-
fahrungstatsachen der Bindungs-
energien und Massendefekte inner-
halb der Kernreaktionsketten liefern
also für diese Größen die empirische
Beziehung $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ als eine Ent-
sprechungsäquivalenz.

6.) Höhenstrahlung (12.5.62)

Alle radioaktiven Prozesse verursachen
eine Ionisation der umgebenden Luft, was
auf die Charakter der emittierten Kor-
puskularstrahlungen zurückgeht. Auch
bei der Absorption von γ-Quanten

kommt es zur Bildung eines Photoeffektes
zu derartigen Ionisationen. Die Stärke
dieser Ionisation ist ein Maß
baren Maß für die Intensität des
radioaktiven Zerfalls, d.h. wenn
überhaupt keine radioaktive
~~Ionisation~~ Emission vorliegt, kann
auch ~~überhaupt~~ keine Ionisa-
tion erscheinen. Tatsächlich wird
aber immer eine solche Ionisa-
tion beobachtet. Die Radioisotopen
sind ~~gibt~~ überall im Gestein verbreitet
~~daß die~~ eine ständige Ionisation dürfte
die verursacht werden kann, doch
müßte dann die Ionisation
mit wachsendem Abstand von der Erd-
oberfläche abnehmen. Wird ein Mes-
instrument zur Feststellung des Ioni-
sationsgrades in verschiedene Höhen
gebracht, so zeigt sich ein Anstieg

der Ionisation bis zu $1{,}7 \cdot 10^4$ [m] über dem Meeresspiegel und danach ein langsames Abnehmen. Hieraus folgt, daß die ionisierende Ursache nicht allein auf die natürlichen Radioisotopen im festen zurückgehen kann. Weitere Beobachtungen in der Nebelkammer zeigen, daß die Strahlung, von welcher die Ionisation verursacht wird, Korpuskularer Natur sein muß und in Koinzidenz geschaltete Zählrohranordnungen liefern den Nachweis, daß diese Korpuskularstrahlung für jeden Punkt der Erdoberfläche bis zum Zenit kommt. Die Strahlungskorpuskeln sind sehr energiereich und können in der Tiefsee ebenso nachgewiesen werden wie in verhältnismäßig großer Tiefe unter der Erdoberfläche. Wie ein in Koinzidenz

geschaltetes Zählrohranordnung mit einem Raketenaufstieg durch die Erdatmosphäre geschossen, dann zeigt sich eine Anordnung der Strahlungsintensität bis auf das dreifache (bezogen auf die Intensität in Meereshöhe) in $1{,}7 \cdot 10^4$ [m] dann danach fällt diese Intensität ab bis $5{,}5 \cdot 10^4$ [m] Höhe erreicht wurde sind. Jenseits dieser Höhe bleibt die Intensität konstant. Diese Beobachtungen zeigen, daß aus dem Weltraum eine Primärstrahlung in die Atmosphäre eindringt und in dieser ionisierende Sekundärprozesse auslöst die in $5{,}5 \cdot 10^4$ [m] beginnen und von exponentiellen Verlauf der Luftdichte abhängen. Ihr Maximum muß dann bei $1{,}7 \cdot 10^4$ [m] liegen.

Die Primär-Komponente dieser Höhen-
strahlung besteht aus Protonen
α-Partikeln und schweren Kernen.
Innerhalb kurzer gerechnet die Primär-
strahlung in zwei Komponenten
nämlich einer solchen die vom
Sonnenraum abhängt, also einer
die ihren Ursprung auf der
Sonne hat und einer aus dem
weltraum Komponente. Die Sonnen-
Komponente besteht aus schweren
Kernen während die p- und α-
Strahlen vorwiegend weltraumkompo-
nente d. Komponente. Werden die Zähl-
rohrgruppe in Hessgeräten mon-
tiert, die außerhalb der irdischen
Atmosphäre gradiieren dann gezeig
sich, daß diese Weltraumkomponente
sowohl von der auf die Erdoberfläche
als auch von der Sonne in Raum

und von der Zeit (räumlich) ist.
Es gibt Radius Vorzugsrichtung im Raum
die auf eine Abschirmungsquelle schließen
lässe. Diese primäre Weltraum-
Komponente scheint vielmehr
den physischen Raum völlig isotrop
zu durchsetzen. Ein weiteres Charak-
teristikum dieser Komponente ist die
außerordentlich hohe Energie ihrer
Abschirmungs-Korpuskeln, welche die
Energien der von den energiereich-
sten Kernprozessen emittierten
Korpuskeln um mehrere Zehner-
potenzen übertreffen. Beobachtun-
gen der in der Atmosphäre verlaufen-
den Sekundärprozesse müssen also
Aufschluß über die Wechselwirkun-
gen zwischen Kernbausteinen
und extrem energiereichen Kern-
bausteinen geben. Abschirmungs-

Versuche im Zusammenhang mit Zählrohrmessgeräten in Höhenflügen = schaltung liefern zunächst die Aussage, dass die sekundäre Höhenstrahlung an der Erdoberfläche aus zwei völlig durchdringungsfähigen Komponenten und einer wesentlich schwächeren Komponente besteht die bereits von zwei 10 cm starken Pb = Platten abgeschirmt wird.

15.5.62 Untersuchungen mit Messgeräten die oberhalb der irdischen Atmosphäre stationiert sind führen zu dem Ergebnis, dass die Sonnenkomponente der Höhenstrahlung nicht nur aus positiven geladenen Kernen sondern auch aus leichten Kernen, insbesondere Protonen, besteht. Diese leichten Kerne werden vom erdmagnetischen Feld wegen ihrer Ionisation und ihres

verhältnismäßig geringen Energie nach den Gesetzen der Elektrodynamik abgelenkt und von diesem Feld eingefangen. Auf diese Weise entsteht ein die Erde umgebender Strahlungsgürtel der in ca 10^6 [m] Höhe über der Erdoberfläche beginnt und in ca 4×10^7 [m] noch nachweisbar ist. In der Nähe der magnetischen Pole können besonders intensive ~~Kreis~~ ~~Strahlen~~ mit den Ausläufern der Atmosphäre in Wechselwirkung treten, wodurch es zu Polarlichterscheinungen kommt. Für die schweren Kerne der Sonnenkomponente werden wegen ihrer höheren Rigidität die Energie schwächer abgelenkt. Sind daher als schwache Sonnenkomponente der Höhen-

Strahlung in Erscheinung. Bei der wesentlich energiereicheren Höhenstrahlung laufen nun die Sekundärprozesse in der Atmosphäre in der gut leitenden Oberfläche orthogonaler Vorzugsrichtung, während die Primär Korpuskeln völlig isotrop den physischen Raum durchsetzt. Intensitätsschwankungen der Primär Korpuskeln werden über die Energie der Korpuskeln dieser Korpuskeln, die gesamte irdische Atmosphäre mit auf den Intensitätsgang der Strahlungskorpuskeln wie eine 10 [m.] starke Wasserschicht. Da sie einen 10^3 [m.] Wasserstoff mit Tiefseeboden auch noch Strahlungskorpuskeln

der Höhenstrahlung nachgewiesen werden können, muß geschlossen werden, daß die Energie der einzelnen Strahlungskorpuskeln der primären Höhenstrahlung tatsächlich einige 10^5 MeV beträgt. Es können aber auch Primärkorpuskeln beobachtet werden, deren Energie bis zu 10^{11} MeV erreicht.

4.6.62 7. Elementarkorpuskeln

Als Elementarkorpuskeln sollen elektrisch geladene oder ungeladene Partikeln der Materie bezeichnet werden, welche durch Kernumwandlungsprozesse entstehen sind und nach den vorliegenden Erfahrungen offensichtlich die kleinsten Strukturen aufbauen. Das bedeutet aber, daß bei Umwandlungsprozessen das Erscheinen solcher

Elementarkorpuskeln zu erwarten ist. Von den Arten der radioaktiven Emission abgesehen sind bei Experimenten die Quanten der γ - und der $\beta^{\pm}$ - Radiation bei Zerfallsvorgängen von Elementarkorpuskeln, nicht aber diejenigen der α - und d - Strahlung, denn die α - Korpuskeln sind He^{++} - Kerne und die d - Korpuskeln H^2 - Kerne also aus p und n zusammengesetzte Nuclearstrukturen. Echte Elementarkorpuskeln sind demnach positive und negative Elektronen $e^{\pm}$ sowie Protonen und Neutronen.

Die Massen von $e^{\pm}$ sowie von p sind massenspektroskopisch leicht bestimmbar. Man findet

$m_{e^-} = m_{e^+} = m_e =$ und

$m_p =$

aber keine $m_n =$ als Einheit ebenso wie $m_p =$

Die Masse von n ist nur indirekt bestimmbar und zwar aus der Diskrepanz ΔE von H^2 Kerne bei der Messung von $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ sowie der massenspektroskopischen Bestimmung von m_d der H^2. Damit ist die Differenz $2m_p - m_d - \frac{\Delta E}{c^2} = m_p - m_n = x$ bekannt. Es erweist sich $x < 0$ sodaß $m_n > m_p$ eindeutig werden kann. Bezogen auf $m_e = 1$ wird $m_n =$

Wegen $m_n > m_p$ sind freie Neutronen labil und es wird der Zerfall $n \xrightarrow{\tau \approx 20\,\text{min}} p$ beobachtet. Der umgekehrte Prozess $p \to n$ wird nur sehr selten unter β^+ - Emission in der Nähe kräftiger β^- - Prozesse beobachtet.

dadurch angedeutet werden müssen, daß beim β^--Prozeß eine Drehung entsteht, welche die Transmissionsebene $p \xrightarrow{\beta^-} n$ zurückdreht, falls diese Drehung von einer die Neutrinokorpuskel absorbierenden Materie herrührt. Es werden daher die Präzessionsgeschwindigkeit klein und die elektrische Ladung sehr groß, so daß die Wahrscheinlichkeit für den Zusammenhang zwischen dieser Drehung und der Konkurrenz des β^--Prozesses.

Sowohl bei p^+ als auch bei p werden magnetische Momente beobachtet, die außer der elektrischen Ladung dieser Elementarkorpuskel zurückgehen.

Umgekehrt besteht prinzipiell die Möglichkeit eines magnetischen Neutronen nachzuweisen. Wird ein n-Strahl durch ein permanent magnetisiertes Stück Fe geleitet so kommt es zu einer magnetischen Polarisation des n-Strahles die nachgewiesen werden kann wenn dieser Strahl durch ein zweites Fe-Stück geleitet wird dessen permanente Magnetisierung parallel oder antiparallel zu derjenigen des ersten Fe-Stückes gerade wird.

Eine experimentelle Unterscheidung der Positronen e^+ gegen p, wo es eine Verwechslung gibt, e^+ und p-Strahlen gibt, besteht bei einem β^+-Prozeß eine Präzession so kann diese

Bindung in der Kernkraft be-
obachtet werden. Hier wird fest-
gestellt daß das e_+ nach einer
bestimmten, von jeder Geschwin-
digkeit abhängenden Bahnlänge
verschwindet und statt dessen
ein γ-Quant von ca 1 MeV
erscheint. Tatsächlich kommt es
zu einer Zerstrahlung von e_+,
wenn e_+ mit einem e_- in Wech-
selwirkung tritt, dann γ-Quanten,
deren Energien jetzt 1 MeV
liegen verschwinden bei Wechsel-
wirkungen mit Kerne die Umkeh-
der Erzeugung eines Elektronen-
paares $e^{\pm}$. Demnach gibt es
eine reversible Wechselwirkung
dieser: $e_+ + e_- \rightleftarrows \gamma\,(1\,\mathrm{MeV})$
$= 2\,m_e \cdot c^2$. Aus dieser empiri-
schen Beziehung folgt unmit-

telbar daß das empirische Äqui-
valenzprinzip zwischen Bindungsener-
gie und Massendefekt $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$
auch für Elektronenmassen gilt
und daß weiter dieses Prinzip
experimentell durch die Wechsel-
beziehung zwischen $e_\pm$ und γ-
Quanten zum Ausdruck gebracht
wird. Der Prozeß der Elektronen-
paarbildung und Zerstrahlung
ist ~~mit Photon~~ reversibel, wenn
mit ein γ-Quant $\gamma\,(2 m_e c^2)$
entsteht, doch ist er irrevers-
ibel, wenn es zur Bildung von zwei
Quanten $2\gamma\,(m_e c^2)$ kommt. Eine
Konstante welche simultan
Paares dieser Quanten die ~~Ent-~~
~~stehung~~ Energie mißt ist
nach dem Äquivalenzprinzip für
Paarbildung experimentell Ent.

Wirkung gelten die empirischen Beziehungen $e_+ + e_- \rightleftharpoons \gamma(2m_e c^2)$ und ferners $e_+ + e_- \longrightarrow 2\gamma(m_e c^2)$, wobei man beobachtet, daß im Fall $\gamma(E) \rightarrow e_+ + e_-$ nur $E > 2m_e c^2$ sich die Differenz $E - 2m_e c^2 > 0$ in Bewegungsform auf die beiden Paarkomponenten verteilt. Umgekehrt kann sich Bewegungsenergie unmittelbar in Elektronenpaare umsetzen werden. Wird hierbei ein γ höchster Energie der gedachten Absorptionskette ein Atom in p und n aufgelöst, so entfallen wegen des "kleinen" Atomkernradius auf diese p und n soviel Bewegungsenergie, daß jedes entsprechende Atom abermals aufgelöst werden u. s. w.,

was zur Kaskadenabsorption führt, wobei die Komponenten der sekundären Korpuskularstrahlung stabil. Bei dieser Auflösung der Kernstrukturen in Kaskaden entstehen auch γ-Quanten weniger Energie, welche ein $e^{\pm}$-Paar oder Bewegungsenergie als $\beta^{\pm}$-Strahl bilden und diese beiden Komponenten bilden zwei weitere Elektronenpaare kleiner Energie bei der im Sinne einer Bremsung erfolgenden Wechselwirkung mit umgebender Materie u. s. w. Endprodukte von γ-Quanten beobachtete $e^{\pm}$-Paare werden als diejenige sekundäre Korpuskularstrahlung beobachtet, welche von

Pb = Photon das einzige em Körper absorbiert werden kann. In der letzten Schicht der Elektronenkaskade unterscheidet die Richtung Energie $2m_e c^2$ sodaß nunmehr Paare weitere Paare gebildet werden und die weitere Bremsung durch Ionisation erfolgt. Die letzten e_+ schließlich zerstrahlen irreversibel und die γ-Quanten unterhalb $2 m_e c^2$ werden schließlich durch die anregende Wirkung der Elektronenhüllen der umgebenden Materieatome absorbiert und auf diese Weise in niederfrequentere Bereiche gestreut.

6.6.62 Die primäre harte Energie der primären Höhenstrahlung erzeugt eine empirische Beobachtung der Wechselwirkungen zwischen schwerer Materie und extrem energiereicher γ-Strahlung. Durch den Prozess der Elektronenpaarbildung und die Auflösung der Kaskaden-Schauer in Kaskadenkaskaden, bildet die leicht absorbierbare Sekundärkomponente aus e_+ und γ-Quanten die Kaskadenkaskade aus γ und n der durchdringungsfähigen Sekundärkomponente eine Trennung absorptionsreiche in Bleikammern mit dicker Materie (Platten aus Pb Pt oder Au) Unter dem Einfluß eines starken magnetfeldes zeigen jedoch daß diese durchdringungsfähige Komponente ausschließlich aus μ und n bestehen kann. Bei

mehr stehen noch Spuren von Elementarkorpuskeln auf, welche die Ladung e_+ bezw. e_- tragen aber in ihrer Trägheitsmasse zwischen 10^2 und $4 \cdot 10^2$ höher liegen müssen, als $m_e = 1$. Die Masse dieser als besonders begleitenden Korpuskeln liegt demnach zwischen m_e und m_p. In der durchdringenden Komponente findet bereits häufig ein als μ-Meson bezeichnetes Meson mit der Masse $m_\mu \approx 200$ beobachtet welches die elektrische Elementarladung e_+ bezw. e_- trägt. Ähnlich wie im Elektronenpaar $e^\pm$ existieren demnach $\mu^\pm$-Mesonenpaare μ_+ und eine $\mu^\pm$-Strahlung welche die μ-Bezw. n-Strahlung der durchdringenden Sekundärkomponente begleitet. Messungen Bothes an $\mu^\pm$ in der Nebelkammer zeigen, daß die $\mu^\pm$ im Gegensatz zu e_- oder p nach sehr geringer Halbwertsdicke zerfallen. Mißt ein in Koinzidenz geschaltetes Zählrohraggregat so mit der Expansionsvorrichtung einer Nebelkammer gekoppelt, daß das ansprechende Zählrohraggregat die Kammerexpansion steuert und steht wieder in der Kammer eine Graphitplatte angebracht so können die Zerfallsprodukte von $\mu^\pm$ analysiert werden welche gleich ein hinreichend starkes Magnetfeld mißt. Man stellt fest, daß $\mu^\pm$ unter γ-Emis-

schon in $\beta^{\pm}$ zerfällt. Das β-Spektrum erweist sich auch hier, im Gegensatz zu den diskreten Quantenlinien als kontinuierlich, das aus der $\beta^{\pm}$-Absorption beim Passieren der eingesetzten Pb-Platte hervorgeht. Die Halbwertzeit des μ-Mesonenzerfalls kann in folgender Weise ermittelt werden: Zwischen zwei in Koinzidenz geschalteten Zählrohraggregaten gleicher Orientierung befindet sich eine hinreichend starke Platte aus dichter Materie. Das Zählrohraggregat über der Platte gibt beim Durchtritt eines μ-Mesons über eine elektronische Kopplung die Emission eines Hochfrequenzoszillators vorgegebener Frequenz frei, die elektronisch abgeschaltet

wird, wenn das tiefere Aggregat durch die β-Emission des im Pb zerfallenden Mesons anspricht. Aus der registrierbaren Zahl der emittierten Perioden und der Frequenz folgt dann für die Halbwertzeit der μ-Mesonen

$$\tau_{\mu} \approx (2{,}15 \pm 0{,}07) \cdot 10^{-6} \text{ [sec]}.$$

Wird angenommen, daß sich ein μ-Meson mit einer Geschwindigkeit $v \approx c$ bewegt, was aufgrund der vorliegenden Beobachtungen gerechtfertigt erscheint, so könnte dieses Meson höchstens den Weg

$$s \approx \tau_{\mu} \cdot c \approx 630 \text{ [m]}$$

zurücklegen. Da aber diese Mesonen bei der Bildung der sekundären Höhenkaskaden, also in einer Höhe von 10^4 bis 10^5 m Höhe entstehen

Für die Halbwertzeit eine das Meson
kennzeichnende Konstante ist
muß geschlossen werden, daß τ_μ
in jedem Medium von v abhängen
denn der tatsächlich durchlaufene
Weg ist wesentlich größer als 630 m.
Auch wenn τ_μ = const. muß also
ein Zusammenhang $\tau_\mu(v)$ gefor-
dert werden, der jede Revision
des Zeitbegriffes überhaupt er-
forderlich macht. Werden drei
Koinzident geschaltete Zählrohraggre-
gate zwischen dem Platten schwer-
Materie liegen, so zusammenge-
schaltet, daß das dritte Aggregat
10^{-6} sec nach dem ersten drei
Aggregaten ansprechen und die
Expansion einer Nebelkammer
schaltet, denn werden nur die e-
jenigen $\mu_\pm$ registriert, die nicht

aus den Kernen der Materie absor-
biert werden. Wirkt auf die Kom-
mer ein Magnetfeld, dann zeigt sich
daß $\mu_\pm$ überhaupt nicht und μ_-
selten im Fall schwerer Kerne
aber auch nicht im Fall leichter
Kerne absorbiert wird. μ_+-Strah-
lung wird also praktisch nicht
von Materie absorbiert, während
die außergewöhnliche Durchdrin-
gungsfähigkeit der sekundären
Höhenstrahlung gutinsgesamt
denn die Mikrokosmenkaskaden
werden ebenfalls durch Mikropro-
zesse absorbiert.

Werden Nebelkammeraufnah-
men jenseits der intensiven Absorp-
tionsschicht der primären Höhen-
strahlung ausgewertet, dann zeigt
sich, daß die Primär-Ultrastrahlen

nicht direkt Absorberne in Kühle-
ren auflösen, sondern daß bei
dieser Wechselwirkung sekundär
eine weitere Art mit e- gela-
dener Mesonen, die sogenannten
Primär- oder π- Mesonen
$\pi^{\pm}$ entstehen, für deren Masse
sich aus den Bahnabmessun-
gen in der Emulsion $m_{\pi} \approx 330 m_e$
ergibt. Diese π- Mesonen reagie-
ren im Gegensatz zu den μ- Mesonen
überaus intensiv mit den Kern-
bestandteilen der Materie. Die Beob-
achtungen an den Protonen-
spuren weisen deutlich darauf
hin, daß die aus den Primär-
Kernstücken sekundär entstande-
nen π- Mesonen diese Absorberne
im Bleikern sehr kurzreichen
Energie auflösen können, sodaß

die Bleikernkaskade als ein ter-
tiärer Prozess aufgefaßt ist.
Die auf diese Weise nicht absorbierten
π- Mesonen zerfallen nach sehr
geringer Halbwertzeit unter γ- Emis-
sion in μ- Mesonen gleicher La-
dung gemäß $\pi^{\pm} \rightarrow \mu^{\pm}$
sodaß auch die $\mu^{\pm}$- Strahlung
ein aus der $\pi^{\pm}$- Strahlung her-
vorgehender tertiärer Prozess ist.
Die $\mu^{\pm}$- Strahlung begleitet da-
bei die Bleikernkaskade
hat aber wegen der geringen
Wechselwirkungsbreite eine
wesentlich größere Durchdrin-
gungsfähigkeit. Die π- Meso-
nen die nicht zur Wechselwir-
kung kommen durchlaufen
also die Zerfallskette $\pi^{\pm} \rightarrow \mu^{\pm}$
$\rightarrow \beta^{\pm}$, sodaß nach der Zeit

$\tau_\pi + \tau_\mu$ gibt noch eine β = Strahlung dazu bleibt.

7.6.62 Die sehr intensive Wechselwirkung der π = Mesonen mit Kohlenstoff geht wegen der ungeheuren Plattenzahl von μ und π im wesentlichen auf π^- zurück. Da $\pi^\pm$ sekundär aus der Wechselwirkung äußerst energiereicher μ = Strahlung entsteht, kann eine $\pi^\pm$ = Strahlung erzeugt werden, wenn energiereiche μ = Beschleunigte eine kurzeindringende energiereiche μ = Strahlung entdecken. So ergeben π = Mesonen gestatten bereits Messungen von m_π und τ_π. Es ergibt sich $m_{\pi^+} = m_{\pi^-} = m_\pi = 276 \pm 6$ und $m_{\mu^+} = m_{\mu^-} = m_\mu = 212 \pm 6$ in der Einheit m_e. Für τ_π folgt

$\tau_\pi \approx 2 \cdot 10^{-8}$ [sec]. Damit kann das Transmutationsschema zu $\pi^\pm \xrightarrow[2 \cdot 10^{-8}]{\tau} \mu^\pm \xrightarrow[2{,}15 \cdot 10^{-6}]{\tau} \beta^\pm$ ergänzt werden. Bei der Erzeugung von $\pi^\pm$ = Mesonen mit Hilfe von μ = Beschleunigern können auch neutrale π = Mesonen π^0 der Masse $m_{\pi^0} \approx 295 \pm 20$ nachgewiesen werden, die nach der Halbwertzeit $\tau_{\pi^0} \approx 2{,}5 \cdot 10^{-14}$ [sec] in γ = Quanten zerfallen. Offensichtlich liefern die zerfallenden π^0 = Mesonen, die mit $\pi^\pm$ sekundär in der Höhenstrahlung entstehen, den Hauptanteil der γ = Quanten, welche die bisher abschätzbare Komponente der Elektronenpaarkaskade auslösen.

Anmerkung zu Bd XIII S. 164

die Abfassung mißlang

Isomerien zeigt, daß es auf jeden Fall Kernkonstanten im Sinne von Kernkonfigurationen gibt. Wenn aber solche Konfigurationen zusammenhalten, dann müssen die Kernkräfte zentral sein. Aus der Natur dieser Kernkräfte ergibt sich eine Aussage über die Dichte ~~[illegible]~~ Unterschiede in verschiedenen Kernkonstanten gemacht werden kann. Errechnet sich nämlich diese Dichte $\sigma_K = \frac{M}{V}$ mit dem Kernvolumen $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ und der Kernmasse $M \approx mA$ (ohne Berücksichtigung des Massendefektes) als Konstant unabhängig auf A, dann müssen diese Kernkräfte Sättigungscharakter haben, d.h.

jedes Nukleon kann nur mit den benachbarten Nukleonen in Wechselwirkung treten. Werden an verschiedenen Kernstrukturen A die Kernradien r = und α = Streuung gestreut, so müssen die resultierenden Ablenkungswinkel Aufschluss über die jeweiligen Kerndurchmesser $D = 2R$ geben. Die auf diese Weise gewonnenen Kerndurchmesser D für jeden Wert A können nunmehr über dem zugehörigen A-Wert aufgetragen werden, was zu einer Eichkurve führt, die dann $D \sim A^{\frac{1}{3}}$ oder $R \sim A^{\frac{1}{3}}$ also $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \sim A = \frac{M}{m_H}$ $= \frac{V}{m}\sigma_K$ also ergibt. Herausfolgt aber zwischenbar $\sigma_K = \text{const}(A)$, daß die Kernkräfte tatsächlich

einen Partizipationscharakter haben müssen.

18.6.62 Kapitel IV

Organische Strukturen

1.) Die Organismen.

Sowohl alle Ergebnisse der vorangegangenen anthroposomorphen ästhetischen Empirik zusammengefaßt, so kann festgestellt werden, daß alle sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen in Raum und Zeit befindliche materielle Strukturen im Sinne gestalthaft funktioneller Beziehungssysteme sind.
Eine materielle Struktur erfüllt immer ein endliches Maß des

Raumes, also geometrisch begrenztes Volumen des realen physikalischen Raumes, in welchem der jeweilige Momentanzustand des Universums gegeben ist. Die Eigenschaften dieser materiellen Strukturen sind zugleich die Quellen aller Wechselwirkungen, durch welche es zu einem funktionellen Zusammenhang kommt; denn jede materielle Struktur wirkt als Manifestationsfeld aufgefaßt werden dessen Elemente durch punktförmige und abstrakte Wirkungsfelder in gesetzlichen Zusammenhängen stehen.

19.6.62 Der Zustand einer materiellen Struktur wird in jedem Fall durch drei Eigenschaften bestimmt; nämlich durch

die geometrische Form
die innere Wirkstruktur und
die Gesetzt, also die substanzielle
Zusammensetzung. ~~Jede Wechsel-~~
~~wirkung erfolgt entweder auf-~~
~~grund einer Wechselwirkung zu einem~~
~~zeitlich stationären Zustand führen~~
~~kann. Kommt es zu einem statisch-~~
oder dynamisch-stabilen Zustand,
d.h. das Wechselwirkungssystem
bleibt in seinem Zustand zeitlich
konstant. Erst wenn dieser stabile
Wechselwirkung zu stand
zeitlich gestört wird, können
Labilitäten auftreten die zu
einer zeitlichen Zustandsände-
rung der Wirkart führen. Grund-
sätzlich sind folgende Arten von
Zustandsänderungen möglich:
1.) die periodische Zustandsänderung, al-

lerdings in allen drei Zustandsräumen
gleichzeitig.
2.) Bei der doppelten Zustandsände-
rung ändern sich jeweils zwei
Zustandsräume also entweder
Form und Wirkart oder Form
und Gesetzt bzw. Wirkart und
Gesetzt.
3.) Bei der singulären Zustandsän-
derung ändert sich jeweils
nur ein Bestimmungsstück
in der vorangenannten empirisch
materiellen Wirkstruktur. Somit
festgestellt werden, dass für alle Zu-
standsänderungen das Entropieprinzip
und im makroskopischen Bereich das
Kausalitätsprinzip gilt. Neben
diesen materiellen Prozessen
werden aber noch materielle
Wirkstrukturen beobachtet, die bei

Konstante Form und Konstanter
Struktur ihre Tesetur permanent
ändert u. zwar im Sinne eines Stoff-
wechsels also eines thermodynamisch
nicht im Gleichgewicht befindlichen
Systems. Der innere Zu-
stand wird in diesem Fall dyna-
misch gemäß durch einen Stoffwech-
selprozess stabilisiert, sonst
diese Strukturen ständig ab-
gebaut sind. Trotzdem wird beobachtet,
daß die ~~in der Regel~~ gewöhnlich
~~oder charakteristische~~ bestimmte Zeitdauer
(für die betreffende Art typisch)
existieren und sich selbst er-
halten. Die Entropie des abge-
schlossenen Systems ist bestrebt
„die Entropie zu erhöhen", sodaß
diese, als organisch bezeichneten
Strukturen während ihrer Exi-
stenzdauer offensichtlich dem

Entropieprinzip nicht genügen.
Im allgemeinen wird auch ein völlig
normales Verhalten festgestellt,
sodaß auch das Kausalitätsprinzip
trotz der makroskopischen Strukturen
nicht erfüllt sind. Charakteristisch
für diesen als Leben bezeichneten Vor-
gang ist die Beobachtungstatsache
daß ein lebender Organismus nur
von Organismen derselben Art
erzeugt werden kann. Nach Ab-
lauf der Zeitspanne des Organismus, also
nach dem Zeitpunkt des Lebens-
endes schließt eine autogenetische Evolution im Sinne eines
organischen Wachstums an.
Nach Ablauf der Lebensdauer,
während der sich der Organismus,
trotz seiner Labilität selbst erhält
also nach dem Zeitpunkt des Todes,

beginnen die Prinzipien der Entropie und Kausalität zu wirken.
Eine allgemeine Einsicht in das Lebendes Organismen zeigt, dass es im Bezug auf den Stoffwechsel grundsätzlich zwei Klassen von Lebewesen oder allgemeiner autotrope und heterotrope Organismen. Die autotropen Organismen nehmen die zum Stoffwechsel notwendige Substanz unmittelbar aus der umgebenden anorganischen Materie während die heterotropen Organismen organische Substanz anderer Lebewesen aufnehmen. Auch werden ganz bestimmte Arten von Mikroorganismen beobachtet die heterotroper Natur sind also organische Substanz aufnehmen aber beim Stoffwechsel diese Substanz in ihre anorganischen

Mineralbestandteile zerlegen.
Die autotropen Lebewesen haben demnach die Funktion von Produzenten organischer Substanz, die heterotropen diejenige von Konsumenten und die heterotropen Mikroorganismen die Funktion von Reduzenten solcher Substanz. In jeder dieser Hauptklassen erscheinen Lebewesen als offene oder geschlossene Systeme in Bezug auf das Wachstum; d.h. entweder erfolgt das Wachstum der Rahmen einer nicht vorher bestimmbaren Sprossung oder das Wachstum verläuft von einer vorher bestimmbaren Form.
Wird die Energiebilanz beim Stoffwechsel untersucht, so ergibt sich folgende Gesetzmäßigkeit.

Bei autotropen Lebewesen verläuft der Stoffwechsel immer endotherm, sodaß die Entropie der aufgenommenen anorganischen Substanz nach dem Umsatz vermindert erscheint. Im Gegensatz dazu verläuft der Stoffwechsel heterotroper Lebewesen exotherm, d.h. die Entropie wird nach dem Umsatz erhöht. Eine weitere Analyse derjenigen Substanzen welche die Textur der organischen aufbauen führt zu dem Ergebnis, daß die holokristallinen Stoffe auf die C-Basis zurückgehen. Es hat den Anschein als ob die C-Basis ~~allein für~~ die organischen in Betracht kommend, weil wegen Z = 6 und der symmetrischen Tetraeder-Konfiguration

$2s^2 + 2p^2$ der Valenzschale die C-Atome mit 4 Valenzen die optimalen Eigenschaften der Selbstbindung aller Elemente haben und weil auf diese Weise holokristalline Strukturen als Fraktionalsysteme höchster Freiheitsgrade oder Aktions- und Reaktionsfähigkeit sowie guter Stabilität möglich werden.

Im allgemeinen wird die Besiedlung eines ~~Lebensraumes~~ Biotops durch Organismen als Population bezeichnet und zwar als Flora wenn es sich um eine Population aus autotrop endothermen aber als Fauna wenn es sich um eine solche aus heterotrop exothermen Organismen handelt; weil die autotrop endo-

thermen organismen als Pflanzen sind die heterotrop isothermen gewöhnlich als Tiere erscheinen. Flora und Fauna stehen nach den Beobachtungen in einem grundsätzlichen Symbiose und zwar im Sinne einer Sozialordnung Produzenten Konsumenten Reduzenten, wodurch der Stoffumsatz zu einem Kreisprozess geschlossen wird, der aber nur solange Natur laufen kann, solange Energie für die endothermen verbrauchenden Stoffwechsel ~~prozesse~~ vorhanden ist. Diese Energie wird in Form langwelliger Strahlungsquanten von der Sonne gestellt. Die Populationen der Flora und Fauna sind in allen Festlandgebieten

über und unter der Oberfläche meeste in der gesamten Hydro- und ~~Atmo~~sphäre nachweisbar. Bei der artlichen Unterschiedlichkeit ist die außerordentliche große Zahl von Arten auffallend. Jedem spezifischen ~~Lebensraum~~ Biotop scheint eine spezielle Art von Organismen jeweils optimal angepasst zu sein oder eine optimale Selbsterhaltung / Selbstentfaltung das Organismen in jedem ~~Lebensraum~~ Biotop ermöglicht. Auch werden die vielfältigsten unterschiedlichen Arten von Organismen beobachtet die mit der gleichen Vielstrebigkeit auf optimale Selbsterhaltung, aber auch Selbstentfaltung der betreffenden Arten als Fundbestim-

Wiener Arbeiten.

20.6.62 Beobachtungen hinsichtlich der Fortpflanzung von Lebewesen führen zu dem Ergebnis, daß jedes Lebewesen nur von anderen Lebewesen der gleichen Art produziert werden kann und zwar dann, wenn die Eltern des neuen Lebewesens ein bestimmtes für die Art typisches Lebensalter erreicht haben. Bei dieser Fortpflanzung werden immer die Merkmale der Art, aber auch Individualmerkmale der Vorfahren in diesen Vorgang weitergegeben. Alle diese Merkmäler also im Vorgang weitergegebenen Merkmale liegen demnach genotypisch als Potenz der möglichen Habitus nach der Zeugung im Keim des zukünftigen

Lebewesens vor. Dieser Genotypus bestimmt deshalb die Möglichkeiten der zukünftigen Ontogenese, doch bilden die allgemeine Symbiose zwischen Flora und Fauna sowie die physikalischen Umweltsbedingungen zusammen die Peristase der ontogenetischen Evolution. Durch das Wirken dieser Peristase wird aber die Ontogenese so beeinflußt, daß die möglichen Potenzen des Genotypus sich verschiedenartig entfalten, sodaß durch die Wechselbeziehung zwischen Peristase und Genotypus der tatsächlich manifest werdende Phänotypus gebildet wird. Eine weitere Beobachtung läßt darauf hinaus, daß der fest liegende Genotypus gelegentlich mutationen, also Merk-

Mutationsmöglichkeiten erfahren kann, welche durch Stoffwechselstörung, thermische Einflüsse sowie durch die Ausstrahlung beim Zerfall von Radioisotopen in der umgebenden Materie oder durch Höhenstrahlung ausgelöst werden. Derartige Mutationen ändern somit auch die Wechselbeziehung zwischen Peristase und Genotypus also den Phänotypus. Dies bedeutet aber, daß sich die Mutation in Bezug auf die Lebensfähigkeit des Organismus positiv oder negativ auswirken kann. Bei einer negativen Auswirkung kommt der betreffende Lebewesen infolge einer natürlichen Selektion innerhalb einer gewissen Zeit zum Fortpflanzung, sodaß sich eine derartige Mutation nicht

Katastrophe auswirken kann. Eine positive Mutation dagegen kann die Phylogenese, also die geistliche Evolution der ganzen Art beeinflussen, oder aber die Entstehung einer ganz neuen Art von Organismen auslösen.

2.) Die geistliche Evolution der Lebensformen

Bei Bodenuntersuchungen finden sich praktisch in allen Bodenschichten die zerfallenen Reste von Organismen. In tieferen liegen Pflanzen- und Tierreste in Schichten übereinander, wobei das Alter der einzelnen Schichten um so höher zu veranschlagen ist je tiefer die betreffende Schicht liegt. Jede alte Schichten erscheinen als Torf

und diese Torflager werden nach noch größeren Zeitabständen einem Verkohlungsprozess unterworfen und bilden dann Braunkohlen-lager. In all diesen Ablagerungen erscheint immer wieder der organische Ursprung des Materials, denn fossile Pflanzen- und Tierreste können als Fossilien noch in Braunkohlelagern identifiziert werden. Auch Stein-Kohlen- und Anthrazitlager müssen organischen Ursprungs sein, denn beim Abbau zeigt sich, dass diese Lagerstätten ebenso wie die Braunkohlenlager vorwiegend aus fossilen Pflanzen-resten bestehen. Ebenfalls werden beispielsweise in Kiesablagerungen fossile tierische Skelettreste gefun-

den. Eine Analyse aller dieser Fossilien zeigt, dass es sich teilweise um Reste von solchen Organismen handelt deren Arten gegenwärtig nicht mehr existieren, woraus auf ein hohes Alter zu schließen ist. Zur Altersbestimmung dieser Fossilien die noch direkt in organischer Form erscheinen kann folgende Methode verwendet werden. In der durch den π^--Mesonen-einfang verursachten Nukleonen-kaskade der sekundären Höhenstrahlung gibt es neben der p-Komponente auch eine n-Komponente, die einfach $N^{14}(n,p)\,C^{k\,14}$ $\xrightarrow[5000\,a]{\beta^-}$ N^{14} mit N_2 der Atmosphäre im Wechselwirkung tritt. Es entsteht das Radioisotop $C^{k\,14}$ aktiv, welches mit

O_2 der Atmosphäre sofort zu CO_2 reagiert. Andererseits zerfällt unter β = Emission das Isotop mit einer Halbwertszeit von ca 5000 a, sodaß sich in der Atmosphäre ein konstantes Niveau von C^{+14} in Form CO_2 erhält wenn die Intensität der Höhenstrahlung konstant bleibt. Beim Stoffwechsel der Organismen müßte je nach der Art des betreffenden Lebewesens eine bestimmte Menge C^{+14} ~~angelagert~~ im Organismus angelagert werden, die wegen des Stoffwechsels während der Lebensdauer konstant bleibt. In dem betreffenden Organismus kann also mit einem Zählrohr eine bestimmte β = Intensität I_0 nachgewiesen werden.

Nach dem Tod, also dem Aussetzen des Stoffwechsels, wird auch der C^{+14} = Bestand nicht mehr gewechselt und nach einer Zeit T muß die nachweisbare β = Intensität auf den Wert $I_1 < I_0$ gesunken sein. Aus dem Verhältnis dieser beiden messbaren Intensitäten und der bekannten Halbwertszeit $T \approx 5000$ a des C^{+14} folgt dann unmittelbar T. Wenn also organische Fossilien gefunden werden, so kann durch eine Messung der β = Strahlung im Vergleich mit äquivalenter frischer organischer Substanz das Alter des betreffenden Fossils ermittelt werden.

Eine andere Gruppe offensichtlich sehr alter Reste organischer Lebewesen wird von

den sogenannten Petrefakten ge-
bildet. In Gesteinsschichten der
Gebirge, aber auch in den Sedi-
mentärgeschieben finden sich
häufig die typischen Gestalten
organischer Lebewesen in Form
steinerner Figuren, teilweise auch
in Form reliefartiger Abdrücke
in Gesteinsplatten. Dass es sich
hierbei tatsächlich um die ver-
steinerten Abdrücke von organismen
handelt wird unmittelbar evident,
wenn das betreffende Gebilde mit
ultravioletlicht bestrahlt wird.
Die Fluoreszenzanregung im
sichtbaren Spektralbereich weist
dann deutlich auf eine für
organismen typische Verteilung
organischer Substanz hin.

21.6.62 Zur Altersbestimmung

derartiger Petrefakten reicht die
C^{14} - Methode im allgemeinen nicht
aus, woraus unmittelbar
hervorgeht, dass das Alter dieser
versteinerten Fossilien äußerst
erheblich vor
sein kann. In diesem
Fall muß berücksichtigt werden,
dass das Isotop U^{238} in allen
Gesteinen als Spurenelement ver-
teilt ist. Eine Analyse irgendeiner
Gesteinsart in bezug auf U und Pb
[illegible] muß ein Massenverhältnis U : Pb
ergeben. Pb ist aber das End-
glied der U - Zerfallsreihe, deren
Halbwertzeit bekannt ist, sodaß
sich aus U : Pb unter Berück-
sichtigung dieser bekannten Halb-
wertzeit das Alter der betreffenden
Gesteinsart ablesen lassen kann.
Mit Hilfe dieser Methode ist es mög-

loch das Alter aller Gesteins-
schichten zu messen und damit
auch das Alter der von diesen
Schichten eingeschlossenen Petre-
fakten. Werden alle Fundstücke
nach dem so gemessenen Alter ge-
ordnet und begeht man die jünge-
ren organischen Fossilien in die
Ordnung ein (Ausnahmen den C^{14}-Zer-
fall bestimmend), so zeigt sich daß
in jeder Altersschicht dieser Zusam-
menstellung eine charakteristische
Form von petrefaktischen oder
organischen Fossilien besonders
häufig auftritt die das Bild
der ganzen Altersschicht bestimmt
und daher als Leitfossil bezeich-
net wird (Zusammenstellung der
Leitfossilien mit Altersangaben).
Aus dieser Zusammen-

stellung der Leitfossilien und ihrer
Altersangaben geht unmittelbar
hervor, daß sich die Lebensformen
von einfachen primitiven Vorstufen
während der Entwicklungsgeschichte
bis zur Gegenwart aufwärts entwickelt
haben, und zwar im Sinne einer,
offenbar zielstrebigen Entwicklung
in allen Biotopen. Im Rahmen
dieser Besiedlung kam es zur Aus-
bildung einer großen Mannigfaltig-
keit von Arten und Typenbildern
die sich optimal an den spezifi-
schen Biotop anpaßten. Für
die Entwicklungsgeschichte der
Biotopen-Lebensformen ergibt nun folgendes
Bild: (Bd 1 letzte Seiten ver-
wenden).

Hier wurde die ge-
samte Evolution in einige

schichtliche Epochen charakteristisch sind neben den Leitfossilien noch andere Formen ausgebildet, welche das Bild der jeweiligen Population ergänzen.

Aus diesen paläontologischen Untersuchungen geht hervor daß offensichtlich nicht nur die Ontogenese eines Organismus oder die Phylogenese einer Organismengruppe die dem Entropieprinzip entgegengerichtete Zielstrebigkeit zu optimaler Selbsterhaltung, Selbstentfaltung und Expansion des Biotops ~~Lebensraumes~~ aufweist sondern daß praktisch die ganze Entwicklungsgeschichte der Organismen welche alle Phylogenesen umfaßt, in der

gesetzlichen Folge der Arten dem gleichen Prinzip finaler Zielstrebigkeit gehorcht. Hieraus wird deutlich, daß die gesamte Evolution gesetzlich dem Entropieprinzip zuwiderlaufend ~~entgegen~~ orientiert ist sodaß eine Phylogenese überhaupt Ontogenese wahrscheinlich angenommen werden kann. Wenn aber das Prinzip einer allgemeinen Ontogenese vorliegt, wenn verhalten sich die Organismen so, als ob sie als Entelechien angelegt sind also als organisierte Strukturen mit gesetzlicher Finalbestimmung.

30.6.62 Es besteht aber auch die Möglichkeit daß diese Ontogenese nur vorgetäuscht wird, mit anderen Worten die Mutationen verlaufen ohne

jede Zielstrebigkeit und durch die entropie-verhindernde Wirkung der Umgebung kommt es zu einer Selektion in deren Rahmen nur die der Umgebung optimal angepassten Organismen zur weiteren Fortpflanzung kommen. Diese Auffassung begründet auch die beobachteten negativen (und prohibitiven) Mutationen erklärt aber die große Vielfältigkeit der Organismen, aber nur bedingt den ebenfalls beobachteten Evolutionstrend zu organischen Strukturen wachsenden Organisationsgrades. Evtl. Entscheidung

3.) Allgemeine Eigenschaften des Lebensprozesses

So vielfältig auch die Arten

der Lebensformen sind, gibt es doch gemeinsame Eigenschaften, die allen Lebewesen gemeinsam sind und daher als allgemeine Eigenschaften des Lebensprozesses aufzufassen sind, die zu einer eindeutigen Definition herangezogen werden können.
2.7.62

Das auffallendste Merkmal aller Lebewesen ergibt sich aus einer Analyse ihrer Körperstrukturen. Hierbei ergibt sich, daß alle am Lebensprozeß und am Aufbau der organismen beteiligten Substanzen, organischer Natur sind. D.h. daß alle molekularstrukturen auf C-Verbindungen aufbauen. Lebensformen auf einer anderen materiellen Basis können nicht nachgewiesen werden. Hieraus folgt, daß die Valenzen der C-Atome Eigenschaften aufweisen müssen, die bei Reihen

anderen Elemente vorkommen und daher äußerst die vorliegenden Erfahrungen den Grundsätzen des Lebensprozesses kennzeichnen. Die Valenzschale des C wird beschrieben durch die symmetrische Tetraederkonfigurationsformel ~~$2s^2 + 2p^2$~~ $2(s^2 p^2)$, welche mit dem Kernspin $Z = 6$ durch die abgeschlossene K-Schale abgeschrieben wird. Durch diese Konfigurationsformel ist aber im poetischen Bild (Bildspeicher) die Fähigkeit zur Selbstbindung gegeben, die bei den übrigen Elementen dieser Art wie Si und Ge, wegen des steigenden Z-Wertes und der damit wachsenden metallischen Eigenschaften der beim ~~B~~ B wegen der Asymmetrie $2(s^2 p^1)$ ~~$2s^2 + 2p^1$~~ stark bedingt ist. Erfahrungsgemäß

gibt es neben C nun noch die Gruppe SiO_4, die im gleichen Rahmen zur Selbstbindung fähig ist, doch bewog die Erfahrung, daß SiO_4-Kristalle nicht die Basis des Lebensprozesses bilden. Der wesentliche Unterschied zwischen dem C- und dem SiO_4-Kristallen liegt in der Reaktionsfähigkeit. Während SiO_4 als Basis aller Gesteine und Mineralien nur sehr schwer mit der Umgebung in einen Wechselwirkungsprozeß tritt, können die Wechselwirkungen der C-Kristalle mit der Umgebung im Sinne eines Stoffaustausches sehr intensiv verlaufen. Die organischen Molekülarchitekturen sind durch ihren hochmolekularen Charakter sehr differenzierter C-Gerüste

(Selbstbindung) und die intensive Wechselwirkungsfähigkeit gekennzeichnet.

Die aus diesen organischen E = Konstruktionen aufgebauten Organismen erhalten sich in ihrer Konstruktion während ihrer Lebensdauer aufgrund eines ständigen Materialdurchsatzes, der im Innern des Organismus einen Stoffwechsel verursacht. Folgerungsweise ist jeder Organismus ausserordentlich labil, denn nach einer Unterbrechung dieses Stoffwechsels, die zum Tod des Lebewesens führt, zerfällt der Organismus kurzfristig in Einzelteile. Diese unterscheiden sich wesentlich von höheren Entropie. Die allgemeine Tendenz der

anorganischen Umgebung ist die zeitliche Entropiezunahme, also die Destruktionstendenz, dieser Destruktion entgegen besteht nicht nur das Lebewesen dauernd seine Lebensdauer sondern es widersetzt sich der Destruktion und gelegt während seines Organismus eine der Destruktion entgegengerichtete aufbauende Konstruktionstendenz. Die Organismen erhalten sich nicht nur selbst gegen die Destruktion der Umgebung, sondern sie gelegen darüber hinaus während ihrer Ontogenese eine zeitliche Konstruktionstendenz im Sinne eines Selbstaufbaues.

~~Einzelne weitere Entwicklungsformen~~ Alle Be-

obachtungen darauf hin, daß jedes Lebewesen zur Fortpflanzung fähig ist, die von gelegentlichen Katastrophen abgesehen stets einer identischen Reproduktion entspricht. Dies bedeutet, daß ein Lebewesen sich mit im Rahmen seiner Art vermehren kann. Wie schon erwähnt ist jede Art von dynamischen einer spezifischen Persistenz optimal angepaßt, sodaß die Art während ihrer Phylogenese den ganzen verfügbaren Biotop besiedelt. Diese Expansionstendenz einer Population während der Phylogenese ist äquivalent zur Artbestandserhaltung während der Ontogenese des Einzelindividuums zu sein.

Bei dieser Expansion einer Art kann es gelegentlich zu starken Destruktionen kommen, nämlich dann, wenn der neue Biotop nicht mit physischer Gewalt besetzt wird. In völliger Analogie dazu wäre die Destruktion des heterotropen Einzelorganismus beim Katabolismus zu werten, dann hört der Organismus auf zu leben, wenn die Entropieverluste der Aufrechterhaltung der Ordnung erhöht, was einer Destruktion entspricht.

Nach diesen grundsätzlichen Beobachtungen kann festgestellt werden, daß die materielle Basis des Lebensprozesses C-Verbindungen sind und daß

weiter die Organisation grundsätzlich eine Konstruktion und eine Destruktionstendenz zeigt. Weiter ist immer ein Prinzip der Selbsterhaltung und der Selbstreproduktion des Einzelorganismus sowie ein Prinzip der Arbeitsteilung und Arbeitsverbindung gegeben.

4.7.62 Wird der Organismus eines Lebewesens, also eine Form, gesetzt, dann stellt man bei höher entwickelten Formen fest, daß dieses Form als eine Struktur von Einzelteilen zusammengesetzt ist, die spezialisierten während das Lebensvorgänge in funktionellen Wechselbeziehungen stehen. Aber auch die physikalisch bedingten Bestandteile

meute des Form werden sich als zusammengesetzt, denn bei der histologischen Untersuchung aller scheinbar homogenen Baubestandteile des Form kann grundsätzlich eine gewebsartige Struktur aus gegeneinander Volumselementen nachgewiesen werden. Diese Zellen erscheinen grundsätzlich als Elemente jeder organischen Struktur, und jede dieser Zellen ist ein in sich geschlossenes Lebendes System. Im einfachsten Fall besteht der ganze Organismus nur aus einer einzigen autonomen Zelle, während bei den höher organisierten Vielzellern die einzelnen Zellen Spezialfunktionen übernommen haben und in Zellverbänden da-

zelne Organe als somatische Funktionszellen und Spezialzellen bauen, die Bakterien, durch ein System funktioneller Wechselwirkungen getroffen das Soma des Lebewesens aufbauen. Die Elemente eines jeden lebenden Organismus sind also die Einzelzellen die nach den histologischen Befunden weitere Differenzierungen aufweisen. Bei von der Zellmembrane umschlossene Zellenmilieu das sogenannte Protoplasma ist immer von einer wabenartigen Gefüge eines Gerüstes anderen Konsistenz durchsetzt. Wobei das Protoplasma ein ein Kompartimentreiches System sogenannter Mizellen aufgebaut wird. In diesen Mizellen laufen keine

Lebensvorgänge die verschiedensten Stoffwechselvorgänge ab und alle Mizellen eines Zellmilieus bilden wiederum ein funktionelles System von Wechselwirkungen, welches nach den Erfahrungen von der Zentralsteuerung einer Zelle durch sogenannten Zellkern gesteuert wird. Die einzelne Zelle speichert bereits alle Eigenschaften die den Lebensprozess kennzeichnen. Sie versucht sich gegen die Umgebung selbst zu erhalten und im Sinne eines typischen Wachstums eine Selbstentfaltung bis zur vollen Funktionsfähigkeit im Rahmen ihres Wirkungssystem durchzuführen. Weiter ist jede Zelle zur einer Fortpflanzung fähig, wobei von gelegentlichen Mutationen abgesehen grundsätzlich

jeden männlich sogen. Virus beobachtet. Ein Virus ist eine Molekül auf der C-Basis, sehr hohe Organisation welches als Einzelmolekül bereits die Grundcharakteristika des Lebensprozesses spiegelt, denn diese Virusmoleküle sind in sich geschlossene funktionelle Wechselwirkungssysteme. Eine deutliche symbiotische Tendenz ist bei vielen Virusarten zu erkennen die auf ein höheres autotrophes Verständnisniveau der sogen. Viren hinzielt, bei denen ein funktionelles System vieler virusartiger Moleküle aufgebaut wurde die innerhalb des Systems Spezialfunktionen übernommen haben. Die Kiesel-

len im Protoplasma der Einzeller können als solche als in den Funktionalsystem gebundene Viren aufgefaßt werden die als Einzelwesen eine höhere Virusform darstellen. Bereits bei den primitivsten Einzellern den Bakterien wird eine starke symbiotische Tendenz als Kolonie – und im stärkeren Maße als Ascusbildung beobachtet die bei den höher entwickelten Einzellern pflanzlicher und tierischer Art noch stärker hervortritt. Auch die Fortpflanzungsgesellschaftung deutet auf ein höheres Evolutionsniveau die Form eines höher strukturierten funktionellen Wechselwirkungssystems. Es werden Fortpflanzungszellen

aus besondere beim Colocase beobachtet, bei denen die einzelnen Zellen innerhalb des Kolonie bestimmte ihre Individualität aufgegeben und Spezialfunktionen übernommen haben. Schließlich sind die ungeheuren Hydraformen der noch höheren organischen Körper nicht auflösbare Zellverbände aus Ektoderm, Entoderm und Phagocytensystem, die als Gesamtsystem einen fest vorgegebenen Genotypus haben. Im nächsten Vollständigkeit der Kolonien beginnen die spezialisierten Zellen Gewebe zu bilden die ihrerseits wiederum Spezialaufgaben als Organe zu erfüllen haben. Und die übergeordneten funktionellen Wechselwirkungssysteme bilden. Diese beobachtete systemische Vergesellschaftung der Elemente einer jeden organischen Struktur ist ebenso wie analytisch fassbar, wie die Abhängigkeit ihrer Reaktionen und die Grundprinzipien eines jeden Lebensprozesses nämlich Erhaltung und Entfaltung der Individuums und der Art sowie Konstruktions- und Destruktionsvorgänge. Jeder Lebensvorgang ist nach den vorliegenden Beobachtungen offensichtlich ein funktionelles Wechselwirkungssystem welches mit der festen Struktur in Wechselbeziehung steht und dabei Konstruktion oder Destruktion produziert. Diese Vorgänge

wesentlich durch symbiotische Vergesellschaftungen bestimmt derart, daß die Organisation der betreffenden Struktur als Organisationsgrad ausschließlich der Symbiosen gegeben auf eine Finalbestimmung in einem höheren Organisationsgrad gerichtet ist. Organisationsgrade mit Finalbestimmung sind aber Entelechien und funktionelle Wechselwirkungssysteme in organischen symbiotischen Zusammenhängen. Sind Wirkungsgefüge. Nach dieser Interpretation ist also jede organische Struktur und jede organische Symbiose ein entelechal geschichtetes Wirkungsgefüge. Aus dieser mittelbar empirisch gegebenen Definition organischer Strukturen folgt, daß die Beschreibung des elementaren Lebensprozesses die Analyse von Zahlenmannigfaltigkeiten impliziert ist. Die entelechale Schichtung der Wirkungsgefüge legt nämlich als Analogon eine Metroplasie-Konstruktion (zeitliche Folgentheorie) nahe, die dem empirischen Befund der voll akausal reagierenden entelechal geschichteten Wirkungsgefüge vollständig entspricht. Wenn also eine Theorie des Lebensprozesses geschrieben werden soll, so muß es sich dabei um eine symbiotische Beschreibung handeln.

Beim Fortpflanzungs-

prozess einzelner Zellen kommt es immer zur identischen Reproduktion des betreffenden Chromosomenaggregates, woraus geschlossen werden muß, daß die identisch reproduzierten Eigenschaften des gesamten Organismus also der Genotypus in einem solchen Chromosomenaggregat lokalisiert ist. Tatsächlich finden sich nach den histologischen Untersuchungen auf jedem Chromosom eine sehr große Zahl sehr kleiner klotzartiger Gebilde von denen jedes einzelne präsumptiv ein vererbbares Merkmal weiterträgt. Eine Analyse der in diesen Genen enthaltenen Substanz betrifft die Aussage,

daß diese Genensubstanz als Information des betreffenden Erbmerkmals in ihrer molekularstruktur derjenigen einmolekularen Virusarten ähnlich ist. Mutationen andern demnach als Folge äußerer Eingriffe die molekularstruktur der betreffenden Gensubstanz und damit die von dieser getragene Information. Auf diese Weise wird es möglich auf welche der alle beobachtbaren Lebensformen während der geschichtlichen Evolution durch Mutationen aus der primitivsten organischen Struktur nämlich dem einmolekularen Organismus hervorgegangen sind, doch bleibt

unverständlich wie sich die Anziehung der ersten Aber- der Molekülarstruktur voll- zogen hat. Auf jeden Fall muß es sich um einen stetigen Prozess gehandelt haben; d. h. es muß eine bestimmte Zahl von Molekülarten auf der C-Basis gegeben haben, die noch dann Kri- terium des Lebensprozesses gelten, aber als Vorstufen der ersten lebenden Molekülarstruktur anzusprechen sind und anor- ganisch aus einfachsten Molekülen hervorgehen. Tat- sächlich kann nachgewiesen werden, daß sich in H_2O, in welchem alle Mineralsalze des Meerwassers gelöst sind Peptide und Aminosäuren bilden, wenn

über dem Wasser eine geeignete Atmosphäre aus N_2, O_2, CH_4, NH_3, CO_2, CN u. s. w. durch Ge- fäße führen welche elektrische Entladungen als Funkenstrecke in das mineralhaltige Wasser gehen. Peptide und Aminosäure Ketten aber bereits als Vor- stufen eines einmolekülartigen Organismus angesprochen wer- den. Demnach kann es im Gegensatz zur Auffassung or- ganischer Strukturen als zweidimensional geschichteten Mi- kroskopische eine materielle atomistische Theorie des Lebens- prozesses geben die aber wenig in eine mathematisch-physi- kalischen Theorie der Materie enthalten ist. Es besteht aber

die Möglichkeit zu bestehen, eine einheitliche mathematisch-physikalische Theorie der Materie so zu formulieren, daß ihre Aussagen dem Lebensprozeß Rechnung tragen und eine synthetische einheitliche Beschreibung der Materie und ihrer physikalischen Wechselwirkungen über diese Qualitätsaspekte aussteht.

9.7.62 Mit einer solchen Beschreibung ist aber die Forderung erfüllt, unter die sich hinsichtlich einer Theorie des elementaren Lebensprozesses unmittelbar aus der physikalischen Grundlagen Definition des Lebensvorganges ergeben hat. Es ist demnach zu erwarten, daß die

synthetische Theorie der Materie und ihrer Wechselwirkungen eine Theorie des Lebensprozesses impliziert.

1. Anmerkung zu Seite 83

Im allgemeinen ist die Reaktionsweise der Organismen akausal, jedoch bei Organismen, die sich selbständig bewegen können, stets gezielt, wenn irgend ein Lebensbedürfnis erfüllt oder ein Plan realisiert werden soll. Bei der gezielten Aktion verläuft die zeitliche Kausalfolge (Ursache → Wirkung) nicht linear sondern als Schleife. Die von Lebewesen verursachte Wirkung wird vom Organismus kontrolliert und dieser Wirkung entsprechend die Aktion so modifiziert, daß

die laufende Aktion des Organismus optimal gezielt ist. Gezielte Aktionen manifestieren sich aber stets ~~in~~ mit der Konstruktion - oder Destruktionsfähigkeit der Organismen die danach von selbst beweglichen Organismen willkürlich gesteuert werden kann. Derartige Willensäußerungen machen sich auch in einem gesetzmäßig beobachtbaren assoziativen Verhalten von Einzelorganismen gegen die Population eines Kollektivs der gleichen Art bemerkbar. Die Art dieser Willensäußerungen ist stets akausal doch setzt sie grundsätzlich eine bewußte Existenz voraus, dann gezielte Willensäußerungen der beobachteten Art sind nur möglich, wenn

die quantitativen Einflüsse der Umwelt nicht nur vom Organismus registriert und durch kybernetische Reflexe über Kausalschleifen ein Handlungsablauf ausgelöst wird, sondern die quantitativ-materiellen Wirkungen müssen in qualitative Erlebnisse umgesetzt werden. Nach solchen Beobachtungen scheint jeder materiellen Organismus, der zu aktiven, gezielten Willensäußerungsfähig ist von einer immateriellen psychischen Fähigkeit begleitet zu sein die aber in Regel einer psychosomatischen Korrelation mit dem Organismus steht. Durch diesen Korrelat wird eine von Organismus aufgenommene Umweltreflexion materieller Natur in eine

materielle psychische Erlebnisqualität transformiert und übergeht in Komplexe der Beobachtungen, ebenfalls immaterielle psychische Regungen über diese Komplexe die Aktionswelle der Sonne beeinflussen. (Fortsetzung siehe Bd III S. 1)

Weiterarbeitung Fortsetzung von Band XII Seite 94.

12.11.62 Das auf diese Weise exakt formulierte Komponentenproblem kann nach einer Transformation einmal weiterhin invariant werden. Mit dem natürlichen Orthogonalsystem $(\bar{e}_i\ \bar{e}_k)_q = \hat{E}$ und $\bar{a}_{kl} = \bar{e}_l / x_l \quad (\alpha(kl) - 1)$

$- \sum_{m \neq l} \frac{\bar{e}_m}{x_m}$ mit $(\alpha(kl) - 1) \frac{\mathfrak{f}}{\bar{e}_l} -$

$- \sum_{m \neq l} \frac{\mathfrak{f}}{\bar{e}_m} = \bar{a}_{kl} \sum_{s=1}^{q} \bar{e}_s \mathfrak{f}_s =$

$= \bar{a}_{kl}\ GRAD_q$, also $\bar{a}_{kl}\ GRAD_q\ \tau_{kl} =$

$= \lambda(kl)\ \tau_{kl} - \tau_{kl}^2 = \frac{1}{4} \lambda^2(kl) \left(1 - \left(\frac{2\tau_{kl}}{\lambda(kl)} - 1\right)^2\right)$, mit τ_{kl}

$\hat{u} = \pm \left(\frac{2\tau_{kl}}{\lambda(kl)} - 1\right)$ ist auch

$GRAD_q\ \hat{u} = \pm \frac{1}{2} \lambda(kl)\ \bar{a}_{kl}^{-1} (1 - \hat{u}^2)$

~~$\bar{a}_{kl}^2 \cdot \alpha_{kl} = 1$~~ bewirkt wobei

mit $\bar{n} = \sum_{s=1}^{q} \bar{e}_s \cdot n_s$ und nach einer Umkehrung mit $\mathfrak{f}\bar{n}$ stets

$\bar{a}_{kl}^{-1}\ \mathfrak{f}\bar{n} = \frac{x_l \mathfrak{f} n_l}{\alpha(kl)}$

$- \sum_{m \neq l} (a_m \mathfrak{f} n_m) = \mathfrak{f} N_{kl} =$

$= x_{kl} = const.$ wegen der Kürzbarkeit und $GRAD_q\ \hat{u}\ \mathfrak{f}\bar{n} =$

$= \sum_{s=1}^{q} \mathfrak{f}\hat{u} \cdot \mathfrak{f} n_s = \sum_{s=1}^{q} \mathfrak{f}\hat{u} =$

$= \mathfrak{f}\hat{u}$. Es ergibt sich also die invariante Form

$\frac{\mathfrak{f}\hat{u}}{1 - \hat{u}^2} = \pm \frac{1}{2} \lambda(kl)\ \mathfrak{f} N_{kl} =$

$= \pm \frac{1}{2} \lambda(kl) x_{kl} = \pm \Lambda_{kl}$ und dies

13.11.62

Kann man $\tilde{\mu} = TG\,\omega$ transformiert werden, was nach den Regeln der mehrfachen Differentiation

$$\pm \Lambda_{ke} = \frac{\mp \tilde{a}}{1-\tilde{a}^2} = COS^2\omega \cdot \mathcal{F} TG\,\omega =$$

$$= COS^2\omega \left(COS^2\omega - \tfrac{1}{2} SIN\,2\omega\, \mathcal{F}\omega\right)^{-1} \cdot \mathcal{F}\omega =$$

$$= \mathcal{F}\omega \left(1 - TG\,\omega\, \mathcal{F}\omega\right)^{-1} = \mathcal{F}\omega (1 - \mathcal{F} ln\, COS\,\omega)^{-1}$$

ergibt. Hieraus wird $\pm \Lambda_{ke}$

$$= \mathcal{F}\omega \pm \Lambda_{ke} \mathcal{F} ln\, COS\,\omega =$$

$$= \mathcal{F}\left(\omega \mp \tfrac{1}{2} ln \left(1-\tilde{\mu}^2\right)^{\Lambda_{ke}}\right) =$$

$$= \tfrac{1}{2} \mathcal{F} ln \frac{1+\tilde{a}}{1-\tilde{a}} \left(1-\tilde{\mu}^2\right)^{\mp\Lambda_{ke}}.$$

Da stets $\Lambda_{ke} = \tfrac{1}{2} \lambda(ke) \mathcal{F} N_{ke}$ sowie $\varkappa_{ke} = \mathcal{F} N_{ke}$ gesetzt werden kann, folgt, unter Entnahme der logarithmischen Integrationskonstanten $ln\, C_{ke}$ für das Mehrfachintegral nach Potenzierung $\frac{1+\tilde{a}}{1-\tilde{\mu}} \left(1-\tilde{\mu}^2\right)^{\pm\Lambda_{ke}} =$

$$= C_{ke}\, e^{\pm \lambda(ke) N_{ke}}.$$

In dieser Lösung müssen zunächst die beiden einfachen Zweige analysiert werden. Desgleichen ist auch die Be-

Anmerkung auf Seite 123

stimmung der C_{ke} notwendig, für die Lösung, die approximativ für alle N_{ke} und mehr oder weniger in den parabolischen approximierten Bereich fortgesetzt sowie auch durch eine, wenn die $\lambda(ke)$ und $\alpha(ke)$ so beschaffen sind, daß $\lambda(ke)\varkappa_s \ll 1$ also $\Lambda_{ke} \approx 0$ wird. Damit ist aber die Auswahl des Zweiges der Approximation $\frac{1+\tilde{a}}{1-\tilde{a}} = C_{ke}\, e^{\pm\lambda(ke)N_{ke}}$ = ~~[illegible]~~ gegeben. Mit $\tilde{\mu} = \pm\left(\frac{2\varphi_{ke}}{\lambda(ke)} - 1\right)$ wird die Abbildung

$$2\frac{\varphi_{ke}}{\lambda(ke)} = \pm \frac{f-1}{f+1} + 1.$$

Die Extrema des Verlaufes von φ_{ke} sind geometrisch durch $\mathcal{F}_s \varphi_{ke} = 0$, was, in das harmonische Feld = mittelsystem eingesetzt $f(ke) = \lambda(ke)$ liefert, und dies gilt für $\tilde{a}_{ext} = \pm 1$. Die nicht

Anmerkung auf letzter Seite

approximative Lösung erhält man für das linke Vorzeichen die divergierende Lösung $f = 0$, während das obere Vorzeichen ~~für divergiert~~ $f^{reell} \to \infty$ für einen imaginären Fall führt. Wichtig kommt also nur der negative Zweig von η in Betracht und dies bringt mit der natürlichen Zustandsfunktion $\eta_{ke} V^{N_{ke}} = \frac{\gamma_{ke}}{\lambda(ke)}$ den endlichen Lösungsfaktor $(1-\eta_{ke})^{\lambda_{ke}+1} \eta^{\lambda_{ke}-1} = 2^{-2\lambda_{ke}} C_{ke} e^{-\lambda(ke) N_{ke}}$ mit $V = \eta_{ke}$ und für die Approximation $\eta_{ke} \approx (1 + C_{ke} e^{-\lambda_{ke} N_{ke}})^{-1}$. Hat man der Koeffizienten $\lambda_{kl} \cdot N_{kl}$ imaginäre Glieder enthalten, dann nach den Untersuchungen über die kosmologische Weltarchitektur sind Kondensationen ohne irgendeinen imaginären Gitterfaktor

$a_s()_s$ mit $s > 3$ nicht möglich, weil bei allen diesen Kosmotopfunktionen die imaginäre Periodizität beständig innen mit Kondensationen wäre. Dies bedeutet aber, daß die Zahl $\lambda_{kl} N_{kl} + 0$ ganzzahlig sein muß, wenn die reelle selenarchische Architektur Π_3 zur Kondensation kommen soll. Dieser Sachverhalt bedeutet aber, daß auch $C_{ke} = a + ib$ mindestens komplex dargestellt werden muß und daß für $f = 0$ auch $(\lambda_{kl} N_{kl})^{reell} = \alpha + i\beta$ gesetzt, hineinsetzen in $f(reell) = 0$ liefert $0 = (a+ib) \frac{(reell)}{e} - (\alpha+i\beta) =$

$= e^{-\alpha} \cdot (a+ib)(\cos\beta - i \sin\beta) =$

$= e^{-\alpha}(a\cos\beta + b\sin\beta + i(b\cos\beta + a\sin\beta))$ daraus folgt $\operatorname{tg}\beta = -\frac{a}{b}$ und $\operatorname{tg}\beta = \frac{b}{a}$ folgen $e^{-\alpha} > 0$. daraus folgt aber $\operatorname{tg}^2\beta = -1$ oder $a^2 = -b^2$ was entweder der Realitäts-annahme $a = \pm ib$ zur Folge hat, wobei aber sowohl $c_{k\ell} \neq 0$ als auch $a = 0$ zur Folge hat, was zur Darstellung $c_{k\ell} = 2iB_{k\ell}$ führt. In der Klasse Komplexe Lösungen werden dürfen $N_{k\ell} = \nu_{k\ell}$; n und den Ansatz

$$\text{Lösung } \nu_{k\ell} = \frac{a_\ell \, (\;)_\ell}{a_{(k\ell)-1}} - \sum_{m\neq\ell} \frac{a_m}{b_\ell^{(k\ell)}} (\;)_m \frac{\psi_{k\ell}}{\lambda_{(k\ell)}} =$$

$$= \frac{\psi_{k\ell}}{\lambda_{(k\ell)}} \cdot [k^i \ell]\,; \; n =$$

$= \psi_{k\ell}$; n daher ein Linear-

aggregat von Fundamentallösungen dargestellt werden kann. Das reale Lösungsintegral des homogenen Fundamentalproblems wird also als Vektor beschrieben durch

$$\left(\frac{()}{()} - \psi_{k\ell}\right)^{1_{k\ell}+1} \cdot \psi_{k\ell}^{1_{k\ell}-1} =$$

$$= 2^{-2\,1_{k\ell}} \cdot c_{k\ell} \cdot e^{-\lambda_{k\ell} \nu_{k\ell}} \cdot \left(\frac{()}{()} + 2i B_{k\ell} \cdot e^{-\lambda_{(k\ell)} \nu_{k\ell}}\right)^{j-1},$$

$$\Lambda_{k\ell} = \frac{a_\ell}{a_{(k\ell)-1}} - \sum_{m\neq\ell} a_m\,,$$

$$M = \frac{a_\ell}{a_{(k\ell)}} \sum_{m=1}^{q} a_m (\;)_m\,,$$

$$c_{k\ell} = \text{const.}\,,$$

$$\psi_{k\ell} = \frac{b_\ell^{(k\ell)}}{\lambda_{(k\ell)}} [k^i \ell]$$

gleichmäßig 118

($b_\ell^{(k\ell)}$ und $\lambda_{(k\ell)}$ erklären)

Da $\psi_{kl} \cdot n$ im Exponenten von $(\lambda_{(kl)} \cdot n)_{ext} = \alpha + i\beta$ ist folgt für die Extrema $e^{-\alpha} \cdot e^{-i\beta} = e^{-\alpha}(\cos\beta - i\sin\beta) = 0$, was wegen $e^{-\alpha} > 0$ nur für $\cos\beta - i\sin\beta = 0$ oder $\cos\beta = 0$ und $\sin\beta = 0$ für $\alpha < \infty$ erreichbar ist. Die imaginären Folgen von Extremwertpunkten, also eigentlich Eigenwertspektren (als Polekurven aufgefasst) kann man $\beta_+^{(+-)} = \pm\frac{\pi}{2}(2n_+ + 1)$ aus $\cos\beta_+ = 0$ und $\beta_-^{(\pm)} = \pm\pi n_-$ aus $\sin\beta_- = 0$ da nach [illegible] $n_+ = n_-$ die positiven ganzen Zahlen gleichsinnig durchlaufen werden können ergeben sich die folgenden Komplementaritäten: $\beta_+^{(+)} + \beta_-^{(-)} = \frac{\pi}{2}$ und $\beta_+^{(-)} + \beta_-^{(+)} = -\frac{\pi}{2}$, was aber

zu $\beta_+^{(\pm)} + \beta_-^{(\mp)} = \pm\frac{\pi}{2}$ zusammengefasst werden kann. Die Eigenwertspektren des ersten Integrals werden zusammen mit den Komplementärdata des Eigenwertspektrums beschrieben durch (als Polekurven aufgefasst)

$$\beta_+^{(\pm)} = \pm\frac{\pi}{2}(2n_+ + 1),$$
$$\beta_-^{(\pm)} = \pm\pi n_-,$$
$$\beta_+^{(\pm)} + \beta_-^{(\mp)} = \pm\frac{\pi}{2},$$
$$n_\pm \geq 0,$$

118

Gleichung a

Und diese Komplementärspektren beschreiben durch ihre positiven ganzen Quantenzahlen $n_\pm$ die durch [ ] beschriebenen metrischen Kondensationsstufen des harmonischen Kondensationsfeldes als Kondensationsfelder

eines kontinuierlichen Linkstraumes R_q vom metrischen Volumenkontinuum $\mathfrak{K}_6$, dabei stets $q \leq 6$ ist. (Hier Band XII Seite 118 einfügen).

15.11.62 Die früher [118] bestimmten Komponenten des Fundamentaltensors hat mit allen regulären Affinitäten invariant und müssen als partielle Metrikdifferentiale des räumlichen invarianten Linkselektors $\overset{2}{\gamma}$ aufgefaßt werden, für den aber in der euklidischen Hyperebene $\overset{2}{\gamma} = \overset{2}{\gamma}^*$ gilt. Zu dem Kontravariantor $\gamma_{ik} = \frac{b_i^{(ke)}}{\lambda(ke)} [k^i e]$ ist γ_{ke} nach [118] bekannt. Mit dem normierten Orthogonalsystem $(\bar{e}_i \; \bar{e}_k) = \overset{2}{E}$ des kontinuierlichen Koordinaten-

wird $\frac{b_i^{(ke)}}{\lambda(ke)} [k^i e] = \left(\sum_{s=1}^{q} \bar{e}_s \frac{b_s^{(ke)}}{\lambda(ke)} \right)$.

$\bar{e}_i [k^i e] = \frac{b_{(ke)}}{\lambda(ke)} \bar{e}_i [k^i e]$,

also

$\bar{\gamma} = \sum_{k,e=1}^{q} \lambda(ke) \, b^{-1}_{(ke)} \, \gamma_{ke} =$

$= \sum_{ke=1}^{q} \bar{e}_i [k^i e]$ oder $\gamma_s = \bar{e}_s \bar{\gamma} =$

$= \sum_{ke=1}^{q} \bar{e}_s \bar{e}_i [k^i e] =$

$= \sum_{ke=1}^{q} \delta_{is} [k^i e]$ bezw. $\gamma_i = \sum_{ke=1}^{q} [k^i e]$,

womit die Elimination der Kontravariantkomponenten gelungen ist. Mit den Kategorien $\sum_{k=1}^{q} \gamma_{ik} = \gamma_i$ und $\sum_{i=1}^{q} \gamma_i = \gamma$ und ~~diese Formeln~~ einer Verwendung von $\overset{2}{\gamma} = \overset{2}{\gamma}^*$ dieser Kovariante finden wir $\gamma_i = \sum_{k,e=1}^{q} [k^i e] =$

$= \gamma^{is} \sum_{kl=1}^{q} [s\,k\,e] = \frac{1}{2} \gamma^{is} \sum_{ke=1}^{q} (\underline{\delta}_k \gamma_{se} +$

$+ \underline{\delta}_e \gamma_{ks} - \underline{\delta}_s \gamma_{ke}) =$

$= \frac{1}{2} \gamma^{is} \left(2 \underline{\delta} \gamma_s - \underline{\delta}_s \gamma \right)$. Hat kann

$y_i \underline{f} \cdot y^{\frac{i}{s}} = \int^{\frac{s}{}} \frac{()}{()} = \int_{j^s} \frac{()}{()}$

wegen der kovarianten Summationsregel verschwindet daher, es folgt $\sum_{i=1}^{q} 2\gamma_i\, y_i \underline{f} = y_j\, y^{\frac{i}{s}} (2 \underline{f} y_s - \underline{f}_s y) = \delta_{sj} (2 \underline{f} y_s - \underline{f}_s y) =$

$= 2 \underline{f} y_j - \underline{f}_j y$. Summation längs j liefert dann $\sum_{i=1}^{q} 2\gamma_i\, y_i =$

$= \sum_{j=1}^{q} (2 \underline{f} y_j - \underline{f}_j y) =$

$= \underline{f} y - \sum_{i=1}^{q} \underline{f} y_i$ oder

$\sum_{i=1}^{q} (2\gamma_i\, y_i - \underline{f} y_i) = 0$ was nur für $2\gamma_i\, y_i = \underline{f} y_i$ möglich ist. Mit $\frac{1}{y_i} \underline{f} y_i = \underline{f} \ln y_i =$

$= 2\gamma_i$ sowie $\bar{\alpha} = \sum_{s=1}^{q} \bar{e}_s\, \alpha_s$,

ferner $\bar{Z} = \sum_{s=1}^{q} \bar{e}_s ()_s$ und dann

Faktor $\mu = \sum_{s=1}^{q} \alpha_s ()_s = \bar{\alpha}\, \bar{Z}$

wird wegen $\underline{f} \ln y_i = \bar{\alpha}^{-1}\, GRAD_q \ln y_i$

also $GRAD_q \ln y_i = 2\gamma_i\, \bar{\alpha}$ die lineare

Integration möglich, denn es ist

$GRAD_q \ln y_i \cdot \underline{f} \bar{Z} = \sum_{s=1}^{q} \underline{f}_s \ln y_i =$

$= \underline{f} \ln y_i$ und $2\gamma_i\, \bar{\alpha}\, \underline{f} \bar{Z} =$

$= 2\gamma_i\, \underline{f} \mu$. Mit der logarithmischen Fakultätsdifferenz $\ln A_i^{\bar{}}$ wird das Integral zu $\underline{f} \ln y_i = 2\gamma_i\, \underline{f} \mu$ umformbar. Es folgt $\ln y_i - \ln A_i^{\bar{}}$

$= 2 \sum \gamma_i\, \underline{f} \mu = 2 \cdot \sum \sum_{\kappa\varepsilon=1}^{q} \frac{\lambda(\kappa\varepsilon) \cdot \gamma_{\kappa\varepsilon}\, \underline{f} \mu}{b_i^{(\kappa\varepsilon)}}$

$= 2 \sum_{\kappa,\varepsilon=1}^{q} \frac{\lambda(\kappa\varepsilon)}{b_i^{(\kappa\varepsilon)}} \sum \gamma_{\kappa\varepsilon}\, \underline{f} \mu =$

$= \sum_{\kappa\varepsilon=1}^{q} c_{\kappa\varepsilon}^{(i)} \cdot \sum \gamma_{\kappa\varepsilon}\, \underline{f} \mu$ für diese

Integralsumme gilt Kürzung

die Koeffizienten $c_{\kappa\varepsilon}^{(i)}\, b_i^{(\kappa\varepsilon)} =$

$= 2\lambda(\kappa,\varepsilon)$ und das Theorem

$\sum \sum = \sum \sum$ vertauscht Indizes

Maß der Potenzierung

ergeben sich als Summen

Kürzungen die Summen

der logarithmischen Komponen-

len des Fundamentalsatzes zu

$$\sum_{k=1}^{q} \gamma_{ik} = A_i \exp\left(\sum_{k,e=1}^{q} c_{ke}^{(i)} \int \psi_{ke} \, d\mu\right),$$

$$c_{k,e}^{(i)} \, b_i^{(k,e)} = 2\,\lambda(k,e),$$

$$\mu = \sum_{s=1}^{q} \alpha_s \, (\,)_s$$

~~448~~ 119

Gleichung ~~A~~

† Wenn also nach Gl. 118 die partiellen Koeffizienten ψ_{ke} bekannt sind, dann bestehen nach Gl. 119, die Möglichkeit, das gesuchte Wahrscheinlichkeitsfeld zu finden und den Fundamentalsatz des Kompositionsfeldes explizit zu beschreiben, dem zufolge das ~~Kompositum~~ Wahrscheinlichkeitsfeld im

allgemeinsten Fall gelöst worden ist. Kapitel XI

22.11.62 Aus Gl. 119 Können die Extrema der kanonischen γ_{ik} ermittelt werden. Nach der mathematischen Extremwerttheorie müssen diese Extrema bei $\int \gamma_{ik} = 0$ für alle kanonischen Funktionen bleiben, was $[\psi_{ke}]_{ext} = 0$ sowie $[\gamma_{ke}]_{ext} = 0$ und daher auch $\psi_{k,e}^{(e)} = \frac{b_i^{(ke)}}{\lambda(k,e)} [\gamma_{ke}]_{ext} = 0$ ergibt. Die gleiche Bedingung folgt auch aus $\int \sum_{k=1}^{q} \gamma_{ik} = 0$. Denn nach Gl. 119 wird

$$0 = \int A_i \exp\left(\sum_{k,e=1}^{q} c_{ke}^{(i)} \sum \psi_{k,e;}() \, d\mu\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{q} \gamma_{ik} \int \sum_{k,e=1}^{q} c_{k,e}^{(i)} \sum \psi_{k,e;}() \, d\mu =$$

$$= \sum_{k=1}^{q} \gamma_{ik} \sum_{k,e=1}^{q} c_{k,e}^{(i)} \, \psi_{ke}^{(e)};() \, d\mu,$$

weil $\int \sum \psi_{ke;}() \, d\mu = \psi_{ke;}() \, d\mu$ ist. Da nunmehr

$\sum_{k=1}^{q} \gamma_{ik} \neq 0$ sowie $c_{k,e}^{(i)} \neq 0$ und $\delta\mu \neq 0$ bleiben, kann

$\sum_{k=1}^{q} \gamma_{ik} \sum_{k,e=1} c_{k,e}^{(i)} \psi_{k,e}^{(e)}$; () $\delta\mu = 0$

mit für $\psi_{k,e}^{(e)} = 0$ erfüllt werden.

Dann ist dem ersten Vektor-

integral der Gl 118 dieser Null-

vektor in das registrierte erste

Determinantglied eingesetzt wird

dann folgt als Bedingung

für Existenz $(e^{-\lambda_{k,e}^{(i)} \mu_{k,e}})^{-1}_{esct} \sim$

$\sim \lim_{\psi_{k,e} \to 0} \psi_{k,e}^{1-\lambda_{k,e}} (E - \psi_{k,e})^{-1-\lambda_{k,e}} =$

$= \lim_{\psi_{k,e} \to 0} \psi_{k,e}^{1-\lambda_{k,e}} = 0$ weil immer

$\lambda_{k,e} \ll 1$ ist. Mit $(\lambda_{k,e}^{(i)} \mu_{k,e})_{esct}$

$= \alpha + i\beta$ wird demnach

$(e^{\lambda_{k,e}^{(i)} \mu_{k,e}})_{esct} = |e^{\alpha}(\cos\beta + i \sin\beta)| =$

$= 0$, woraus für die Existenz

der γ_{ik} die periodischen Be-

dingungen $\cos\beta = 0$ und $\sin\beta = 0$

folgen. Es bedeutet aber, daß die

Existenz der betrachteten Kom-

ponenten von $\overset{2}{\gamma}$ nach Gl 118b

mit den Eigenvektoren des diskreten

Kondensatoraggregats $\psi_{k,e}$ zusam-

menfallen. F

Schließlich kann versucht werden,

aus Gl 119 die γ zu eliminie-

ren. Nach der i_{te} Iteration

rechnung mit einer Koordinate

mehr als $q > 1$ sein, wenn

es für Bildung von Kondensa-

torenstufen kommen soll.

Wenn aber $q > 1$ ist, dann

ist auch $\frac{q}{2}(q+1) > q$.

Symbolisch $\overset{2}{\gamma} = [\gamma_{ik}]_q$ mit

$q \leq 6$ den betrachteten

Abschnitt als $\overset{2}{\gamma} = \overset{2}{\gamma}^{+}$ dann

ist auch $\overset{2}{\gamma}_q = \overset{2}{\gamma}_q^{+}$, sodaß

F Anschluß auf Seite 124

Die q $1 \leq i \leq q$ Gleichungen $\sum_{k=1}^{q} \beta_{ik}$ insgesamt $\binom{q}{2} + q = \frac{q}{2}(q+1) > q$ unbekannte Koeffizienten β_{ik}. Aus diesem Grade ist eine algebraische Elimination nicht möglich doch kann durch eine Substitute Transformationsmatrix $S \cdot S^{-1} = \bar{E}$ durchgeführt werden, mit deren Hilfe das diagonalisieren $S^{-1}_{ij} \cdot S^{-1}_{jk} = \bar{\beta}_{ik} = \beta_{ii} \delta_{ik}$ β_{ii} erreicht wird. Eine derartige Tensortransformation ist aber ~~auch~~ eine Koordinatenänderung. Sind die ~~Koe~~ orthogonalen Koeffizienten β_{ik} dieser Matrix in $\hat{\beta} = (\beta_{ik})_q$ enthalten, dann

ist $\hat{\beta} \cdot \hat{\beta}^{x} = \hat{E}$ und für die Koordinatenselektoren bedeutet $\beta_{ik}()_i = \sum_{k=1}^{q} \beta_{ik}()_k$ und die Matrix für den linearen Selektor $\mu = \sum_{s=1}^{q} \alpha_s ()_s$ die Transformation $\mu = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i ()_i = \sum_{i,k=1}^{q} \alpha_i \beta_{ik} ()_k = \sum_{k=1}^{q} \beta_k ()_k$ mit $\beta_k = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \beta_{ik}$ gilt. Umgekehrt kann aber für den ebenfalls linearen Selektor $\mu_{ke} = \bar{\alpha}_{k,e} \bar{\alpha}^{-1} \mu$ mit $\bar{\alpha}_{k,e} = \frac{\bar{e}_k \cdot \alpha_e}{\alpha(ke)-1} - \sum_{m \neq e} \bar{e}_m \cdot \alpha_m$ und $\bar{\alpha} = \sum_{s=1}^{q} \bar{e}_s \bar{\alpha}_s$ gesetzt werden, sodaß sich $\nu_{ke} = \varepsilon_{ke} \mu$ mit der Matrix $\varepsilon_{ke} = \bar{\alpha}_{ke} \bar{\alpha}^{-1} = (\alpha(kl)-1)^{-1} + 1 - q$ ergibt, und dies bedeutet mit Gl. 115 das transformierte Koordinatendifferential $\Psi_{k,e}$, welches

Ferner ist μ ein Maß, die jeweils [illegible] Maß auf Σ [illegible] Kompressionen bezeichnet, so ist damals $A_i \exp\left(\sum_{k,\ell=1}^{q} c_{k,\ell}^{(i)}\right) = \sum_{k=1}^{q} \psi_{ik} = \sum_{k=1}^{q} \psi_{ii}\,\delta_{ik} = \psi_{ii}$, nach dieser Formel [illegible] Kompressionen also die Zahl der $q(q+1)$ Kompressionen die q diagonalen [illegible], für die es nach [illegible]

$$\psi_{ii} = A_i \exp\left(\sum_{k,\ell=1}^{q} c_{k\ell}^{(i)}\right) = \sum \psi_{k\ell;i}()\,\delta\mu,$$

$$\sum \hat{\psi}_q \hat{\Sigma}^x = \hat{\psi},$$

$$\sum \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\Sigma}^x = \hat{E},$$

$$\hat{\beta} + \hat{\beta}^x = \hat{E}, \quad \mu = \sum_{k=1}^{q} \beta_k(\,)_k,$$

$$\beta_k = \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \beta_{ik}, \quad \psi_{k\ell} = \varepsilon_{k\ell}\mu,$$

$$\varepsilon_{k,\ell} = (\alpha(k\ell) - 1)^{-1} + 1 \cdot q,$$

119r

Gleichung (1)

Maß q Bestimmtheitsgleichungen offen.

Für Vektoren der ψ_i i 119r nach Gleichung (1)

$$\sum \psi_{k\ell;i}()\,\delta\mu = \text{, allein Maß}$$

$$\sum \psi_{k\ell;i}()\,\delta\mu$$

bestimmt. Nach Gleichung (1) ist $\psi_{k,\ell}$ ein [illegible] dann Vektor für [illegible] λ - Werte, immer die Approximationsmöglichkeit $\lambda_{k\ell} \approx \alpha$

$$\sum \psi_{k\ell;i}()\,\delta\mu,$$

also $\psi_{k,\ell} \approx (1 + 2i B_{k\ell}\, e^{-\lambda(k,\ell)\mu_{k,\ell}})^{-1} = (1 + \exp(-\lambda(k,\ell)\varepsilon_{k,\ell}\mu + \ln 2iB_{k,\ell}))^{-1}$, [illegible] weiter linearen Vektor $y = \lambda(k,\ell)\varepsilon_{k,\ell}\mu - \ln 2iB_{k,\ell}$ sowie $x = e^{\frac{y}{2}}$ und $\eta = \alpha R S^x$ Vektor approximativ für den Faktorialvektor $\lambda(k,\ell)\varepsilon_{k,\ell} \sum \psi_{k,\ell;i}()\,\delta\mu \approx$

$$\approx \int (1+e^{y})^{-1} \, dy = \int (e^{\frac{y}{2}} + e^{-\frac{y}{2}})^{-1} e^{\frac{y}{2}} \, dy$$

$$= 2 \int (e^{\frac{y}{2}} + e^{-\frac{y}{2}})^{-1} \, d e^{\frac{y}{2}} = 2 \int \frac{x \, dx}{1+x^2} =$$

$$= 2 \int \operatorname{Tg} \eta \, d\eta = 2 \int d \ln \cos \eta =$$

$$= 2 \ln \cos \eta = \ln (1+e^{y}), \text{ also}$$

$$\int \psi_{\kappa,\ell;i}(\mu) \, d\mu \approx \frac{1}{\lambda(\kappa,\ell)\, \varepsilon_{\kappa,\ell}} \ln (1+e^{y}).$$

Mit den Koeffizienten $(\kappa,\ell,i) = \frac{c^{(i)}_{\kappa\ell}}{\lambda(\kappa,\ell)\,\varepsilon_{\kappa,\ell}}$ wird dann approximativ

$$\psi_{\mu i} \approx A_i \cdot \exp\left(\sum_{\kappa,\ell=1}^{q} c^{(i)}_{\kappa,\ell} \int \psi_{\kappa,\ell;i}(\mu) \, d\mu \right) \approx$$

$$\approx A_i \exp \sum_{\kappa,\ell=1}^{q} (\kappa\ell i) \ln (1+e^{y}) =$$

$$= A_i \exp \ln \prod_{\kappa,\ell=1}^{q} (1+e^{y})^{(\kappa,\ell,i)} =$$

$$= A_i \prod_{\kappa,\ell=1}^{q} (1+e^{y})^{(\kappa,\ell,i)}, \text{ also}$$

$$\psi_{i,i} \approx A_i \prod_{\kappa,\ell=1}^{q} \left(1 - 2i B_{\kappa,\ell} \, e^{\lambda(\kappa,\ell)\, \nu_{\kappa\ell}}\right)^{(\kappa,\ell,i)}.$$

Dies approximative explizite Darstellung,

$\int y =$ $\lambda_{\kappa,\ell} \approx 0$, $\psi_{i,i} \approx A \prod_{\kappa,\ell=1}^{q} (1 - 2i B_{\kappa\ell} \cdot e^{\lambda(\kappa\ell)\, \nu_{\kappa,\ell}})^{(\kappa,\ell,i)}$,

$(\kappa,\ell,i) = \frac{c^{(i)}_{\kappa,\ell}}{\lambda(\kappa,\ell)\,\varepsilon_{\kappa,\ell}}$,

Gleichung 120a

liegt in der Approximation zwischen der exakten mechanischen Lösung und der infinitesimalen approximation $\tau \to 0$ vor, hat trotz $\lambda_{\kappa,\ell} \approx 0$, nimmt noch ein höheres Grad an Präzision zu kommt als der infinitesimalen Darstellung durch eine Fold Potenzreihe Ähnlichkeit.

1.12.62 (zu Seite 115) Für anomalen, desintegrierenden Kompositkörper mit elastischen Kernen für die einzelnen kernmechanischen Spezialfälle existiert

Gültigkeits-

es zweckmäßig, die einzelnen Bereiche der Darstellungsgüte in Approximationsstufen zu unterteilen. Auf jeden Fall muß gefordert werden, daß eine bijektive Korrespondenz aller dieser Approximationsstufen existiert. Der Verlauf der kennzeichnenden Komponenten $\gamma_{\kappa,\varepsilon}$ wird wesentlich durch den linearen Index $\lambda_{\kappa,\varepsilon}$ bestimmt, von diesen Verläufen die betreffende Approximationsstufe abhängt. Im ersten Gültigkeitsbereich der als methodischer Bereich bezeichnet werden kann, sind die Methodenziffern niedrig, sodaß der größenordnungsmäßige $\lambda_{\kappa\varepsilon\mu;n} \approx \lambda_{\kappa,\varepsilon}$ gesetzt werden muß, wodurch hervorgeht, daß im methodischen

Bereich nicht die Approximation $\lambda_{\kappa,\varepsilon} \approx 0$ durchgeführt werden darf. Erst im zweiten Gültigkeitsbereich dem Approximationsbereich kann Methodenziffern, wird $\lambda_{\kappa\varepsilon\mu;n} \geq \lambda_{\kappa,\varepsilon}$ was zur Approximationsmöglichkeit $\lambda_{\kappa,\varepsilon} \approx 0$ führt (hier die entsprechenden Approximationen vorgenommen werden). Der dritte Gültigkeitsbereich ist dadurch gekennzeichnet, daß die Methodenziffern so groß werden, daß im Verhältnis zu den anderen geometrischen Abmessungen des Motors praktisch vernachlässigt werden können. Mit diesen Approximationsstufen dieses Faktorisationsbereiches ist also durch $\tau \to 0$ und $n \to \infty$ gekennzeichnet. Mit $\bar{y} = \sum_{s=1}^{q} \bar{e}_s$ wird unter Berücksichtigung dieser Faktorisa-

molapprox'mativ dann, $\mu \cdot n = \sum_{s=1}^{q} \bar{\xi}_s a_s n_s \to \bar{\eta}_0 \cdot \eta = \pm \eta$
$= \bar{\eta}_0 \cdot \sum_{s=1}^{q} \bar{\xi}_s a_s n_s \to \bar{\eta}_0 \cdot \eta = \pm \eta$
mit $\eta^2 = \sum_{s=1}^{q} x_s^2$, also $\eta = \pm \left(\sum_{s=1}^{q} x_s^2 \right)^{\frac{1}{2}}$.

Da die reellen Koordinaten des $R_3 \equiv S_{(1)}$ immer mit gemeinsame als eine semantische Architektur erscheinen, kann für diese reellen Größen $\rho^2 = \sum_{\kappa=1}^{3} x_\kappa^2$ gesetzt werden sodaß die $q-3$ imaginären Koordinaten zu $-\sigma^2 = \sum_{s=4}^{q} x_s^2$ zusammengefaßt sind. Damit wird $\sigma = \sqrt{\sigma^2 - \rho^2}$, während aber $\pm i \cdot \eta$ im dritten Gültigkeitsbereich mit $\tau \to 0$ auch $\lambda_{\kappa,e} \to 0$ wird. Somit folgt für den infinitesimalen Bereich

$\psi_{\kappa,e}(x_s)_1^q = \left(1 + \frac{\text{konst}}{2\tau} \cdot e^{\pm i \lambda_{\kappa,e} \eta}\right)^{-1}$,
$\eta^2 = \sigma^2 - \rho^2$, $-\sigma^2 = \sum_{s=4}^{q} x_s^2$

gleichen

120a

Dann die Selektorcoïncidenz wird bei infinitesimaler Approximation einfach $\psi_{\kappa,e}; n \to \psi_{\kappa,e}(x_s)_1^q$ ganz Feldfunktion. Solange $\rho < \sigma$ bleibt, liegt wegen $e^{\pm i \lambda_{\kappa,e} \eta} = \cos \lambda_{\kappa,e} \eta \pm i \sin \lambda_{\kappa,e} \eta$ ein Exponentialproblem vor d. h. die Kondensationsstufen erscheinen nunmehr als Abstände Eigenwerte von Quantenstufen über einem nicht metrischen Koordinatenbereich. Erst für $\rho \geq \sigma$, also $\eta = i \sqrt{\rho^2 - \sigma^2}$ wird das Exponential reell, und dies bedeutet daß $\psi_{\kappa,e}$ für beide Zweige sich einem Konstanten Festwert exponentiell nähert. Damit wird gleich die Existenz eines weiten Gültigkeitsbereiches nämlich des makroskopischen Bereiches,

angedeutet. Wird nämlich $p \gg S$, so kann $\gamma \approx ip$ gesetzt werden. Überdeckt rücken nach dem Korrespondenzprinzip, bezogen auf die Abstände zwischen den Randkurven so dicht zusammen, daß das Eigenwertspektrum $\lambda_{K,\ell} \to \lambda$ das Kontinuum eines Streckenspektrums annimmt. Hier sind die einzelnen Elemente (K,ℓ) nicht mehr unterscheidbar, sodaß $\psi_{K,\ell} = \psi(x_s)_1^q$ und $C_{K,\ell} = C$ gesetzt werden kann. In dieser makroskopischen Approximation

$p^2 \gg S^2$, $\psi = \left(1 + \frac{C}{2} B e^{\pm \lambda p}\right)^{-1}$,

Gleichung 120 b

liegt also ebenfalls für beide Zweige ein reziprozitätsloses Abklingungsgesetz vor, dessen Verlauf [illegible]

Falle des negativen Zweiges als Reihe entwickelt werden kann, die genug nach der Größenordnung von p wiederum approximativ nach irgend einer Glieder abgebrochen werden darf.

Anmerkung zu Seite 96

Es dieser Lösung mit $\bar{a}^{-1}_{K,\ell}$ und $\bar{\alpha} = \sum_{s=1}^{q} \bar{c}_s \alpha_s$ (Faktorisierung) die Exponenten $\lambda(K,\ell) N_{K,\ell} = \lambda(K,\ell) \bar{a}^{-1}_{K,\ell} \cdot \bar{\alpha}^{-1} \sum_{\ell=1}^{q} \alpha_s \nu_s$ $= \lambda(K,\ell) \varepsilon_{K,\ell} \mu$; in Umformung. Hier ist $\mu = \sum_{s=1}^{q} \alpha_s ()_s$ ein linearer Selektor und $\varepsilon_{K,\ell} = \bar{a}_{K,\ell}^{-1} \cdot \bar{\alpha}^{-1} =$ $= (a(K,\ell)^{-1})^{-1} + 1 - q$ mit von den $\lambda_m(K,\ell)$ und der Kettenbruchentwicklung q abhängiger Faktor. Auch $\lambda(K,\ell)\varepsilon_{K,\ell}$ ist in dieser Weise nur von den $\lambda_m(K,\ell)$ abhängig, sodaß $\lambda(K,\ell)\varepsilon_{K,\ell} = \lambda_{K,\ell}$ als reines Spektrum von

Kondensatorstufen eingefügt werden kann. Der Exponent vereinfacht sich damit zu $\lambda(\kappa,\ell)\cdot N = \lambda_{\kappa,\ell}\,\mu;\ n.$ Die Approximationen $\lambda_{\kappa,\ell} \approx 0$ sind bei den exakten Lösungen verwendet worden, siehe den Absatz auf S. 117 als Gleichung c.

Anmerkung zu Seite 111

Für $\psi_{\kappa,\ell}$ gibt es, nach dieser Untersuchung, zwei verschiedene Extrema, nämlich $\psi_{\kappa,\ell}^{(min)} = 0$ und $\psi_{\kappa\ell}^{(max)} = \mathrm{III}\,E$, welche mit den Extrema der $\gamma_{\kappa,\ell}$ zusammenfallen. Diese Extrema der $\gamma_{\kappa,\ell}$ können aber nur Wendestellen sein, die sich mit den Minima der Kondensatoraggregate decken, denn $\psi_{\kappa,\ell}^{(extr)}$ ist an $\Sigma\psi_{\kappa,\ell} = 0$, also an $\Sigma^2\psi_{\kappa,\ell} = 0$ gebunden,

während $\gamma_{\kappa,\ell}^{(extr)}$ wiederum $\psi_{\kappa,\ell} = 0$ fordert. Es gibt demnach eine periodische Folge von Minima und Maxima der linearen Kondensatoraggregate, während die Extrema der kennzeichnenden Koeffizienten des Fundamentalsystems als Umkehrbezirke mit den Minima der Linearaggregate zusammenfallen. Für diese $\gamma_{\kappa,\ell}^{(w)}$ gilt demnach

$$\gamma_{\kappa,\ell}^{(w)} \equiv \psi_{\kappa,\ell}^{(min)} = 0,\quad \psi_{\kappa\ell}^{(max)} = \mathrm{III}\,E$$

Gleichung 119 b

deren Folge von den komplexen Farben Spektren bestimmt wird.

6.12.62

3. Imaginäre Kondensationen

Nach der Partialbruchzerlegung [115] kann der Verlauf des Kondensationsaggregates ebenso wie derjenige des Fundamentalselektors vom linearen Argumentselektor μ ab und dieser Selektor wird von den $1 \leqq i \leqq q$ Koeffizienten $\alpha_i^2 = \pm\tau$ derjenigen Unterselektoren bestimmt in denen die Hermetrie existiert. Nach den Untersuchungen der hermetrischen Selbstarchitektur muß aber die zugehörige Einheit $s_{(3)}$ immer hermetrisch sein sonst, wegen $\mathfrak{E}_5 = i\sqrt{\tau}(\,)_5$, der Argumentselektor $\mu = \sum_{l=1}^{q} \alpha_l (\,)_l$ niemals reell sondern nur imaginär oder Komplex sein kann. Folgedessen gibt es nur zwei Grundklassen von Kondensationen

des R_6, nämlich imaginäre und Komplexe von denen zunächst die imaginären untersucht werden sollen.

Eine imaginäre Hüllkurvenkondensation liegt vor, wenn $\operatorname{re}\mu = 0$ ist d.h. wenn eine Antikommutante des R_3 vorliegt, denn nur ist im R_6 reell. Da außerdem stets $s_{(3)}$ in der Umgebung der Kondensierenden nicht, wenn überhaupt irgendeine Hüllkurve existiert und mindestens zwei semantische Architektureinheiten hermetisch sein müssen, wenn es zur Ausbildung von Kondensationsstrukturen kommen soll, gibt es für die imaginären Kondensationen grundsätzlich nur drei Möglichkeiten.

Es sind dies

a) die transfiniten Selbstkondensationen in $s^{(3)}$ und $s^{(4)}$ bei einer antihermetischen der durch $s^{(1)}$ und $s^{(2)}$ bestimmten Zonenwelt R. Sie in diesem Fall als antisymmetrisch. Sonstige transfiniten Selbstkondensationen sollen bezeichnet werden.

b) Zeitkondensationen bei zeitlicher antihermetrie also Kondensationen in $s^{(2)}$ und $s^{(3)}$.

c) Zeitkondensationen bei zeitlicher Hermetrie für welche nur noch der R_3 antihermetrisch ist.

11.12.62 In jedem Fall müssen bei diesen imaginären Hermetrie-

die ψ_{ke} formen von den reell zählenden Elementarelektronen die μ mindestens so sein d. h. die Koordinaten des R_3 können nur als Konstante Größen, also reell ~ ~ ~ in den ψ_{ke} enthalten sein. Demnach können grundsätzlich im R_3 Parallelstromlaktionen durchgeführt werden, sodaß immer $\mu = 0$ und $\mu = -\mu^+$ reell imaginär wird, wodurch die imaginären Kondensationen charakterisiert sind. Zur Analyse der Kosmogenese dieser drei imaginären Kondensationen wird die Bestimmung der ψ_{ke} in ψ_{ke} wesentlich. Zu diesem Zweck muß die Konvergenz von $\psi \cdot \psi^+$ verbessert werden, weil für die

Kondensationen, wegen der Hermitizität des Kollisionoperators und des diskreten Spektrums der Kondensationsstufen, ein abzählbar unendliches Funktionensystem aufspannen. Es ist $\psi_{\kappa,\ell} = \psi^{+}_{\kappa,\ell}$ also $\psi_{\kappa,\ell}\cdot\psi^{+}_{\kappa,\ell} = \psi^{2}_{\kappa,\ell}$; während aus der Fassung $\frac{\int \bar{a}}{E-\bar{a}^2} = -\frac{1}{2}\lambda(\kappa,\ell)\,\bar{a}^{-1}_{\kappa,\ell}$ $= -\frac{1}{2}\lambda(\kappa,\ell)\,\varepsilon_{\kappa,\ell}\int\mu =$ $= -\frac{1}{2}\lambda_{\kappa,\ell}\int\mu$ mit $\mu = E^{-2}\psi_{\kappa,\ell}$. die Darstellung $\psi^{2}_{\kappa,\ell} = \psi_{\kappa,\ell}$ $-\frac{1}{\lambda_{\kappa,\ell}}\frac{\int\psi_{\kappa,\ell}}{\int\mu}$ folgt, daß zunächst der Fall c) ausgeschlossen, sodaß nur zwei prinzipiell verschiedene Kondensationsformen, deren gilt $\mu = \alpha_5(\,)_5 + \gamma$, wobei $\gamma = \alpha_{4,6}(\,)_{4,6}$ sein kann. Das mehrmalige Integrationsvo-

lumen Ω; n ist also als ein Imaginärteil R_2 aufzufassen da $\psi_{\kappa,\ell}\cdot\psi^{+}_{\kappa,\ell} - \psi^{2}_{\kappa,\ell} > 0$ und $0 < \sum_0^\infty \psi_{\kappa,\ell}\psi^{+}_{\kappa,\ell}\int\Omega < \infty$ sowie $\lim \sum \psi_{\kappa,\ell}\psi^{+}_{\kappa,\ell}\int\Omega =$ ist, muß auch $\int\Omega > 0$ reell sein und die dimensionierten Volumina eines π_2 haben. Diese $\int\bar{Z}$-Bedingungen sind aber mit erfüllbar durch $\int\Omega = -i\sqrt{\pi}\int\mu$, und dies der Konvergenz $\sum_0^\infty \psi_{\kappa,\ell}\psi^{+}_{\kappa,\ell}\int\Omega < \infty$ wird auch der notwendige $\lambda^2_{\kappa,\ell}\sum_0^\infty \psi_{\kappa,\ell}\psi^{+}_{\kappa,\ell}\int\Omega =$ Einsetzen von $\psi_{\kappa,\ell}\cdot\psi^{+}_{\kappa,\ell} = \psi^{2}_{\kappa,\ell}$ liefert dann $\frac{E}{\lambda^2_{\kappa,\ell}} = \sum_0^\infty \psi_{\kappa,\ell}\int\Omega -$ $-\frac{1}{\lambda_{\kappa,\ell}}\sum_0^\infty \frac{\int\psi_{\kappa,\ell}}{\int\mu}\int\Omega =$ $= -i\sqrt{\pi}\left(\sum_0^\infty \psi_{\kappa,\ell}\int\mu - \frac{1}{\lambda_{\kappa,\ell}}\psi_{\kappa,\ell}\Big|_0^\infty\right)$ der mit dem Teilchen

$\lambda_{k,e}\,\mu = \frac{\xi}{\operatorname{ctg}\frac{iE}{\lambda_{k,e}\sqrt{\tau}}} = \frac{\xi}{\psi_{k,e}\int\frac{\xi}{\xi-\psi_{k,e}}}\Big|_0^\infty$.

Für Bestimmung von $\psi_{k,e}$ kann der zweite mechanische Approximationsbereich $\psi_{k,e} = (E + \cancel{2iB^{(0)}_{k,e}}\, e^{-\xi})^{-1}$ herangezogen werden. Hierzu ist aber die Fakultät möglich.

Es folgt $\int\frac{\psi_{k,0}}{e^{\xi/2}}\int\frac{\xi}{\xi} = 2\int(e^{\xi/2} + \cancel{2iB^{(0)}_{k,e}})^{-1}\int e^{\xi/2} =$

$= \int\int \ln(e^{\xi + \cancel{2iB^{(0)}_{k,e}}}E) =$

$= \int\int \ln\frac{\cancel{\psi_{k,e}}E}{E-\psi_{k,e}} = \ln\frac{E\cancel{\psi_{k,e}}}{E-\psi_{k,e}}$.

12.12.962

Einsetzen liefert $+\frac{iE}{\lambda_{k,e}\sqrt{\tau}} =$

$= \left(\ln\frac{E\cancel{\psi_{k,e}}}{E-\psi_{k,e}} - \psi_{k,e}\right)\Big|_0^\infty =$

$= \ln\frac{\cancel{e^{-\psi_{k,e}}}}{E-\psi_{k,e}}\Big|_0^\infty = -\ln(E-\psi_{k,e})\cdot e^{\psi_{k,e}}\Big|_0^\infty$

Hierfür kann der Näherungswert Reihe für mechanischen

Funktion Verschaltet und nach dem Korrespondenzprinzip der Approximationsstufen der mikroskopischen Approximationsbereich gewählt werden. Mit $\tau \to 0$ Diesen dritten Approximationsbereich wird $\lim_{\substack{\tau\to 0\\ \xi\to\infty}} \psi_{k,e};\ n = \psi_{k,e}(\xi) =$

$= (1 + \cancel{2iB^{(0)}_{k,e}}\cdot e^{\pm i\lambda_{k,e}\xi})^{-1}$, sofern sich für das mechanische

$\ln(1-\psi_{k,e}(\xi))\cdot e^{\psi_{k,e}(\xi)}\Big|_0^\infty \to -\infty$

oder nach Potenzierung

$\frac{((1-\psi_{k,e})\,e^{\psi_{k,e}})_{\xi\to\infty}}{((1-\psi_{k,e})\,e^{\psi_{k,e}})_{\xi=0}} = 0$, weil

im Falle der rein imaginären Kennzahl $\eta = \xi$ sein muß.

$e^{\psi_{k,e}}\Big|_0^\infty$

Für den negativen Zweig des Eigenwertes im $\psi_{k,e}(\xi)$ ist diese Bedingung wegen $\lim_{\xi\to\infty}\psi_{k,e}^{(-)} = 1$ identisch

erfüllt den Faktor für den positiven Zweig $\lim \psi^{(+)}_{\kappa,\varepsilon} = 0$, während für beide Zweige $\psi_{\kappa,\varepsilon}(0) = (1 + 2i B_{\kappa,\varepsilon})^{-1}$ ist. Dies bedeutet aber $\frac{1 + c\, B_{\kappa,\varepsilon}}{1 + i B_{\kappa,\varepsilon}} \cdot \exp(2 + 2i B_{\kappa,\varepsilon})^{-1} = 0$, was nur dann

$2i B_{\kappa,\varepsilon} = -1$, $\mu = \alpha_5 \mathfrak{o}_5 + \alpha_{4,6} \mathfrak{o}_{4,6}$

Gleichung (121)

erfüllt werden kann, wobei die Fakultätskonstante $B_{\kappa,\varepsilon}$ im Fall des imaginären Konjugierens a und b bestimmt worden ist.

Zunächst soll der Fall a weiter analysiert werden, d.h. es sollen transfinite Kondensationsstufen im $\mathfrak{o}$-reellen - euklidischen R_2 jenseits des raumzeitlichen Aufbaus R_4 [illegible]

liegen. (hier ausführliche Abschätzung und Anpassung der Symbolschöpfung den weiteren Texten aus Bd XI ab Seite 166 verwenden).

nach diesen mathematischen Texten aus Bd XII S. 1 bis 17 durchgehen.

18.12.62 die Zeitkoordinatenabbildung bei äußerer Vereinigung, also der Fall c, wird dann $\mu = \sum_{\kappa=4}^{6} \alpha_\kappa \mathfrak{o}_\kappa$ oder für $\tau \to 0$ dann $\xi^2 = -\sum_{\kappa=4}^{6} x_\kappa^2 = \varepsilon^2 + \eta^2 + c^2 t^2$ und $\int \Omega = -i\tau \int \mu$ abgeschätzt. Dies bedeutet aber, daß sich aus der Konvergenz $\sum_0^\infty \psi_{\kappa,\varepsilon} \cdot \psi^*_{\kappa,\varepsilon} \int \Omega < \infty$ nach der Kriterium $-\frac{iE}{\lambda^2 \tau} = \ln(E - \psi_{\kappa,\varepsilon}) e^{\psi_{\kappa,\varepsilon}} \int^0 \exp \lambda_\kappa$, wenn die zweite Approximation durchgeführt $\psi_{\kappa,\varepsilon} = (E + i B_{\kappa,\varepsilon} e^{-\lambda_{\kappa,\varepsilon} \mu})^{-1}$ verwendet wird.

der Uebergang zur Matrix approximationsstufe $\tau \to 0$ und $\psi_{k,e;n} \to$

$\to \psi_{k,e}(x_i)_4^6 = \psi_{k,e}(\xi) =$

$= (1 + 2i B_{k,e} \cdot e^{\pm i \lambda_{k,e} \xi})^{-1}$ liefert

wenn für den positiven Zweig

$\lim_{\xi \to \infty} \psi_{k,e}(\xi) = 0$ und $\psi_{k,e}(0) =$

$= (1 + 2i B_{k,e})^{-1}$, was, wie

bei den Fällen a und b für

$2i B_{k,e} = -1$ fehlt. die Lösung

dieser Kondensation unterscheidet

sich also nur durch das Hängen

bleiben von η^2 in ξ^2 von den

Fällen a und b. der $\xi_a^2 =$

$= \varepsilon^2 + \eta^2$ transformierte laufende

Energieterme bezw. im Quadrat

sowie R_{+4} mit ω fortschreiten

die Quadrate aber $\xi^2 = \varepsilon^2 + c^2 t^2$.

im Falle R_{-4} fortschreitende Quadrate beschreibt müssen Matrix

$\xi_c^2 = \varepsilon^2 + \eta^2 + c^2 t^2$ Photonen

wiedergegeben werden, die von Gravitonen begleitet werden.

Diese Photonen bei äußerster Kompaktheit bilden also eine R_{-4}, doch setzen sie sich durch angeregte Gravitationsfelder in den R_{+4} fort. der Gravitations- und Trägheitswirkungen äquivalent sind erfahrt die durch $E = mc^2$ ausgedrückte Trägheit der Felder sie eine radikale Interpretation durch die Zeitkoordinate bei äußerster Kompaktheit. Während der Zeitmittelpunkt $t = 0$ wird immer $\xi_c = \xi_a$, d.h. es existiert stets eine wirkende Korrespondenz der Photonenenergie

zwischen der manifesten Form im π_4 und transpirierten Energieterm solange $\eta \neq 0$ bleibt. Hieraus kann wiederum auf den Elementarprozess geschlossen werden der für $\eta \neq 0$ im Sinne einer Rückkorrespondenz abläuft, wenn Photonen zurückgestrahlt und absorbiert werden. Im Photon muß bei $t = 0$ immer ein transpirierter Term vorangehen. Dies bedeutet aber, daß die Photonenkorrespondenz immer nur über solche Terme gehen kann, sodaß der Photonenaustausch über eine Distanz des π_3 in mehreren Phasen erfolgt.

1.) Phase: Die Energieterme des

emittierenden Systems im π_3, der zur Emission kommt, müßen zunächst transpiriert werden.

2.) Phase: Nach $t = 0$ wird dieser Term im π_4 als Photon wieder manifest.

3.) Phase: Das entstandene Photon durchläuft die betreffende Distanz des π_3. Bei diesem Durchgang bleibt $\eta \neq 0$ doch ist $\eta = \text{const}$. Es vertauschen wohl Realteil Wechselwirkung, partiell. $\eta = 0$ würde bedeuten daß kein Quadrat an das Photon gekoppelt ist was aber die Trägheitslosigkeit und damit die Unabsorbierbarkeit von Photonen durch Gravitationsfelder zur Folge hätte, was aber im Widerspruch

mit der Erfahrung steht. $\eta = 0$ ~~ist~~ nur möglich wenn das Photon die einzige Größe des ganzen äußeren Feldes wäre. Der Fall b ist demnach eben wegen dieser Irrealität nur als eine analytische Fiktion zu werten.

4.) Phase: Bei der Absorption des Photons durch irgendein äußeres System des R_3 wird ein neuer Zeitmittelpunkt gesetzt, resp. die Photonenenergie transformiert wird also in einen latenten energetischen Zustand übergeht.

5.) Phase: Der transformierte wird im R_4 als absorptionsfähig des absorbierenden Systems ~~im~~ Zustand manifest.

Der die Absorptionsfähigkeit nicht elektromagnetischer Natur zu sein braucht sondern auch in körperlicher Form erscheinen können, mit angenommen werden, resp. das Latentwerden des Emissionsfähigkeit vor der Photoemission sowie das inverse Manifestwerden der Absorptionsfähigkeit über Gravitonen vermittelt wird. Denn mit diese Gravitonen, sind als Kräften des Antisonnen ~~gesetzt~~ im R_4 ~~gesetzt~~ mannigfaltig als auch transformiert. ~~Die erste und fünf~~ Mit Ausnahme der dritten Phase ~~sind~~ ~~also~~ in den übrigen Phasen die ~~als~~ negative und positive Raumschlüsse definiert sein

Uebergänge von den Spektralfarben in Purpurfarbe treten nicht eingeschaltet durch Grautöne vermittelt. Bei der Photoemission erfährt also der Emissionsstern über ein Grautonsystem einen negativen Raumschritt, dem sich ein positiver, ebenfalls über ein Grautonsystem ausschließlich durch den Emissionsphotonen entsteht. Bei der Photoemission vollzieht sich der inverse Prozeß, d. h. das Photon erfährt einen negativen Raumschritt über ein Grautonsystem dann sich ein positiver Raumschritt bei der ~~Emission~~ Absorption des Elektrons ausschließt.

offensichtlich bestimmen die Übergänge für den Emissionsvorgang den negativen Raumschritt über das Grautonsystem, was auch beide negativen Raumschritte der Photoemission sind. Farbkörper absorbieren demnach nur bei den positiven Raumschritten, denn hier können die Grautonsysteme mehrdeutig ausfallen. So können z. B. mehrere Photonen emittiert und verschieden starke Absorptionsvorgänge entstehen, da die Farben der Grautonsysteme den positiven Raumschritt verschieden, aber z und y bestimmen, und die Farben den Farbkörper

bedingte Aussage durch den transfiniten Weltbereich bestimmt. Absolutfalle derartiger Kantischnisse mit einer direkten Transmutation von Phänomen in Ganzheiten und Finalzweck möglich sein, wie sie von den obersten Kategorien Metaphysischer Analogien bereits angedeutet wird. Die Analyse derartiger Prozesse setzt jedoch eine exemplarische Beschreibung der Kantischnisse voraus und dies wiederum fordert eine Analyse derjenigen Kondensationen, die Bestandteil der R_3 manifest werden und somit die Diskriminationen der reellen semantischen Architektonik

einbetten $s_{(1)}$ sind. Es handelt sich hierbei um komplexe Kondensationen, weil sie neben den imaginären auch reelle Selektoren $\alpha_K \cdot ()_K$ mit $K \leq 3$ des $R_3 \equiv s_{(1)}$ enthalten.

4.) Komplexe Kondensationen

p. 1. 63 Wenn neben den finalen architektonischen auch die reelle Einheit $s_{(1)}$ zu einer mehrdimensionalen Kondensation des R_3 Kontinuum, dann erscheinen in μ der Partialsumme $\gamma_{K,\varepsilon}$ die reellen Elementarsektoren $\alpha = \sum_{K=1}^{3} \alpha_K ()_K$ des R_3 neben den imaginären $i\beta = \sum_{K>3} \alpha_K ()_K$, sodass $\mu = \alpha + i\beta +$ $+ \mu^+$ zu einem komplexen

Anmerkung siehe Seite

Linearselektor wirkt. Neben den invarianten Hilbert-Kondensationen gibt es also auch solche Komplexen deren Eigenart durch die metrische Hilbert-Kondensation des physischen Raumes bestimmt wird. Für $3 < p \leqq 6$ die Zahl der zu Komplexen Kondensationen dimensionen proportionales Volumenelement $\int \Omega \sim \sqrt{\tau}^r \cdot \int \mu$ im gewöhnlichen Sinne der Hyperbelfläche, abhängig vom Proportionalitätsfaktor ist, dann $\int \Omega + \int \Omega^x$ sowie auch $\sum_0^\infty \psi_{k,\ell} \psi_{k\ell}^x \int \Omega < \infty$ gegen einen komplexen Wert konvergierten muß weil $\psi_{k,\ell} \cdot \psi_{k,\ell}^x = \psi_{k,\ell}^2$ ein reeller

Selektor ist. Mit $E = \frac{0}{1}$ folgt dann für die komplexen $\lambda_{k,\ell}^p \sum_0^\infty \psi_{k,\ell} \psi_{k,\ell}^x \int \Omega \sim (1+i) E = \varepsilon$, oder $(\lambda_{k,\ell} \sqrt{\tau})^{-r} \varepsilon \sim \sum_0^\infty \psi_{k,\ell} \psi_{k,\ell}^x \int \mu$ und hieran kann mit den hermetischen Fundamentalsolutionen im Fassum $\psi \cdot \psi^x = \psi_{k,\ell}^2 = \psi_{k,\ell} - \frac{\int \psi_{k,\ell}}{\lambda_{k,\ell} \int \mu}$ substituiert werden. Mit der linearen Selektortransformation $\lambda_{k,\ell} \cdot \mu = x$ folgt nach einer Substitution für die Konvergenz $\lambda (\lambda_{k,\ell} \sqrt{\tau})^{-r} \varepsilon \sim \sum_0^\infty \psi_{k,\ell} \int x^{k,\ell} - \psi_{k,\ell}^\infty$. Nach gilt im zweiten Approximationsbereich $\psi_{k,\ell} = (E + A_{k,\ell} \cdot e^{-x})^{-1}$, also $\sum \psi_{k,\ell} \int x = \sum (E + A_{k,\ell} \cdot e^{-x})^{-1} \int x$ $= \sum (e^x + A_{k,\ell})^{-1} e^x \int x =$ $= \sum \int \ln (e^{x,\ell} + A_{k,\ell}) = \sum \int \ln \left(E + \frac{1}{A_{k,\ell}} \cdot \right.$ $\left. (e^x)\right) =$

$= -\sum \int \ln(E - \psi_{\kappa,e})$.

Das bedeutet aber $\ln e^{\psi_{\kappa,e}(E-\psi_{\kappa e})}\Big|_0^\infty =$
$\sim -\lambda_{\kappa,e}(\lambda_{\kappa,e}\sqrt{\tau})^{-p} \cdot \varepsilon$ für $\lambda_{\kappa e}$
konvergiert das Zustands selek-
tor $\psi_{\kappa,e}$. Es kann nun-
mehr $\lambda_{\kappa,e}$ so gewählt in den
dritten Approximationsbereich
$\tau \to 0$ hinreichend klein werden.
Bei diesem Übergang wird
$\lim_{\tau\to 0} x;\ n = \pm i y = \pm i\sqrt{\xi^2 - r^2}$
und $r^2 = \sum_{\kappa=1}^{3} x_\kappa^2$ und $-\xi^2 = \sum_{\kappa>3} x_\kappa^2$.
Daher gilt $\lim_{\tau\to 0} \psi_{\kappa,e};\ n =$
$= \psi_{\kappa,e}(y) = \left(1 + \mathcal{A}_{\kappa,e}\, e^{\pm i\lambda_{\kappa,e} y}\right)^{-1}$
und $\lim_{\tau\to 0} \lambda_{\kappa,e}(\lambda_{\kappa,e}\sqrt{\tau})^{-p}(1+i) \to \infty$
also
$\lim_{\tau\to 0} \exp\left(-\lambda_{\kappa,e}(\lambda_{\kappa,e}\sqrt{\tau})^{-p}(1+i)\right) = 0$
Für die positiven Zweige
$\psi_{(+)\kappa,e}(y)$ folgt offenbar
$\lim_{y\to\infty} \psi_{(+)\kappa,e} = 0$, während für
beide Zweige $\psi_{(\pm)\kappa,e}(0) =$

$= (1 + \mathcal{A}_{\kappa,e})^{-1}$ gilt. Einsetzen die-
ser Taylorreihe in das potenzier-
te und anschließend infinitesi-
mal approximierte Wellenpaket
liefert dann die Bedingung
$\frac{1}{\mathcal{A}_{\kappa,e}}(1 + \mathcal{A}_{\kappa,e}) \cdot \exp\left(-(1+\mathcal{A}_{\kappa,e})^{-1}\right) = 0$
was nur durch $\mathcal{A}_{\kappa,e} = -1$ erfüll-
bar ist. Die Fakultätsmenge
dieser Komplexen Wirkungs-
Koordinatoren ist also auch
negativen imaginären Koordi-
naten fremd.

Aufgrund dieser Bestimmung
$\mathcal{C}_{\kappa,e} = -1$ kann die Lösung im
dritten also mikroskopischen Approxi-
mationsbereich infinitesimal fest,
wenn es die allgemeinen Komplexen
Wirkungskoordinaten kennt.
Für diese Komplexen Koordi-
naten gilt deshalb allge-

meine im nicht metrischen, mikroskopischen Bereich

$$\Psi_{(\pm)K,\ell}(y) = (1 - e^{\pm i \lambda_{K,\ell} y})^{-1},$$

$$y^2 = s^2 - p^2,$$

$$p^2 = \sum_{K=1}^{3} x_K^2,$$

$$-s^2 = \sum_{K>3} x_K^2$$

Gleichung 124

Aus dem Bau des Komplexen Linearselektors $\mu = \alpha + i\beta$ können die möglichen Fälle Komplexer Kondensationsstufen abgelesen werden. Auf jeden Fall muß immer $\alpha \neq 0$ bleiben denn würde der R_3 nicht kondensieren dann würde $\Psi_{(\pm)K,\ell}$ zum imaginären Kondensoraggregat werden was bereits in (VIII/3) beschrieben wurde. Außerdem muß in $i\beta$ grundsätzlich nach der kernelektrischen

schen Weltarchitektur $\alpha_5 ()_5$ enthalten sein weil eine Struktur ohne entsprechende Bewertung nicht möglich ist. Durch diese beiden Forderungen ergeben sich für die Komplexen Kondensatoren nur vier Möglichkeiten. Kennzeichnet (α) 12.I.1963 die ädische Antikernelektrie, dagegen (β) die ädische Kernelektrie dann beschreibt $i\beta$ allein die vier möglichen Kondensatorsorten weil immer $\alpha \neq 0$ ist. Im ersten und einfachsten Fall wäre

$\beta_{(\alpha\alpha)} = -i\alpha_5 ()_5$ bezw.

$\beta_{(\alpha\beta)} = -i(\alpha_5 \mp ()_5 + \alpha_6 ()_6)$ bei ädischer Kernelektrie. In diesem Fall (α) Kondensator von der Sorte (verursacht

durch die transfiniten Äquivalenzen) nur $s_{(1)}$, also der R_3 sodaß die Komplexeren Äquivalenzkondensationen vom Typ (a) als Raumkondensationen bezeichnet werden müssen. Die beiden darüber Komplexeren Äquivalenzkondensationstypen (b) wären dann

$$s_{(b\alpha)} = -i(\alpha_4 (\,)_4 + \alpha_5 (\,)_5)$$

und

$$s_{(b\beta)} = -i(\alpha_4 (\,)_4 + \alpha_5 (\,)_5 + \alpha_6 (\,)_6).$$

neben $s_{(1)}$ Kondensiert über die noch die Einheit $s_{(2)}$ der Zeitachse R_4, sodaß die (b) Raum-Zeitkondensationen sind. $+ c^2t^2 - x_4^2 = c^2t^2$ sowie $-x_5^2 = \varepsilon^2$ und $-x_6^2 = \eta^2$ sodaß für den euklidischen Infinitesimalbereich $\tau \to 0$ für diese Kondensationstypen eine analoge Verhältnis für y, denn $y^2 = s^2 - r^2$ ist r^2 im reellen R_3, während s^2 dem Selektor α aus μ, während s^2 dem imaginären Selektorzahl β entspricht. Für die Approximation $\psi = (1 - \varepsilon^{\pm i\lambda_{\kappa,e} y})^{-1}$ Raumzeitlich also s^2 den jeweiligen Kondensationstyp. Die Raum-Kondensationen werden dabei beschrieben durch $s^2_{(a\alpha)} = \varepsilon^2$ und $s^2_{(a\beta)} = \varepsilon^2 + \eta^2$ während für die Raumzeitkondensationen $s^2_{(b\alpha)} = c^2t^2 + \varepsilon^2$ und $s^2_{(b\beta)} = c^2t^2 + \varepsilon^2 + \eta^2$ gilt. nach dieser Klassifikation der äußeren der Wahrscheinlichkeit überhaupt möglichen Kon-

plexen Kondensationsvorgänge können die Kondensationsstufen im einzelnen analysiert werden. Charakteristisch

14.I.63 ~~Zunächst soll der zu~~ ~~fachste Fall also die Kondensation~~ für alle Kondensationen ist das Aufspalten von Singularitäten in $\psi_{\kappa,\ell}$. Für den zweiten metronischen Approximationsbereich $\psi_{\kappa,\ell} = (E - e^{-\lambda_{\kappa,\ell}\mu})^{-1}$. Kommt es nur für $\mu \cdot n = 0$ zur Unendlichkeitsstelle doch ist dieser Fall von vornherein ausgeschlossen weil $\mu \cdot n = d$ bedeutet, daß überhaupt kein Metron existiert was im Widerspruch zum Metronenbegriff steht. Auch in den Extrema gibt es keine singulären Unendlichkeitsstellen,

denn wegen $\mu = \alpha + i\beta$ steht vor dem Komplexen Exponentialgesetz grundsätzlich der reelle Abklingfaktor $e^{-\lambda_{\kappa,\ell}\alpha} \neq E$, ~~was die Unendlichkeitsstelle~~ ~~nicht mehr möglich macht~~. Für Gegenstände im 3. Approximationsbereich $\tau \to 0$ verliert diese Singularitäten auf weil $\psi_{\kappa,\ell}(y) = (1 - e^{\pm i\lambda_{\kappa,\ell} y})^{-1}$ einmal $y^2 = s^2 - p^2$ ist.

15.I.63 Tatsächlich setzen sich also für $\tau > 0$ metronische Eigenwerte in den ganzen π_5 fort, deren Amplituden allerdings rasch abklingen, aber auch für $\alpha \cdot n \geq \beta \cdot n$, wegen $e^{-i\lambda_{\kappa,\ell}\beta} = \cos\lambda_{\kappa,\ell}\beta - i\sin\lambda_{\kappa,\ell}\beta$ als harmonischer Anteil erhalten bleiben. Für $\tau \to 0$ kommt es

aber zu einer Reihe von Singularitäten. Die erste hiervon liegt bei $S^2 = r^2 = 0$ doch muß diese wegen $\varepsilon > 0$ grundsätzlich ausgeklammert werden. Die übrigen Singularitäten sind eine Folge von $\varepsilon \to 0$ und lassen sich ausklammern, weil sie nur im Bereich der ~~gradzahligen~~ Eigenwerte $\lambda_{k,e} y = +1$ für $S^2 > r^2$ auftreten, sodaß in diesem Bereich nur die ungeraden Eigenwerte $\lambda_{k,e} y = 1$ ~~auf die ungeradzahligen fallen~~ zählen. Und allein auf $r \to 0$ zurückgehende singuläre Fläche liegt vorgegen bei $S^2 = r^2 \neq 0$, die auf jeden Fall als Folge des 3. Approximationsbereiches ausgegrenzen ist. Diese singuläre Fläche gerlegt den

ganzen Definitionsbereich der Kondensation in zwei Teile nämlich in $0 \leq r^2 < S^2$ und $r^2 > S^2$ wobei in $0 \leq r^2 < S^2$ wegen $y^2 > 0$ immer ein Komplexes Schrödingerpotential gilt dessen diskrete Eigenwertverteilung durch $r^2 = S^2$ von einem Abklingbereich $y^2 < 0$ getrennt wird. In diesem Abklingbereich in dem $\gamma_{k,e}$ den Charakter eines Kontinuumsfeldes annimmt zeigen sich jedoch tatsächlich die metrischen Eigenwerte nur räumlich steil abklingenden Amplituden fort.

Nach dieser Analyse allgemeiner Approximationsannäherung folgte letzte Seite

eigenschaften können nämlich die drei möglichen Formen komplexer Kondensationen diskutiert werden und zwar soll mit dem einfachsten Fall also mit der Raum-Kondensation bei konstanter Anfangsmetrik begonnen werden (5. XII. 34 zu: Interpretation unter Andeutung der Symbole Band XII Seite 321 bis Seite 36 ~~entwickelten~~ im dem folgenden Text erwähnten).

22.5.63 Im Fall $\leq(a,x)$ mit $\tau \to 0$ soll diese nicht als besonders wichtig in Erscheinung treten. Es stellen Kondensationsstufen bipolar, also konstruktiv das vorgegebene gedeutet, desgleichen für $\tau \to 0$ alle Eigenwerte im Eigenwertbereich $0 \leq \rho < \varepsilon$ und dürfen im Abbildungsbereich $\rho > \varepsilon$ liegt noch eine positive Bipolarität $\psi_{\kappa,\varepsilon} = (1 - e^{\pm \lambda_{\kappa,\varepsilon} y})^{-1}$ mit $y^2 = \rho^2 - \varepsilon^2$ vor, die aber für $\rho \gg \varepsilon$ verschwindet, weil im 4. Approximationsbereich $\psi = (1 - e^{\lambda x})^{-1}$ gegen $\psi = 0$ gegenüber $\rho \to \infty$ mit ψ und verschwinden zu einem einheitlichen Feldverlauf, der also mit einem Gravitationsfeld entsprechen kann welches keine Polarität aufweist.

$\rho \gg \varepsilon$ ist zweifellos nur deshalb möglich, weil jede Raumkondensation auf

sind die Wellenelektrik ein charakteristischer ε = Wert zu = Komplex, unter welchen die betreffende Wirkung auftreten wird. Die mit dem Fall (a, α) beschriebenen Komplexen Kondensationen müssen also als Leitkörper = Kern des physischen R_3 aufgefaßt werden, deren Spektrum durch die möglichen ε = Werte im transfiniten Bereich der Welt beschrieben wird. Offensichtlich ist die für $\tau \to a$ auftretende singuläre Fläche des R_3 = Komplexum dieses transfiniten ε = Wertes, wobei $\rho = \varepsilon$ als räumlicher Entfernungsradius der Leitkörper aufgefaßt werden muß.

Für $S(a,\alpha) = \varepsilon$ gilt im Bereich $0 \leq \rho < \varepsilon$ der mikroskopischen Eigenwerte $\tau = \frac{2 n_\rho + 1}{2 n_\varepsilon + 1} \cdot \varepsilon$ nach Gl. 124a, doch fordert diese Beziehung stets $n_\rho < n_\varepsilon$, weil sie mit $\rho < \varepsilon$ gilt. Der das mikroskopische Eigenwertspektrum abschließende Entfernungsradius ist also grundsätzlich nicht im Fall (a, α) erfaßbar durch Systeme der Raumzahlen, sodaß auch ε nicht als zahlentheoretische Funktion ausgezeichneten Index ausdrückbar ist. Dies würde aber bedeuten, daß es im R_3 keine diskretes Spektrum von Leitkörperstellen geben kann, was aber mit der Erfahrung im Widerspruch

steht. Hieraus folgt, daß der Fall (α, α) vielleicht ist d. h. für das Spektrum der neutrokorpuskeln Kerne nicht nur der Fall (α, β) in Betracht. Also cf. 134a, 24. I. 63 nämlich $\rho = \frac{2n_r+1}{2n_s+1} \cdot S_{(\alpha,\beta)}$ mit $S^2_{(\alpha,\beta)} = \varepsilon^2 + \eta^2$ nach Radius-Intervall $\rho^2 \left(\frac{2n_r+1}{2n_s+1}\right)^2 \cdot \varepsilon^2 = \left(\frac{2n_r+1}{2n_s+1}\right)^2 \cdot \eta^2$. Die beiden Quantenzahlen beschreiben den Verlauf der neutronischen Eigenwerte im Bereich $0 \leq \rho^2 \leq S^2_{(\alpha,\beta)}$, wobei immer $n_r < n_s$ bleiben müß. Für $\rho = \varepsilon$, also auf der primären Fläche im Fall $\eta = 0$, wird dann $\frac{\eta}{\rho} = \pm 2(2n_r+1)^{-1} \cdot \sqrt{(n_s+n_r+1)\cdot(n-n_s)}$. Es $\mu > 0$ irgendeine Zahl welche den Beitrag $\eta > 0$ im System der Quantenzahlen bestimmt, dann muß immer $n_r = n_s - \mu$ gesetzt werden, weil $n_s > n_r$ als Hauptquantenzahl die physikalische Begründung der Rotationsquantisation hinsichtlich des neutronischen Eigenwertbereiches bestimmt. Aus diesem Grunde kann $n_s = n$ und $n_r = n - \mu$ gesetzt werden, was $\frac{\eta}{\rho} = \pm (2n+1-2\mu)^{-1} \cdot \sqrt{\mu(2n+1-\mu)} = \pm 2 f$ mit $f(n,\mu) = (2n+1-2\mu)^{-1}\sqrt{\mu(2n+1-\mu)}$ ergibt. Zweifellos ist $f < 1$ für alle $\mu < n$ sodaß im $\frac{\eta}{\rho} = \pm 2f$ ~~offensichtlich $\rho = \frac{\lambda}{2}\frac{\rho}{n}$ mit $\lambda = \frac{mc}{h}$ also $m\eta = \pm \frac{1}{c} f$ cgk.~~

26. I. 36 immer $|\frac{\eta}{\rho}| < 2$ bleiben müß. Wesentlich ist die Interpretation der im R_3 wirkenden, aber ~~(?)~~ an den

Ausdrücken Größen. Sowohl η als auch χ müssen im R_3 als irgendwelche Aussagezeichen Länge des betreffenden Teilchenkorpuskel erscheinen weil dabei es aber zunächst ganz allgemeine Bewegungszustand im R_3 mit drei Arten gibt nämlich die Resofeldwellenlänge (3), die Materiewellenlänge (2) und die Gravitationsradius (1), der aus der Realitätsforderung von $\chi q e^{-q} \sim \left(1 - \frac{\chi}{s}\right)^2$ mit $\chi = \frac{\hbar^2}{f^2 m^3}$ und $q = 1 - \sqrt{1 - \frac{3f}{8c^2}}$ des erweiterten Gravitationsgesetzes ergibt. Auf jeden Fall ist (1) < (2) < (3), weil die Resofeldmasse wesentlich kleiner ist als die Trägheit der betreffenden Korpuskel.

η und χ können aber jeweils in dreifacher Weise interpretiert werden sodaß sich für das Verhältnis $\frac{\eta(\chi)}{\chi(\eta)} = (\chi, \eta)$ insgesamt 6 Interpretationsmöglichkeiten ergeben nämlich (1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1) und (3,2). Wegen (1) < (2) < (3) ~~und~~ $|\frac{\eta}{\chi}| < 2$ entfallen grundsätzlich (3,1), (3,2) und (2,1), sodaß nur noch (1,2), (1,3) und (2,3) verbleiben. Zur weiteren Eingrenzung dieser Interpretationen muß zunächst die Resofeldwellenlänge interpretiert werden. Es ist $\lambda = \frac{\hbar}{\mu \omega}$ nach dem Resofeldwirkungsquantum zwischen der Resofeldmasse μ und der Resofeldwellenlänge $\lambda \equiv (3)$. (Bd XII Seite 63 bis Seite 64 verweisen).

Nach dieser Approximation ist $\mu = \frac{3\gamma m^2}{16 c^2 r_0} = \frac{\gamma m^2}{4 \omega c r_0} \ll m$ der Korpuskelradius r_0 auf, der in jedem Fall als $r_0 = \frac{\lambda}{2} = \frac{\hbar}{2mc}$ (2) interpretiert werden muß. Es gibt demnach (2,3) $= \frac{r_0}{\hbar} 2\omega \mu = \frac{6\omega\gamma}{16 c^2 \hbar} \cdot m^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\gamma m^2}{c\hbar}$ Für den Zweig (2,3) ergibt sich also das Massenspektrum $\chi m^2_{(2,3)} = \pm 4 \frac{c\hbar}{\gamma} \cdot \rho$. Für die beiden übrigen Zweige muß zunächst $\eta(1)$ aus $\rho q e^{-q} = 0$ ermittelt werden. Diese Näherungskurve verläuft aber $1 - \frac{3\varphi}{8c^2} \geqq 0$. und $\varphi = \frac{\gamma m}{r}\left(1 - \frac{r}{s}\right)^2$. Im Extremum $r = \eta(1)$ wird also $\varphi_{ext.} = \frac{8}{9} c^2 = 2\omega c$ oder mit $\chi^3 = \frac{\eta(1)}{s}$ auch $2\omega c \frac{m^2 s^2}{\hbar^2} = \frac{1}{\chi}(1-\chi)^2 \cdot \frac{s}{\hbar}$ mit $\alpha = \omega c \frac{m^2 s^2}{\hbar^2}$ ergibt sich die lösbare quadratische

Gleichung $\chi^2 - 2\chi(1+\alpha) + 1 = 0$ mit den Lösungen $\chi = (1+\alpha) \cdot \left(1 \pm \sqrt{1 - (1+\alpha)^{-2}}\right)$. Da auf jeden Fall $\chi \ll 1$ bleiben muß und ebenfalls $\alpha \gg 1$ ist, kommt nur der negative Zweig in Betracht, für die Radikalgröße $\sqrt{1 - (1+\alpha)^{-2}} \approx 1 - \frac{1}{2}(1+\alpha)^{-2}$ in sehr guter Näherung erfüllt. Einsetzen liefert dann $\chi = \frac{1}{2}(1+\alpha)^{-1}$ oder $(1) = \frac{s}{2}(1+\alpha)^{-1}$ mit $\alpha = \omega c m^2 s^2 \hbar^{-2}$ und $s = \frac{\hbar^2}{\gamma m^3}$ also $(1) = \frac{\hbar^2}{2\gamma m}\left(m^4 + \omega c \frac{\hbar^2}{s^2}\right)^{-1}$ und dies bestätigt für den Zweig (1,2) das Verhältnis $\frac{\eta}{\hbar} = \frac{c\hbar}{\gamma} \cdot m^2 \left(m^4 + \omega c \frac{\hbar^2}{\gamma^2}\right)^{-1}$ also die Spektraldarstellung $\frac{c\hbar}{\gamma} m^2_{(1,2)} \left(m^4_{(1,2)} + \omega c \frac{\hbar^2}{\gamma^2}\right)^{-1} = \pm 2\rho$. Somit entspricht dann für den letzten Zweig (1,3) die Beziehung $\frac{\eta}{\hbar} = \frac{\hbar}{\gamma} \omega \mu m \left(m^4 + \omega c \frac{\hbar^2}{\gamma^2}\right)^{-1} = \frac{\hbar}{\gamma^2} \omega \frac{\gamma m^3}{4\omega c r_0} \left(m^4 + \omega c \frac{\hbar^2}{\gamma^2}\right)^{-1} =$

$= m^4 \left(m^4 + a\,c\,\frac{h^2}{p^2}\right)^{-1}$ also das Spektrum $\times\ m^4 \cdot \left(m^4 + a\,c\,\frac{h^2}{p^2}\right)^{-1} = \pm 2 f$.
Es kommt nun darauf an, alle drei Zweige zu analysieren und aufgrund dieser Analyse die richtige Interpretation auszuwählen. In jedem Fall muß für $n = 0$ auch $m = 0$ sein, denn, wenn überhaupt keine Quantenzahl existiert, kann es auch keine Kondensation als ponderable Kopplung geben. $m = 0$ bedeutet aber in jedem Fall $f(0) = 0$, was für μ die Anpassung $\mu = 1$ und damit $f(n) = \frac{\sqrt{2n}}{2n-1}$ zur Folge hat. Einsetzen in die explizierten Darstellungen $m_{(2,3)} = \pm 2\sqrt{\frac{ch}{p}}\sqrt{f}$ oder $m_{(1,2)} = \pm \tfrac{1}{2}\sqrt{\frac{ch}{p}}\sqrt{\frac{1}{f}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{a}{3}f^2}\right)}$ bezw. $m_{(1,3)} = \pm\sqrt{\pm 1}\; 2\sqrt{\frac{ch}{p}}\cdot\sqrt[4]{\frac{1}{6}f(1-2f)^{-1}}$ bestätigt, daß für die Fälle (1,2) und (1,3) die m = Werte komplex werden für $n \leq 3$ bezw. $n \leq 11$, was aber unmöglich ist, wenn f tatsächlich die Spektralfunktion eines Spektrums echter ponderabler Massen ist. Nur für (2,3) beschreibt $m(n)$ ein echtes Massenspektrum, weil die m = Werte für alle $n \geq 0$ reelle Zahlen sind. Man hat also für das Massenspektrum des Raumkontinuums

$$m = 2\sqrt{\frac{ch}{p}}\cdot\frac{\sqrt[4]{2n}}{\sqrt{2n-1}}$$

125

Gleichung f

zu setzen, wobei die akustische Projektion im R_3 als Halbe Phasenwellenlänge $\eta = \frac{\lambda}{2} = \frac{h}{2mc}$ und der Entelechieradius $r = \varepsilon$ in dieser Projektion als Halbe Resofeldwellenlänge $\Lambda = \frac{h}{\mu a}$ erscheint. Einsetzen der Resofeldmasse $\mu \approx \frac{3}{16}\frac{p}{c^2}\frac{m^2}{r_0}$ und $r_0 = \eta = \frac{\lambda}{2}$ liefert dann

$\Lambda = 2\frac{\hbar^2}{\gamma m^3}$, doch ist hierin $\frac{\hbar^2}{\gamma m^3} = S$ die Gradkatenausgrenze aus $\kappa q e^{-q} \sim \left(1 - \frac{\kappa}{S}\right)^2$, sodaß $\Lambda = 2S$ ist. Aufgrund dieser Interpretation

$\gamma = \frac{1}{2}\lambda$, $\kappa = \varepsilon = \frac{\Lambda}{2}$, $\lambda = \frac{\hbar}{mc}$,

$\Lambda = \frac{\hbar}{\mu\omega} = 2S$, $S = \frac{\hbar^2}{\gamma m^3}$ 125a

Gleichung (1)

ergibt sich also das folgende Bild: Bei der Raumkondensation beschreibt die Projektion der äußeren Koordinate in dem R_3 die quantenhafte Materiewellenlänge und die Projektion der inneren Bewegung als Gesamtwellenlänge die Grenze des attraktiven Gradientenfeldes, sodaß jenseits dieser Gradientengrenze das exponentielle Abklingungsgesetz wirksam wird. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Interpretation als reelle Korpuskel kann nach Gl. (125a) aus diesem Abklingungsgesetz mit makroskopischem Charakter nicht mehr direkt auf die elektrische Neutralität der Raumkondensation geschlossen werden, weil $\Lambda > \lambda$ ist und im ganzen makroskopischen Bereich $\kappa \leq \frac{\Lambda}{2}$ Kondensationsstufen vorliegen. Da aber $\frac{1}{2}\Lambda$ mit der Gradientengrenze und dem Entelechieradius identisch ist, und außerdem im Normalfall (α, β) die transfiniten Selbstkondensationen an Raumstrukturen gekoppelt erscheinen, nicht aber imaginäre Zeitkondensationen, können die Raumkondensationen

sehr wirksam wirken. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Interpretation als reelle Korpuskel kann nach Gl. (125a) aus diesem Abklingungsgesetz mit makroskopischem Charakter nicht mehr direkt auf die elektrische Neutralität der Raumkondensation geschlossen werden, weil $\Lambda > \lambda$ ist und im ganzen makroskopischen Bereich $\kappa \leq \frac{\Lambda}{2}$ Kondensationsstufen vorliegen. Da aber $\frac{1}{2}\Lambda$ mit der Gradientengrenze und dem Entelechieradius identisch ist, und außerdem im Normalfall (α, β) die transfiniten Selbstkondensationen an Raumstrukturen gekoppelt erscheinen, nicht aber imaginäre Zeitkondensationen, können die Raumkondensationen

der Spektralgleichung λ_i als Neutrinokorpuskeln interpretiert werden, zumal transformierte Selbstkonsistenzlösungen mit geodätischen Weltlinien im R_3 stets als Graviton niemals aber als Photonen erscheinen. Elektrisch geladene Korpuskel müssen aber immer in einer elektromagnetischen Wechselwirkung stehen, was mit einem Austausch elektromagnetischer Wirkungen, also einem Photonenaustausch verbunden ist, während sich die Wechselwirkung von Neutrinokorpuskeln auf einen Gravitonenaustausch wegen (α, β) also auf eine Gravitationsfeldwechselwirkung beschränkt.

Bei der Konversation (α, β) ist zwar die Zeit antihermitisch,

doch müssen in jedem Fall die hermitischen Eigenwerte Zeitfunktionen sein was in [illegible] die Zeitabhängigkeit $n(t)$ der Quantenzahl der Folge hat. Ist $n = \text{const}(t)$ längs jeweils eines Zeitintervalles dann beschreibt n eine in diesem Zeitintervall stabile Neutrinokorpuskel, die in eine andere übergeht, wenn die Grenze des Zeitintervalles überschritten wird. Bei $n = 0$ ist überhaupt keine $n =$ Quantenzahl repräsentiert, während der Laserimpuls bei $n = 1$ beginnt. $n < 0$ ist nicht möglich und n nimmt mit wachsendem n immer mehr ab. Dies bedeutet aber, daß n mit t mit anwachsen kann, daß das deshalb wegen

$n = n(t)$, $\frac{dn}{dt} \geqq 0$ gleichmäßig χ_2

Kann eine instabile Neutrokotpinkel nur in eine solche geringerer Masse übergehen, weshalb dieser Uebergang auch als Zerfall bezeichnet wird. Ob irgendein $n =$ best. Wert $t_1 \leqq t \leqq t_2$ also während $t_2 - t_1$, der Stabilität hat $\frac{dn}{dt} = 0$ d. h. der Neutrokotpinkel gemäß, oder ob es nach $\frac{dn}{dt} > 0$ zum Zerfallen ~~eines~~ ~~Neutrokotpinkel~~ in eine tiefere Neutrokotpinkel kommt und wie groß die Zeit $t_2 - t_1$, der Stabilität ist, hängt offensichtlich allein von der Korrelation der Partialstrukturen ab, dem die vorausgegangene Konstruktionsvorschrift gilt nur für das

kernidentische Kompositionsfeld. Zunächst müssen noch die beiden letzten Möglichkeiten (b, α) und (b, β) komplexer Kondensationen des Kompositionsfeldes untersucht werden.

21.2.63 Bei der letzten Klasse komplexer Kondensationen (b, α) und (b, β) empfiehlt wegen der Interpretationsnotwendigkeit $(2, 3)$ die Klasse (b, α) als nicht real, denn $\eta = \frac{\lambda}{2}$ als Projektion in R_3 bedeutet $\eta = 0$ wegen $\lambda = \frac{h}{m c}$, dass entweder $h \to 0$ oder $c \to \infty$ geht, was in jedem Fall mit der Erfahrung im Widerspruch steht. Es verbleibt demnach die Diskussion des Falles (b, β), wo alle Welkoordinaten

Kondensieren. Komplexe Kondensationen dieser Art Räumen als Raum-Zeit-Kondensationen bei pseudoeuklidischer Metrik bezeichnet werden, denn es kondensieren alle Koordinaten der Sonnenwelt. Für (α, β) ist in der Partialbruchsumme des allgemeinen Hermitizitätsproblems der Linearselektor $\mu = \alpha + i\beta$ durch den Faktor $i\beta = \sum_{\kappa=4}^{6} \alpha_\kappa ( )_\kappa$ ausgezeichnet. Im mikroskopischen Approximationsbereich $\tau \to 0$ folgt dann für das Eigenwertproblem $S = \frac{2n_s+1}{2n_r+1} \cdot r$ wegen $S^2 = \eta^2 + \varepsilon^2 + c^2 t^2$ aufgrund des Baues von μ; n nach Quadrieren $\eta^2 + \varepsilon^2 + c^2 t^2 = \left(\frac{2n_s+1}{2n_r+1}\right)^2 \cdot r^2$. Hieraus wird ersichtlich, daß neben der transformierten Kondensation noch eine Zeitkondensation α_4 an die Raumkondensation gekoppelt ist. Im Fall der imaginären Kondensationen beschreiben die transformierten Selbstkondensationen latente transformierte Terme, die im R_3 als Gravitonen erscheinen, wenn ihre Wellenlängen optische Wellenlängen sind. Die Zeitkondensationen erscheinen dagegen immer im R_3 als mit ausgekoppelten Gravitationsfeldern Photonen, also als elektromagnetische Wirkungen, die nicht fortschreiten. Bei den komplexen Raumkondensationen erscheint ein transformierter Term an die eigentliche Raumkondensation gekoppelt, was

im R_3 zu einer Kettokorpuskel mit einem anziehenden Gravitationsfeld führt. Im Analogie hierzu wäre also die Raumzeitkondensation als eine Raumstruktur zu verstehen, an welche ein elektromagnetisches Feld zusammen mit einem Gravitationsfeld gekoppelt ist. Dieser Analogieschluß läßt die Raumzeitkondensationen im R_3 als Korpuskeln erscheinen von denen elektromagnetische Wirkungen ausgehen. Diese Körper dieser Art als Räume aber mit elektrisch geladene Korpuskeln sein. Die immer mit paarweise in Erscheinung treten. Die vom Eigenwertgesetz gefor-

gebenen Massen sind demzufolge auch als Massen dieser Korpuskel-Kelpaare zu verstehen. Im Extremfall gilt $\eta = \frac{\lambda}{2}$ und $r = \varepsilon = \frac{\lambda}{2} = s$ wo $s = \frac{a^2}{\gamma m^3}$ die Gravitationsgrenze aus $r g \varepsilon^{-9} \sim \sim \left(1 - \frac{r}{s}\right)^2$ gilt. Setzt man auch für $ct = cT$ einen Extremwert, dann wird das Gesetz des Massenspektrums zu

$$\left(\frac{\lambda}{2s}\right)^2 + \left(\frac{cT}{s}\right)^2 = \left(\frac{2n+1}{2n_p+1}\right)^2 - 1 =$$

$$= 4\mu \frac{2n+1-\mu}{(2n+1-2\mu)^2} = 4f^2, \text{ wenn}$$

$n_p = n_0 - \mu$ und $n_0 = n$ für die Kaiquantenzahl des Massenspektrums und μ für die Anpassung gesetzt wird. $cT = s$ ist offensichtlich ein Weg im R_{31} der während T von einer Wirkung durchlaufen wird, die mit c fortschreitet und daher elektro-

magnetischen Kraft sein müß. Dieser Sachverhalt läßt den Schluß zu, daß s der räumliche Abstand zwischen den beiden elektrischen Ladungskomponenten ist, denn nach dem elektromagnetischen Fadenkreuzgesetz erscheint das elektrische Kraftfeld im Gegensatz zum Gravitationsfeld nur zwischen den Ladungen. Einsetzen von ε und λ [illegible] Massengesetz $\frac{\gamma^2 m^4}{4c^2 k^2} + s^2 \frac{\gamma^2}{k^4} m^6 = 4 f^2$. Da für die Quantenzahl $n = 0$ auch $m = 0$ sein müßte, daß auch in diesem Falle wie bei den Leitokorpuskeln $f(0,\mu) = 0$ sein müß, weil nur dann $m(0) = 0$ erfüllbar ist. Das bedeutet aber, daß auch für elektrisch geladene

Korpuskeln $\mu = 1$ und damit $f = \frac{\sqrt{2n}}{2n-1}$ sind. Es kommt nun noch darauf an, die Eigenschaften des Korpuskelpaares zu untersuchen. V

~~Beide Korpuskeln müssen wenn sie~~ ein elektrisches Kraftfeld aufspannen, in einer elektromagnetisch-attraktiven [illegible] stehen. Bilden die Korpuskeln ein starres System, dann umlaufen sie sich relativ zueinander auf ~~kreisförmigen Bahnen~~ mit der ~~Bahngeschwindigkeit~~ Geschwindigkeit ~~v~~ v. ~~$v = \omega r$~~ ~~(a)~~ m ist die Masse des aus zwei Korpuskeln bestehenden Systems, somit für die Wirkung einer Korpuskel $w = \frac{1}{2} \oint m v \, da =$ ~~$= \pi \int m v \, ds = \pi \cdot m v s$~~ siehe S. 200

V ~~Quantenzahl Tafel 10~~

Andererseits gilt das Prinzip der Wirkungen $\mathfrak{w} = N \cdot h$ also $m v s = 2 N h$. Die Wechselwirkung ist elektromagnetischer Natur. D. h. für die ~~Kugelförmige elektrische~~ Energie gilt relativ zu jedem Koordinatensystem $\frac{m}{4} \cdot v^2 = \frac{q_\pm^2}{4 \pi \varepsilon_0 s}$ wenn $|q_+| = |q_-|$ die Ladung der Korpuskeln angibt. Einsetzen von $v^2 = \frac{q_\pm^2}{\pi \varepsilon_0 m s}$ in $m^2 s^2 v^2 = 4 N^2 h^2$ liefert $4 N^2 h^2 = m s \cdot \frac{q_\pm^2}{\pi \varepsilon_0}$ oder $s = N^2 h^2 \frac{4 \pi \varepsilon_0}{q_\pm^2 m} = N^2 h^2 \frac{\varepsilon_0}{\pi q_\pm^2 m}$. Dies kann in den zweiten Term von $4 f^2$ eingesetzt werden und liefert $s^2 \frac{\gamma^2}{h^4} m^6 = m^4 N^4 \left(\frac{\varepsilon_0 \gamma}{\pi q_\pm^2}\right)^2$. Die Energie des elektromagnetischen Feldes wächst darauf hin, daß es elementare elektrische Ladungsquanten $e_\pm$ gibt, sodaß $q_\pm = \pm \nu \cdot e_\pm$ mit ganzzahligem ν ist. Das bedeutet ~~aber~~ $s^2 \frac{\gamma^2}{h^4} m^6 = m^4 \left(\frac{\varepsilon \gamma}{\pi e_\pm^2}\right)^2 \left(\frac{N}{\nu}\right)^4$, also

$$4 f^2 = \frac{m^4 \gamma^2}{4 c^2 h^2} \left(1 + \left(\frac{2 c h \varepsilon_0}{\pi e_\pm^2}\right)^2 \left(\frac{N}{\nu}\right)^4\right)$$

Wird ~~wieder~~ $\mu = \sqrt{\frac{ch}{\gamma}}$ und $\varepsilon = \pm \sqrt{2 \pi} \cdot e_\pm \sqrt{c h \varepsilon_0}$ das Kürzungsmaß, dann folgt $m = \pm 2 \mu \sqrt{f} \left(1 + \left(\frac{\varepsilon N}{\nu}\right)^4\right)^{-\frac{1}{4}}$ für das Massenspektrum. Solange $N > 0$ ist, handelt es sich um geladene Korpuskeln, doch zeigt sich daß das Spektrum $m = \pm 2 \mu \sqrt{f}$ der

Neutrokorpuskeln auch gl. f. entsteht, wenn $N = 0$ gilt. Die geladenen Korpuskeln $N > 0$ bestehen immer aus zwei komplexen $\underline{m}$ sodaß $m = 2 \underline{m}$ also $\underline{m} = \pm \mu \sqrt{f} \left(1 + \left(\frac{\varepsilon N}{\nu}\right)^4\right)^{-\frac{1}{4}}$ gilt, was für $N = 0$ zu $\underline{m}_0 = \pm \mu \sqrt{f}$ einer Neutrokorpuskel führt. Wenn

folgt, daß es nicht nur zu jedem geladenen Korpuskel die entgegengesetzt geladene Antikorpuskel gleicher Masse gibt, sondern daß auch zu jedem Neutrokorpuskel eine Antikorpuskel existieren müßte. Aus diesem Grunde wird $\underline{m} = m_{(\pm)}$ gesetzt und die Ambivalenz von Korpuskeln und Antikorpuskeln ausgedrückt werden soll, daß die Raumkondensationen das sie implizierende Massenspektrum der Raumgebietskondensationen $m_{(\pm)} = \pm \mu \sqrt{f} \left(1 + \left(\frac{\xi N}{\nu}\right)^4\right)^{-\frac{1}{4}}$ ist zweideutig, d.h. es ~~gibt~~ ist $m_{(\pm)} > 0$ als $m_{(\pm)} < 0$ möglich. Alle Kompressionskondensationen sind durch ihre Fortsetzung in die Transgressionen Bereiche der Welt, also durch die

Ankoppelung transfiniter Selbstkondensationen an die räumlichen bezw. raumgebietlichen Antikräfte gekennzeichnet, die aber als Projektion auf den R_3 immer als angekoppelte Gradientenfelder erscheinen müssen. Diese gradientalen Antikräfte setzen aber im reellen R_3 eine Energie $\mathfrak{S} = \frac{a^2}{f m^3_{(\pm)}}$, die wegen ihrer Realität $\mathfrak{S} > 0$ bedeutet. Da $\mathfrak{S} \sim m^{-3}_{(\pm)}$ ist, würde $m_{(\pm)} < 0$ zu $\mathfrak{S} < 0$ führen, was einen Widerspruch zur Realität einer Existenz im R_3 bildet. Aus diesem Grunde kommt nur der positive Zweig $m_{(\pm)} > 0$ in Betracht, denn hier bleibt $\mathfrak{S} > 0$. Es gibt also grundsätzlich keine negativen Massen was auch für das Spektralsystem der

Definierende Gl. Das einfachste klassenspektrum allen neutralen und elektrisch geladenen Korpuskeln zusammen mit dem System der entsprechenden Antikorpuskeln wird beschrieben durch

$$m_{(\pm)}(n,q) = \frac{\pi\mu}{\sqrt{2n-1}}\sqrt{n^4+4q^4}$$

$$\mu = \sqrt{\frac{ch}{\gamma}}$$

Elektrische Quantenzahl q.

Das Spektralprinzip ist also allen zugeordneten Systemen gemeinsam; nämlich der Massenquantenzahl n [illegible] und der Ladungsquantenzahl q.

Für $q=0$ sind die Korpuskeln neutral, doch [illegible] geladene Korpuskeln für $q>0$ ist n eine Festwert, denen zugeordnet $m_{(\pm)}(n)$ als Neutralkorpuskeln für $q=0$ und $m_{(\pm)}(n,q)$ für geladene Werte $q>0$. da immer $\left(\frac{n}{n}\right)>0$ bleibt, wenn $q>0$ ist [illegible] also $m_{(\pm)}(n) > m_{(\pm)}(n,q)$

Zu jeder Massenquantenzahl n gehört demnach ein System elektrisch geladener Korpuskeln und eine Neutralkorpuskel deren Masse der Neutralkorpuskel grundsätzlich höher als die Masse der gut geladenen Massenquantenzahl zugeordneten geladenen Korpuskeln.

Es können auch alle zur Kombination Antiteilchen Antielektrizitätsquanten

zeitlich veränderlich sein, was wiederum in vollständiger Analogie zur Gl. [illegible] zu zeitlich veränderlichen Bildwiederzahlen führt. Gesucht wird also zu ergänzen durch

$$m_{(\pm)}(n) > m_{(\pm)}(n, q),$$
$$n = n(t), \quad q = q(t).$$

gesuchte q_1.

× Anmerkung siehe Bd XV Seite 88

Die zeitliche Änderung von n und q bedeutet eben Stoßzerfall der Korpuskeln der mit auf Korrelationsprozesse also auf wechselbeziehungen der drei Partialstrukturen $^1q(x)$ + $^2q(x)$ + $^3q(x)$ zurückgeführt kann. Hierbei kann es offensichtlich zur Erzeugung und Emission monokinetischer und Komplexen-

Kondensationen in tieferen Niveaus kommen, doch müssen zur Analyse derartiger Zerfallsvorgänge erst die Korrelationen der Partialstrukturen untersucht werden. Die Zerfallsreaktion N(t) andert mit der räumliche Ausdehnung des Radiergesystems, was durch eine Energieabsorption bzw. Emission erfolgt. Bei der Energieemission kommt es zur Emission einzelner monokinetischer Kondensationen über diskrete Terme und anschließend den Raumschiff, wobei der bewegende Impuls über ein Gradientensystem verwirklicht wird, sodaß nach dem Raumschiff Emissionsphotonen erscheinen.

= Forschung Seite 197

20.2.63

Die Raumzahl N ist andererseits dem Abstand s der $m_{(\pm)}$ direkt proportional, sodaß der Uebergang zur Neutralkörperkugel $N = 0$ & mit $s = 0$ also der Berührung von $m_{(+)}$ und $m_{(-)}$ identisch ist. In diesem Fall wäre also, wenn n_1 die Massenquantenzahl von $m_{(\pm)}$ ist, $m = m_{(+)} + m_{(-)} = 2\mu\sqrt{f(n_1)}$ die Masse eines neutralen Systems, für welche auch $m = \mu\sqrt{f(n_2)}$ gelten muß, wenn m ebenfalls eine Komplexe Konfiguration ist.

Der Vergleich liefert $\frac{f_1}{f_2} = \frac{1}{4}$, sodaß zunächst keine ganze Raumzahl n_2 gefunden werden kann. $m_{(+)} + m_{(-)}$ liefert also für $N = 0$ keine komplexe Konfiguration, doch kann der Energieinhalt nicht verloren gehen. $(m_{(+)} + m_{(-)}) \cdot c^2$

muß also in Form irgend einer anderen Konfiguration erscheinen. Wenn also $N = 0$ wird, wenn man geschlossen werden, daß $m_{(+)} + m_{(-)}$ gänzlich der Berührung $N = 0$ über die Gravitonen-system transport wird um nach dem ausschließenden Raumschluß als ein System von Emissions-photonen und Emissionsgravitonen zu erscheinen, dessen Energieinhalt auch $(m_{(+)} + m_{(-)}) \cdot c^2$ für $N = 0$ identisch ist. Wenn sich geladene Korpuskeln mit ihren Antikorpuskeln berühren so müssen sich dieselbe Systeme zerstrahlen. Wie dieser Prozess strukturell abläuft und ob ein analoger Prozess für ~~neutrale~~ neutrale

Korpuskel - Antikorpuskelsysteme existieren, kann ebenfalls erst aus einer Korrelationstheorie der Partialstrahlen hervorgehen. Das Massenspektrum $m^{(\pm)}$ impliziert formal für $N = 0$ die Mutterkorpuskel, doch muß diese tatsächliche durch das Verschwinden der Ladung $v = 0$ gekennzeichnet. Für $\frac{N}{v}$ muß aber für $N > 0$ eine divergenz auftreten wenn $v = 0$ wird, was ist dieser Widerspruch auflösbar? Das Integral der Wirkung w ist $w = \int 2\pi^2 \sqrt{\frac{q^2}{\pi \varepsilon_0}} \, dV_s = N \cdot h$. Mit der Elementarladung $q_e = e_\pm$, also der elementaren Wirkung $w_e = 2\pi^2 \frac{e_\pm \sqrt{s}}{\sqrt{\pi \varepsilon_0}}$, gilt aber

$w = v \, w_e$, weil $q_\pm = v \, e_\pm$ ist. Mit der ganzen Quantenzahl $q(t)$ muß auch $w_e = q h$ quantisiert sein, was mit $w = N h$ in $w = v \, w_e$ eingesetzt, $q = \frac{N}{v} \geq 0$ liefert. Das Verhältnis $\frac{N}{v}$ muß also positiv ganzzahlig sein sodaß q als neue Quantenzahl und zwar als Ladungszahl eingeführt werden kann. Das Massenspektrum wird dann zu $m^{(\pm)} = \frac{a}{\sqrt{2n-1}} \cdot \sqrt[4]{\frac{2n}{1 + \varepsilon^4 q^4}}$ d. h. nun ist das Spektrum auf ganze Quantenzahlen reduziert worden, wobei das für $v = 0$ eingeführte Verhältnis durch die ganzen Zahlen $q \geq 0$ substituiert, wobei $q = 0$ die ladungsfreie Mutterkorpuskel angibt. Mit diesem

Massenspektrum Komplexe müssen das System aller Kondensatorenergien explizit wiedergegeben werden, wenn in $2\pi^2 e_\pm^2 \varepsilon = \pm\sqrt{2\pi c h \varepsilon_0}$ die Elementarladung $e_\pm$ bekannt wäre. $e_\pm$ kann aber höchstens die empirisch gemessene Elementarladung ergeben, dann könnte $e_\pm$ höher, dann könnte es sich nicht mehr um eine Elementarladung handeln, was aber $\varepsilon \geq 1$ bedeutet. Für m die Masse eines geladenen Körpüskel und $m_0 > m$ die Masse des zum gleichen Raumenergiegebiet gehörenden neutralen Körpüskel dann folgt aus der Spektralfunktion $\frac{m_0}{m} = \sqrt[4]{1+\varepsilon^4 q^4}$ oder $\frac{m_0}{m} = \sqrt[4]{1+\varepsilon^4}$ für $q = 1$. Diese Beziehung ~~gilt~~ stimmt aber nur für

den Grenzwert von ε also $\varepsilon = 1$, mit der Empfehlung des Elementar-Korpüskels überein, sodaß $\varepsilon = 1$ zu fordern ist. Da $2\pi^2 e_\pm^2 \varepsilon = \pm\sqrt{2\pi c h \varepsilon_0}$ ist $c\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = 1$, also $c\varepsilon_0 = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} = \frac{1}{R_-}$ mit dem reziproken elektromagnetischen Raumwiderstand $R_- = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ der Gültigkeitsbereich $\hat{A}_-$ also das R_{-4} Universum. Offenbar kann $h = \frac{h}{2\pi}$ verbunden werden, was mit $\varepsilon = 1$ für die Elementarladung $e_\pm = \pm\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{h}{R_-}}$ liefert. Einsetzen der Naturkonstanten ~~$h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$~~ $h \approx 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ [Wsec^2] und $R_- \approx 377$ [Ω] liefert $e_\pm \approx \pm 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ [Asec], woraus folgt, daß die Elektronenladung tatsächlich als Folge

komplexer metrischer Raum-
zeitkontinuen die Masse
einer elektrischen Elementar-
ladung trägt. Das explizite
kasselsperrtum zahlreicher
Elementarkorpuskel einschließ-
lich der Antikorpuskeln wird
beschrieben durch

$$m_{(\pm)} = \frac{\mu}{\sqrt{2n-1}} \cdot \sqrt[4]{\frac{2n}{1+q^4}},$$

$$n(t) \geq 0 \qquad q(t) \geq 0$$

$$\mu = \sqrt{\frac{ch}{\gamma}}, \qquad e_{\pm} = \pm \frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{th}{R}}$$

Gleichung h

wobei die Zeitabhängigkeit der
ganzzahligen Zustände n und q
Aufschluß über den zeitlichen
Zerfall aller Elementarkor-
puskeln gibt, den Raum über-
haupt explizit verläßt.

allenfalls eine Korrelationsbe-
ziehung der Partikelstrukturen
wieder erkennen. Während die
Ladungszahl q Aufschluß über
die elektrische oder neutrale
Aktivität liefert, beschreibt die
Massenquantenzahl n die Zahl
metrischer Kondensationen.
Es ist $\frac{2n+1}{2n-1} \cdot p$, wenn $n_3 = n$
und $n_p = n - \mu$ positiv bei an-
passend $\mu = 1$ folgt, daß in
jedem Fall $\varepsilon + \eta$, also die Anz-
zahlen Strukturen, mit n an-
wachsen, was aber Einzelheit
mit diesem Wachstum n ab-
nimmt. Ist $n_1 \gg n_2$ kann
also die ~~[illegible]~~ ten Kondensati-
onen n_2 metrisch wesent-
lich dichter sind n_2 wesentlich
größer als die vielen, aber

Fortsetzung auf S. 189

flaches Kondensatorfeld $\mathfrak{n}_1$.
(cf. noch weitere analytische Lösungen Band XII Seite 69 bis 72 verwenden).

Anmerkung zu Seite 181

als Folge dieser Attraktion müssen sich beide Korpuskeln auf geschlossenen räumlichen Bahnen $a(r)$ mit der Geschwindigkeit $v(r)$ räumlich wenn r ihr variabler Abstand ist. da m die Masse des Gesamtsystems ist, welches aus zwei gleichen komprimierten besteht, folgt für die Wirkungsgröße einer Korpuskel $w = \frac{1}{2}\oint m v \, da =$ $= N h$ mit ganzzahligem $N \geq 0$ wobei $m \, da$ gegen $\overline{A}$ des R_{-4} invariant ist. Es kann also

$m =$ const. gesetzt werden doch gilt, wenn $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ der Azimutwinkel der Bahn und $0 \leq \vartheta \leq \pi$ der Drehwinkel der Bahnebene ist, $da = dr \, d\vartheta \, d\varphi$, wenn a kann eine beliebige Raumröhre sein. Mit $0 \leq r \leq s$ wird also $\oint m v \, da = m \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{s} v \, dr \, d\vartheta \, d\varphi$. Für die kinetische Energie einer Korpuskel folgt $\frac{m}{4} v^2 = \frac{q_\pm^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$, also $v = \frac{q_\pm}{\sqrt{\pi \varepsilon_0 m r}}$ wenn $|q_+| = |q_-|$ die Korpuskelladung angibt. damit kann aber die Integration ausgeführt werden was $2N h =$

$$= 2\pi^2 \sqrt{\frac{m q_\pm^2}{\pi \varepsilon_0}} \int_0^s \frac{dr}{\sqrt{r}} =$$

$$= 4\pi^2 \sqrt{\frac{q_\pm^2 m}{\pi \varepsilon_0}} \sqrt{s}$$

oder $s = \left(\frac{N}{2\pi^2}\right)^2 h^2 \frac{\pi \varepsilon_0}{q_\pm^2 m}$ diskret. die Energie des elektromagnetischen Feldes wächst.

auf die Existenz elektrischer Elementarladungen $e_\pm$ hin, sodaß $q_\pm = \nu \cdot e_\pm$ mit ganzzahligem $\nu \geq 0$ zu reden ist. Damit wird aber der Term

$$s^2 \cdot \frac{\gamma^2}{h^4} m^6 = \left(\frac{N}{2\pi^2 \nu}\right)^4 \left(\frac{\pi \varepsilon_0 \gamma}{e_\pm^2}\right)^2 m^4$$

und damit $4f^2 = \frac{m^4 \gamma^2}{4 c^2 h^2} \left(1 + \left(\frac{N}{2\pi^2 \nu e_\pm}\right)^4 \cdot (2\pi c h \varepsilon_0)^2\right)$

Weiterarbeitung von S. 181

28.2.63 Diese Attraktion der beiden elektrisch geladenen Korpuskeln welche die Ladungen $|q_+| = |q_-|$ tragen, wird nicht allein durch diese elektromagnetischen Wechselwirkungen bestimmt sondern darüber hinaus durch eine gravitative Komponente der Korpuskelmassen und durch das Spektrum

der quantenhaften Nahefeldresonanzen. Die gesamte Attraktionsladung $Q_\pm$ mit Vorzeichen $|Q_\pm| > |q_\pm|$ sein, weil die durch die gravitationskomponente und die Nahefeldresonanzen projizierte Gesamtattraktion höher liegt als die elektromagnetische Attraktion. Nach der elementaren Nahefeldtheorie kugelförmiger elektrischer Ladungen ist die Änderung von $Q_\pm$ mit dem Azimut $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ und der Polordinate $0 \leq \vartheta \leq \pi$ gegeben durch $2\sqrt{\frac{d}{d\varphi}} \frac{d\Theta_\pm}{d\vartheta} = m \sqrt{\frac{R_\pm}{R}}$, wenn R_+ der Gravitations- und R_- der elektromagnetische Wellenwiderstand im $\pi_{\pm 4}$ ist, ~~m = m~~ $m = m(1)$ beginnt sich

auf die Mesofeldwellenlänge λ, so daß $m = const(\varphi, \vartheta)$ ist. Dies bedeutet aber die völlige Symmetrie, sodaß $Q_\pm = \frac{m}{2}\sqrt{\frac{1}{6}\frac{R_+}{R_-}}\int_0^{2\pi} d\varphi = \pi^2 m \sqrt{\frac{1}{6}\frac{R_+}{R_-}}$ wird. Einsetzen von $R_+ = 16\pi^3/c$ und $\frac{1}{R_-} = c\varepsilon_0$ liefert dann $Q_\pm = \sqrt{2}\frac{\pi^2}{\sqrt{3}} m \sqrt{4\pi\varepsilon_0 \gamma}$, also $4\pi\varepsilon_0\gamma m^2(\lambda) = \frac{3Q_\pm^2}{2\pi^4}$. Für die Energie des Gravitationsfeldes folgt $E_g = \int_0^\lambda grad(m\varphi_g)\, d\vec{q} =$
$= m(\lambda)\cdot\varphi_g(\lambda) - m(0)\cdot\varphi_g(0) =$
$= m(\lambda)\varphi_g(\lambda) = \frac{\gamma m^2(\lambda)}{\lambda}$ wenn $\varphi_g(r) = \gamma\frac{m(r)}{r}\left(1-\frac{r}{s}\right)^2$ verwendet wird, denn wegen des Mesofeldcharakters ist $m(r)$ wird $\lim_{r\to 0}\varphi = 0$, ~~aber auch~~ auch durch $\lim_{r\to 0} m(r)/r = 0$ (in linearer Näherung). Für die reine elektromagnetische Feldenergie folgt für $r = \frac{\lambda}{2\pi}$, wenn $\lambda = \frac{h}{mc}$ die elektromagnetische oberfläche bestimmt, $E_e = \int_\lambda^\infty grad\,\vartheta\, d\vec{e} =$
$= -\frac{q_\pm^2}{4\pi\varepsilon_0\lambda}$. Für $\boxed{\oint_0^\pi d\vartheta =}$ das Verhältnis beider Energien ergibt sich $\frac{E_g}{E_e} = -\frac{1}{q_\pm^2}4\pi\varepsilon_0\gamma m^2(\lambda)\frac{\lambda}{\lambda} =$
$= -\frac{3Q_\pm^2}{2\pi^4 q_\pm^2}\cdot\frac{\lambda}{\lambda}$. Hierin ist $E_g = -h\frac{\omega}{\lambda}$ und $E_e = h\frac{c}{\lambda}$, was einsetzt unter Berücksichtigung von $\frac{\pi}{3} = \frac{\omega}{c}$ die Beziehung $Q_\pm^2 = q_\pm^2\left(\frac{\pi^2}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\omega}{c}\right)^2$ stellt für die gesamte Attraktionsladung der geladenen Korpuskeln $Q_\pm = q_\pm\frac{\pi^2}{\sqrt{2}}\frac{\omega}{c}$ dar. Für die Attraktionsenergie dieses $Q_\pm$-Feldes folgt dann $E = \frac{Q_\pm^2}{4\pi\varepsilon_0 k} = \frac{\alpha q_\pm^2}{4\pi\varepsilon_0 k}$ wenn zur Kürzung $\sqrt{\alpha} = \frac{\pi^2}{\sqrt{2}}\frac{\omega}{c}$ verwendet wird. Bilden beide Korpuskeln ein stationäres dynamisches System, so bewegen sie sich mit

der Geschwindigkeit $\overline{v}$ im Abstand s auf Kreisbahnen um einander, was mit $\beta = \frac{v}{c}$ die gegen $\hat{A}_-$ im R_-^4 invariante Form $E = \frac{mc^2\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}$ liefert. Setzt man $\varepsilon x = \frac{\alpha q_\pm^2}{4\pi\varepsilon_0 m c^2}$, dann folgt im Vergleich $\beta = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Als Rückstoßgeschwindigkeit dieser Bewegung gilt ebenfalls im invarianten Feld $w = \oint \frac{mc\beta\,da}{\sqrt{1-\beta^2}} = mc\oint \beta\,da_0 = 2\pi mc \int_0^s \beta\,dr$, weil $da = da_0\sqrt{1-\beta^2}$ und $da_0 = 2\pi dr$ ist. Für die Wirkung gilt aber die Quantisierung $w = Nh$, was mit $dr = \frac{\alpha q_\pm^2}{4\pi\varepsilon_0 m c^2}\, d\left(\frac{1}{x}\right)$ und $\beta = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ eingesetzt $Nh = \frac{1}{2}\alpha q_\pm^2 R_- \int_0^s \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\, d\left(\frac{1}{x}\right)$ liefert, weil $R_- = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = \frac{1}{c\varepsilon_0}$ ist. Zur Ausführung des Integrals wird $x \cdot \sin\gamma = 1$ als Transformation verwendet und das ergibt

$$\frac{2Nh}{\alpha q_\pm^2 R_-} = \int_0^s \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\, d\left(\frac{1}{x}\right) = y(s) - y(0) =$$

$= \arcsin \frac{1}{x(s)} - \sqrt{\pi}$ oder $\frac{2Nh}{\alpha q_\pm^2 R_-} = \arccos\frac{1}{x}(s) - \frac{\pi}{2}(2\nu+1)$

~~wird die Zwischenrechnung durchgeführt, dann~~

~~$\leq 6 \equiv \left(\frac{\sin}{\cos}\right)$ ausgerechnet, dann folgt $s = \frac{\alpha q_\pm^2}{4\pi\varepsilon_0 m c^2} \leq 6\left(\frac{2Nh}{\alpha q_\pm^2 R_-} + \right.$~~

~~$\left. \sqrt{\pi}(2\nu+1)\right)$~~ dieser Weise)) liefert nämlich für das Massenspektrum eingesetzt werden was $4f^2 = \frac{g^2 m^4}{4c^2h^2} +$

$+ s^2\frac{g^2}{h^4}\, m^6 = m^4\frac{g^2}{4c^2h^2}\left(1+\left(\frac{\alpha q_\pm^2}{2\pi\varepsilon_0 c h}\right)^2 \cdot\right.$

~~$\leq 6 \sin^2 \frac{2Nh}{\alpha q_\pm^2 R_-}$~~ $\left.\right) = \frac{m^4}{4\mu^4}\left(1+\left(\frac{\alpha q_\pm^2 R_-}{2\pi h}\right)^2 \sin^2\frac{2Nh}{\alpha q_\pm^2 R_-}\right)$

ergibt. Nach der Energie des elektromagnetischen Feldes erscheinen alle elektrischen Ladungen $q_\pm$ als ganzzahlige Vielfache $q = \frac{q_\pm}{e_\pm} \geq 0$ einer Elementarladung $e_\pm$

$$\boxed{d\left(\frac{1}{x}\right)}$$ was für $\frac{16\mu^4 f^2}{m^4} = 1 + q^4\left(\frac{\alpha e_\pm^2 R_-}{2\pi h}\right)^2 \cdot$

~~$\sin^2 \pi \frac{2Nh}{\alpha q^2 e_\pm^2 R_-}$~~ $= 0$ führt. ~~Die Zwischenrechnung kann übergangen werden.~~

~~Zu zwei verschiedenen Werten der Spektralfunktion führen~~

F Anmerkung siehe Seite 210
F Anmerkung siehe Seite 211

~~weil es sonst zu jeder Korpuskelladung q_+ oder q_- jeweils zwei verschiedene Massenwerte geben müßte, was aber im Widerspruch zu der Erfahrung hinsichtlich der Elementarkorpuskeln steht.~~ Dieser Sachverhalt fordert aber die Vergleich $1 + q^4 \left(\frac{\alpha e_\pm^2 R_-}{2\pi h}\right)^2 \sin^2\left(\frac{N}{q^2} \cdot \frac{2h}{\alpha e_\pm^2 R_-}\right) =$ $= 1 + q^4 \left(\frac{\alpha e_\pm^2 R_-}{2\pi h}\right)^2 \cos^2\left(\frac{N}{q^2} \frac{2h}{\alpha e_\pm^2 R_-}\right)$ oder $\sin\left(\frac{N}{q^2} \frac{2h}{\alpha e_\pm^2 R_-}\right) = \pm 1$. Dieser Bedingung kann aber nur durch $\frac{2Nh}{q^2 \alpha e_\pm^2 R_-} = \pm \frac{\pi}{4}$ Rechnung getragen werden. Da e_+ als Elementarladung eine Naturkonstante sein muß, kann $\frac{N}{q^2}$ keine ganzheitstheoretische Funktion mehr sein, weil sonst auch e_+ eine solche wäre, was ~~mit~~ zu der Voraussetzung ~~im Widerspruch steht~~.

Wenn aber $\frac{N}{q^2} = \text{const.}$ ist, dann besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Normierung $N = q^2$ und von $\pm \frac{\pi}{4} e_\pm^2 = \frac{2h}{\alpha R_-}$ ist nur der positive Wert verwendbar, weil $e_\pm$ eine ~~reelle physikalische Größe ist~~. ~~Für Elektronen~~ Da $\alpha^{-1} = \frac{1}{2}\pi^{\frac{1}{2}} \frac{\omega^2}{c^2} = \frac{8}{9}\pi^4$ in die ~~)~~ endgültige Beziehung $\frac{\pi}{2} e_\pm^2 = \frac{2h}{\alpha R_-}$ liefert nun für die Elementarladung $e_\pm^2 = \frac{9}{2\pi^5} \frac{h}{R_-} = \frac{9}{\pi^4} \frac{h}{R_-}$ oder $e_\pm = \frac{3}{\pm\sqrt{\pi^2}} \sqrt{\frac{h}{R_-}}$.

Einsetzen der Naturkonstanten $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ [Wattsec^2] und $R_- = 377$ [Ω] ergibt für den theoretischen Wert $e_\pm = \pm 1{,}604 \cdot 10^{-19}$ [Ampsec], woraus folgt, daß die gemessene Elektronenladung tatsächlich als elektrische Elementarladung anzusprechen ist, denn $e_\pm$ liegt nur um ca $\frac{1}{4}$% höher als die gemessene

Elektronenladung von $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ [Coulomb] mit e_+ kann im Massenspektrum zusammen mit $\alpha = \frac{8}{9}\pi^4$ und der Normierung $N = q^{2(2\nu+1)}$ subtrahiert werden. Der innere ~~Summand~~ $\frac{\pi}{2} = 1 \sin\frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{4}$ ist [illegible], $\frac{16\mu^4 f^2}{m^4} = 1 + q^4 \frac{4}{\pi^4}$ mit dem Befund das Massenspektrum $m = \pm 2\pi\mu\sqrt{f}\,(\pi^4 + 4q^4)^{-\frac{1}{4}}$ mit $\mu = \sqrt{\frac{ch}{\gamma}}$. Für alle Radialquantenzahlen $q > 0$ weist m vom Spektrum der Neutronkorpuskeln ab doch wird $m = \pm 2\mu\sqrt{f}$ zum Spektrum der Neutronkorpuskeln, wenn die Radialquantenzahl $q = 0$ wird. m gibt die Masse des aus beiden Komponenten bestehenden dynamischen Systems an so daß für die Masse eines geladenen Korpuskels $\underline{m} = \frac{1}{2} m = \pm\pi\mu\sqrt{f}(\pi^4 + 4q^4)^{-\frac{1}{4}}$

zu setzen ist. Der Zahl jedes geladenen Korpuskels gehört also eine entsprechende Antikorpuskel. Zeigt sich, daß für $q = 0$ auch $\underline{m}^{(0)} = \pm\mu\sqrt{f}$ zu einer Neutronkorpuskel wird, daraus folgt, daß die Ambivalenz zwischen Korpuskeln und Antikorpuskeln auch auf das Spektrum der Neutronkorpuskeln übertragen werden muß, sodaß im Spektrum der $\underline{m}$ immer mit die Masse eines aus der neutralen Korpuskel und ihrer Antikorpuskel bestehenden dynamischen Systems beschrieben wird. Diese Ambivalenz der Antiskurven werde durch $m^{(\pm)}$ gekennzeichnet. Dann beschreibt das Spektrum $m^{(\pm)} = \pm\pi\mu\sqrt{f}\,(\pi^4 + 4q^4)^{-\frac{1}{4}}$ eine allgemeine Spektralfunktion,

welche die Spektren der neutralen und geladenen Korpuskeln sowie ihre entsprechenden Antiteilchen impliziert. Es gelang sich, daß $m_{(\pm)}$ ein doppeltes Vorzeichen hat. (Seite 187 offenen Text benutzen)

Gleichung 126 S. S186

$$m_{(\pm)}(n,q) = \frac{\pi\mu}{\sqrt{2n-1}} \sqrt[4]{\frac{2n}{\pi^4 + 4q^4}},$$

$$\mu = \sqrt{\frac{ch}{\gamma}}, \quad \varepsilon_{\pm} = \pm \frac{3}{\pi^2} \sqrt{\frac{h}{R_-}}$$

Gleichung 9

Anmerkung zu S. 205

Nach den additionstheoremen ist aber immer $\sin(\varphi \pm \nu\pi) = \pm \sin\varphi$ und $\cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}(2\nu+1)\right) = -\sin\varphi$, sodaß die Zweideutigkeit zu $s = \pm \frac{\alpha q_{\pm}^2}{4\pi \varepsilon_0 m c^2} \cdot \sin \frac{2Nh}{\alpha q_{\pm}^2 R_-}$ wird.

Anmerkung zu Seite 205

In dieser Beziehung sieht der Sinus als ebenfalls periodische, und $\varepsilon_{\pm}$ als Elementarladung definierbare quantisierte Größe, ~~sodaß~~ ~~$\sin\varphi = \pm 1$~~ ~~und ganzzahligen ν~~. Im Fall $\sin \frac{N}{q^2} \frac{2h}{\alpha \varepsilon_{\pm}^2 R_-} = 0$ würde sich Quadratsumme von $q > 0$ oder $q = 0$ des Spektrums der neutralen Korpuskeln ergeben, sodaß $\sin \frac{N}{q^2} \frac{2h}{\alpha \varepsilon_{\pm}^2 R_-} = \pm 1$, oder $\frac{N}{q^2} \frac{2h}{\alpha \varepsilon_{\pm}^2 R_-} = \pm \frac{\pi}{2}(2\nu+1)$ mit ganzzahligem ν in Betracht kommt. Hieraus wird ~~ins~~ für die Quantisierung $N = q^2(2\nu+1)$ im Sinne einer notwendigen Bedingung

lich, weil $\rho_\pm$ als Elementarladung mit von Raum-Koordinaten abhängen nicht aber von Raumkoordinaten abhängen kann. Schließlich muß noch $\rho_\pm^2 > 0$ gefordert werden weil $\rho_\pm$ wie eine reelle physikalische Größe sein kann sodaß der negative Zweig entfällt.

Fortsetzung von Bd XII. S. 72

6.3.63 Nach dem Vorangegangenen kann ein Elementarquant dann überhaupt direkt Nachweis werden, wenn es eine Ruhmasse besitzt, wenn es eine Ruhmindestenergie enthält. Beim ausgedehnten Raumschiff existieren nun alle Moden über ein Grundkontinuum Emissionsphotonen, doch kann auch ein Ruhmassenkorpuskel masselos

sein bei diesem Raumschiff im R_3 existieren dann die Ritzsche Eigenfrequenzen zum diskreten Kontinuum. Für die Masse folgt aus der Spektralfunktion $m^{(1)}_{(\pm)} = \sqrt{2}\frac{ch}{g}$ wegen $n_1 = 1$, doch kann diese Korpuskel nicht stabil sein. Bei t_1 kommt es zum Zerfall $m^{(1)}_{(\pm)} \longrightarrow m^{(2)}_{(\pm)} < m^{(1)}_{(\pm)}$ mit $n_1 \to n_2 > n_1$, was lange des Intervalls $t_2 - t_1$ der Halbwertszeit von n_2 stabil bleibt, bis dann $n_2 \to n_3$ zu erreichen. Auf diese weise kommt es dann zu einer Zerfallskette $(m^{(K)}_{(\pm)} \to m^{(K+K)}_{(\pm)} \equiv (n_K \to n_{K+1})$ mit der Halbwertszeit $t_{K+1} - t_K$ für n_{K+1} mit $1 \leq K \leq N < \infty$, deren Zeitdauern wegen $m^{(K+1)}_{(\pm)} = \text{const}$ während $t_{K+1} - t_K$ eine Kurven-

Kurve sein muß, deren horizontale Äquidistanz die gesuchte Halbwertzeit angibt.
Da stets $m^{(k)}_{(\pm)} > m^{(k+1)}_{(\pm)}$ ist dies ein progressiver Zerfall im Sinne einer Äquidensolation vor bei welcher alle, ~~überhaupt~~ während bestimmter von Null verschiedener Halbwertzeiten stabilen Elementarkorpuskeln durchlaufen werden. Da die Massenquantenzahl in der Spektralfunktion eine laufende Indexziffer ist kann durch aus $n_{k+1} - n_k \gg 1$ sein was durch $n(t)$ aus Gl. 9 zum Ausdruck gebracht wird. $n(t)$ muß also als eine zeitliche Auswahlregel der Massenquantenzahlen im Sinne einer

diskreten Spektren erscheinen deren gesetzlicher Verlauf aus den Korrelationen der ~~Partialstrahlen~~ hypothetischen Linien hervorgehen muß. Ganz analog verhält es sich mit der Ladungsquantenzahl q, die wegen des Zerfalls nicht nur von t sondern auch vom jeweiligen n-Wert abhängen muß. Neben den beiden Systemen von $m_{(\pm)}(n)$ gibt es offensichtlich zu jeder Massenquantenzahl noch ein komplementäres Ladungsspektrum $q \geq 1$, dessen einzelne Terme ebenfalls in der Zerfallsreihe enthalten sein müssen. Da beim Zerfallsprozess $m^{(k+1)}_{(\pm)} < m^{(k)}_{(\pm)}$ ist, aber der Energieinhalt konstant bleiben muß, kann

der Zerfall mit jeder der Emission eines Quantensystems der Masse $\varkappa_K$ stattfindet, wobei $m^{(K)}_{(\pm)} = m^{(K+1)}_{(\pm)} + \varkappa_K$ ist. Auf diese Weise wird also die Zerfallsreihe vollständig beschrieben durch

$$m^{(K)}_{(\pm)} \xrightarrow[t_{K+1} - t_{K-1}]{\varkappa_K} m^{(K+1)}_{(\pm)} ,$$

$$n_K \to n_{K+1} > n_K ,$$

$$n_{K+1} - n_K \gg 1 ,$$

$$1 \leq K \leq N < \infty ,$$

$$q = q(n,t) \quad n = n(t) ,$$

$$n_K = \text{const} \; (t_K - t_{K-1})$$

Gleichung 128

f.3.63 Zweifellos kann ein Übergang $m_{(\pm)}(n) \to m_{(\pm)}(n,q)$ mit $q > 0$ nicht direkt stattfinden, weil das Radiacap-

spektrum für Quantenzahl n Koordinate erscheint. Wenn zu n ein Komplementärsystem existiert kann mittels Spontanübergang eine beliebige Änderung von n auftreten, was aber einen Widerspruch für Voraussetzung des Komplementärsystems bildet. Die Möglichkeit eines indirekten, Intermittierenden Übergangs ist dagegen gegeben wenn ein Zustand n' der Hauptspektral $m_{(\pm)}(n') = m'_{(\pm)}$ zwischen $q = 0$ und $q = 1$ liegt. In diesem Fall hat Intermission wäre $m_{(\pm)}(n) \to m'$ und ausschließlich $m'_{(\pm)} \to m_{(\pm)}$ zu erwarten, wobei $n' > n$ wieder auf n abfällt, was aber durch

$q > 0$ in der Spektralfunktion kompensiert wird. Diese Kompensation beim Fakemissionsübergang hat ihre Ursache in der Tatsache, daß bei $m'^{(\pm)} \to m_a(n,q)$ an die Raumkondensation der Elektrokorpuskel $m'^{(\pm)}$ als Folge des Zerfalls eine Zeitkondensation angekoppelt wird was für elektrischen Elekträr $q > 0$ der Raumzeitkondensation führt. Die Maximalkorpuskel $m^{(1)}_{(\pm)} = \mu\sqrt{2}$ sind eine Neutrokorpuskel seien, denn ihr Komplementärspektrum mißt im gewöhnlichen Massenwert μ den Faktor $\left(1 + 4\left(\frac{q}{\pi}\right)^4\right)^{-\frac{1}{4}}$ dieser Gegenwert, den mißt eine Fakemission zum Komplementärspektrum

möglich sein, wodurch die Kompensation eingeleitet wird. Da Ursprünglich bei $m^{(1)}_{(\pm)}$ unmittelbar nach dem Kollapsschluß $q = 0$ ist, muß geschlossen werden, daß eine völlige Parität zwischen den Vielfachen von e_+ und e_- herrscht sodaß neben dem Erhaltungsprinzip



$$m^{(K)}_{(\pm)} = m^{(K+1)}_{(\pm)} + \varkappa_K$$

$\varkappa_K$ – Prozeß $m^{(K)}_{(\pm)} \xrightarrow{\varkappa_K} m^{(K+1)}_{(\pm)}$ $t_K - t_{K-1}$

ein Prinzip der Ladungskonstanz wirksam sein muß, wenn $m^{(K)}_{(\pm)}(n_K)$ neutral aber $m^{(K+1)}_{(\pm)}(n_{K+1} \mp, q_{K+1})$ q_{K+1}-fache Ladung $e_\pm$ trägt. Wegen der Ladungsparität muß dann auch $\varkappa_K$ eine q_K-fache Ladung tragen,

derart, daß immer $q_{k+1}\, e_{\mp} + q_k\, e_{\mp} = 0$ ist wodurch die Ladungsparität aufgehoben wird. Die Gl. (128) muß also durch die beiden Ersatzprozesse

$$m_{(\pm)}^{(k)} = m_{(\pm)}^{(k+1)} + x_k \,,$$

$$q_{k+1}\, e_{\mp} + q_k\, e_{\mp} = 0$$

$$m_{(\pm)}^{(k)}(n_k) \xrightarrow{x_k} m_{(\pm)}^{(k+1)}(n_{k+1}, q_{k+1})$$

Gleichung (128a)

ergänzt werden. Da dieses Erhaltungsgesetz gilt, wird sich die Existenz für die möglichen Reaktionen eines isolierten Nucleides wesentlich ändern. Wenn bekannt ist wo die Grenze N des Massenspektrums liegt, offenbar kann es sich bei dieser Grenze um diejenige

Kaskadenkondensation welche das Elementarladung, die Kleinste mögliche Masse / m_e / die wir allerdings gerade stabil bleiben muß, weil ein weiterer Zerfall ein Widerspruch zu dem elementaren Charakter von m_e stehen würde.

9.3.63 Die Bestimmung der Elementarmasse kann mit auf eine Untersuchung der inelastischen Hyperstreuungen zurückgehen, die von den Komplexen Kondensationen verursacht werden. Zunächst mit die Massenspektrometer interpretiert werden. Zu diesem Zweck wird eine empirische gut bekannte Masse einer

Elementarkörperchen zusammen mit dem q - Netz dieses Körperchen in die Spektralpunkte eingesetzt und der entsprechende n - Wert eliminiert. Man hat die Quantisationsgrenze $S = \frac{h^2}{8 e m^3}$ auf den eliminierten Wert n bezogen, so geht sich der $\frac{S}{n}$ immer im Bereich meteoritischer Längen. Der $\frac{S}{n}$ wird immer als meteoritische Härte einer Kugelschale (meteoritisches Kondensationsniveau) aufgefasst werden, deren Volumen bestehen aus ganzzahligen Vielfachen der meteoritischen π - Zellen sein wird. Die Menge dieser Zellen wird dabei von der ganzzahligen Reihenfortsetzung und der

sphärischen Natur der synechischen also singestörten Kondensation bestimmt. Wegen der Interpretationsmöglichkeit von $\frac{S}{n}$ als meteoritische Raum die ganze meteoritische Hypersphäre der Kondensation auf ein einfaches elektrisches Tensorfeld bezogen werden, wo die Spektralpunkte nur von einem laufenden meteoritischen abhängen, was aber das Charakteristikum einfacher meteoritischer Tensoren ist. Die Projektion der Kondensationskurvenreihe in die elektrische Ebene π_2 des einfachen Tensorfeldes liefert dann ein System konzentrischer Kreise ~~V. siehe nach einem als Theorie einfa~~

V Anmerkung, siehe Seite 328

~~Tensoren beliebigen Typs~~

das n-fache eines Einheits-Kreises (übergeht auf die Fläche) und seine Flächeninhalt des einfachen elektrischen Tensorium identisch ist. Ist $y = v\sqrt{\varepsilon}$ die Länge des einfachen Tensoriums und $\sqrt{\varepsilon}$ seine Breite (quadratische bestimmen im magnetischen Fall), dann kann mit der Flächeninhalt $\int dF = E\,[m^2]$, also der Einheitskreisfläche πE die Elektronenzypper n genau $n\pi E = \varepsilon y \sqrt{\varepsilon}$ durch die Länge y des Begriffstensoriums ausgedrückt werden.

Ganz zwanglos wird $n = n_N$ zum absoluten Grenzwert der Konvulsion wenn $y = R_e$ mit dem größtmöglichen Abstand

deutsch wird der noch im Rückgebiet der betreffenden Konvulsion liegt. Dieser Abstand ist im $n_N = \frac{e}{\pi} \cdot \frac{\pi_e}{E}\sqrt{\varepsilon}$ einzusetzen und damit ist in der Spezialisierung unter der Annahme einer Elementarmasse $m_e^{(\pm)}$ gültig substituieren. Im Gradkatharsis gesetzt $\varrho q e^{-q} \sim \left(\frac{r}{s} - 1\right)^2$ für $r > s$ muß es eine bestimmte Grenze R_e des Definitionsbereiches überhaupt geben, bei welcher $q = 1$ wird, was aber $\varphi(R_e) = \frac{s}{3} c^2 = 2\omega c$ bedeutet. Mit $\varphi(R_e) = \varrho_0 \frac{m}{R_e}\left(\frac{R_e}{s} - 1\right)^2$ und $\alpha = \frac{\omega c}{\varrho_0 m} \cdot s$ wird dann $R_e = s(1 + \alpha)\cdot\left(1 \pm \sqrt{1 - (1+\alpha)^{-2}}\right)$. Da dann auf jeden Fall $m_e \ll \rho_2$ ist aber schon $\alpha(a) \gg 1$ ist und $R_e \gg s$ sein muß, kommt nur

Der positive Zweig in Betracht, für welchen in sehr guter Näherung $R_e = 2r_S$ wegen $\alpha(m_e) \gg \alpha(\mu) \gg 1$ gesetzt werden darf, ergeben von α und S liefert dann $R_e = \frac{8}{3}\frac{c^2}{\gamma^3} h^4 m_e^{-7} = \frac{8}{3}\mu^4 \frac{h^2}{\gamma} m_e^{-7}$, was eingesetzt $n_N = \frac{8}{3}\frac{e^2}{\pi}\cdot\mu^4\frac{h^2}{\gamma}\frac{\sqrt{\tau}}{E} m_e^{-7}$ liefert. Für die Spektralfunktion gilt, $\left(\frac{m_e}{\mu}\right)^4 \cdot \left(1+4\left(\frac{q}{\pi}\right)^4\right) = \frac{2n_N}{(2n_N-1)^2} \approx \frac{1}{2n_N}$ weil auf jeden Fall $n_N \gg 1$ ist. Eingesetzt von $n_N = \frac{8}{3}\frac{e}{\pi}\mu^4\frac{h^2}{\gamma}\frac{\sqrt{\tau}}{E} m_e^{-7}$ in $2n_N\cdot\left(\frac{m_e}{\mu}\right)^4\left(1+4\left(\frac{q}{\pi}\right)^4\right) = 1$ liefert dann $m_e^3 = \frac{16}{3}\frac{e}{\pi}\left(1+4\left(\frac{q}{\pi}\right)^4\right)\frac{h^2}{\gamma}\frac{\sqrt{\tau}}{E}$. Dieser Ausdruck kann noch mit $\tau = \frac{\gamma h}{2\omega c^2}$ und $\omega = \frac{4}{3}c$ umgeschrieben werden, was dann für die Elementarmasse und ihr neutrales Komplement

$E\cdot\left(m_e^{(\pm)}\right)^3 = 2\frac{e}{\pi}\left(1+4\left(\frac{q}{\pi}\right)^4\right)\frac{h^2}{c}\cdot\sqrt{\frac{8h}{3\gamma c}}$

gleichung i

liefert. Trägt diese Elementarmasse mit ihre Elementarladung $e_\pm$, sodass $q=1$ zu setzen ist, dann folgt nach Einsetzen der Naturkonstanten

$E\cdot m_e^3 = 2\frac{e}{\pi}\left(1+\frac{4}{\pi^4}\right)\cdot\frac{h^2}{c}\sqrt{\frac{8h}{3\gamma c}} \approx$

$\approx 775{,}1\cdot 10^{-93}$ also

$m_e^{(\pm)} \approx 9{,}18\cdot 10^{-31}$ [Kg];

$m_e^{(\pm)}$ liegt aber nur um 0,11% über dem oszillographisch gemessenen Wert der Elektronenmasse, sodass die Elektronen und Positronen als Antielektronen tatsächlich als Minimalmassen für $e_\pm$ angesprochen werden müssen, die noch imstande sind, eine Elementarladung

$e^{\pm}$ zu tragen. Wenn also bei einem Intermissionsprozess eine neutrinoähnliche Neutrokorpuskel in das mit $e^{\pm}$ einfach geladene Komplement als erstes Glied des jeweiligen Komplementärspektrums übergeht, dann kann es sich dabei nur um einen β-Prozess handeln, bei welchem minus ein Elektron als β-Quant emittiert wird. Hieraus kann nun die Bedingung einer Intermission zum ersten Glied des Komplementärspektrums abgelesen werden. Zunächst folgt aus der Existenz von Gl. (1) für jede Neutrokorpuskel $m_{(\pm)}(n) = \frac{\mu \sqrt[4]{2n}}{\sqrt{2n-1}} = m_0$ q.e.d., aber das radiuslose Komplement $m_{(\pm)}(n,q) = m = \pi m_0 \cdot (\pi^4 + 4q^4)^{-\frac{1}{4}} < m_0$ ist, dass das Verhältnis der komplementären Massen [illegible]

$$\frac{m_0}{m} = \sqrt[4]{1 + 4\left(\frac{q}{\pi}\right)^4} \qquad (130)$$

Gleichung (130) beschrieben wird. Dies bedeutet aber, dass für das erste Glied des Komplementärspektrums nämlich $q = 1$, immer $m_0 \approx 1{,}01 \cdot m$ gilt, d.h. die Neutrokorpuskel [illegible] stets um ca 1% höher als die Masse des einfach geladenen Komplements. Auch für elementare Masse des Elektrons muss es demnach auch ein ambivalentes Neutroelektron $m^{(\pm)}(n,q)$ geben, welches eine um 1% höhere Masse als das Elektron hat und als Neutrino bezw. Antineutrino interpretiert werden kann. ✓

✓ Anmerkung auf Seite 333

Wenn es nun zu einem Fakemissionsprozess im Sinne eines β-Zerfalls kommt, dann nur auf jeden Fall der Uebergang $m_0 \to m_0'$ mit $m_0 > m_0' > m$ voraussehen und $m_0' \not\to m$ ausschließen, woraus hervorgeht, daß auf jeden Fall $m' - m > m_e^{(\pm)}$ sein muß, weil ~~auf jeden Fall~~ ein β-Quant als Elektron emittiert wird. Da außerdem $m_0 > m_0'$ ist muß erst recht $m_0 \quad m > m_e^{(\pm)}$ sein und hieraus kann die Bedingung für Fakemission abgeleitet werden. Bei derartigen Prozessen ist immer $q = 1$, sodaß stets $m \approx \frac{m_0}{1{,}01}$, also $m_e^{(\pm)} < m_0\left(1 - \frac{1}{1{,}01}\right) = \frac{m_0}{101}$ wird und dies ergibt die Bedingung

$$m_0 > 101\, m_e^{(\pm)}$$

für den Fakemissionsprozess. Die Heitzkonstante müßte also immer in ihrer Masse höher liegen als 101 Elektronenmassen, wenn es zu einem Konkurrenzprozess kommen soll, wobei Gl. (130a) mit als eine grobe vorläufige Näherung aufzufassen ist. Trotz dieses Näherungscharakters geht aus der Bedingung unmittelbar hervor, daß es im Rahmen der universell bisherigen Kaskadentheorien Reaktionen gibt, die von Bari Heitzkonstanten wie Bari begeh. auch Bari Strahlen ($\beta_0^{(\pm)}$) zum Elektron bezw. Positron ($\beta^{\pm}$) geben kann. Die Ruhelektronenmassen des Heitz-

(130a)

(n) und des Protons (p) stat. empirisch gut bekannt sind zwar $m_n \approx 1{,}6755 \cdot 10^{-27}$ [Kg] und $m_p \approx 1{,}6723 \cdot 10^{-27}$ [Kg], woraus hervorgeht, daß nach Gl. #130 das Neutron in der Ruhe höher liegt als das Proton, $q = 1$ positive Kodeplasmen, ~~das auch~~ welches nach jeder Berechnung der Gl. #130a vollständig m_n mit m_p also als eine einzige neutrale Korpuskel aufgefaßt werden. Die zu einem β-Prozeß fähige Masse $m_n - m_p \approx$ $\approx 3{,}2 \cdot 10^{-31}$ [Kg] $\approx 3{,}55\, m_e^{(\pm)}$ m_e (Elektronenmasse) ist, die bei welchem eine gleichzeitige Neutrinoemission stattfinden kann. Tatsächlich wird der Prozess

$n \xrightarrow{\beta^-} p$ mit einem kontinuierlichen β-Spektrum unter einer Diskontinuität beobachtet, da auf eine spezifische Neutrinoemission schließen läßt, während die Restmasse von mindestens $0{,}55\, m_e^{(\pm)}$ als Einzelphoton der Energie $0{,}55\, m_e^{(\pm)}$ c oder als Kinetische Energie der β^--Teilchen der β^--Spektren erscheint. Dieser Sachverhalt deckt sich genau mit dem beobachteten (n, p)-Übergang, doch kann vorerst noch nicht entschieden werden, ob es sich mit einer oder zu zwei Neutrinoemissionen kommt und ob im letzten Fall ein Neutrinopaar (Neutrino, Antineutrino) entsteht.

11.3.63

Nach den vorangegangenen Ergebnissen über die Konstruktion einer symmetrischen Korrelationsmatrix der Partialstrukturen durch eine einfache Doppelsumme Problematik festgelegt, die in der folgenden Darstellung zusammengefaßt werden kann.

a) Das zeitliche Auswahlgesetz $n(t)$ mit $q(n,t)$ muß explizit gegeben sein.

b) Nach dem Auswahlprinzip müssen die Terme n_k, $q(n_k)$ mit den zeitlichen Realisationsintervallen $t_{k+1} - t_k > 0$ des mittleren aufgenommenen Spektrums $1 \leqq k \leqq N$ angegeben sein.

c) Es muß festgestellt werden, wie sich strukturelle das Spektrum $m^{(k)}_{(+)}$ vom sprachgesetzlichen Auswahlspektrum $m^{(k)}_{(-)}$ unterscheidet.

d.) Es muß untersucht werden, nach welchen ~~Korrelat~~ Zuordnungsprinzipien alle korrelativen Strukturen als metrische Kondensationsgebilde ineinander transformierbar sind.

e) Die Bedeutung des empirisch festgestellten minimalen Abstandes von $m^{(-)}$ zu der aus $m^{(-)}$ abgeleiteten Strukturlosigkeit hinsichtlich der korrelativen Wahrscheinlichkeit ist zu prüfen.

Erst wenn diese offenen Fragen durch eine symmetrische der Partialstrukturen beantwortet

bei vorden Räumen ist es möglich eine allgemeine Korrespondenztheorie der metrischen Kondensationsstufen mit einer symmetrischen Besonderheit über wechselseitige Transmissionsprozesse zu entwickeln. Vor Zudar soll aber eine im vorangegangenen erklärende charakteristische Eigenschaft aller Kondensationen analysiert werden.

5. Die räumliche Aktualisierung der kosmischen Bewegung.

Bd XI S. 11 mitveröffentlicht auf S. 248

12.3.63 Das gemeinsame Kennzeichen aller, überhaupt möglichen metrischen Kondensaktionen ist die Notwendigkeit ihrer räumlichen

Korrelate. Der entsprechenden äußeren der kosmischen Weltorientierung und als Gründen der jeweiligen auch eine entsprechende Kennzeichnung gegeben ist kann festgestellt werden, daß jede Kondensation des Raumes der Zeit oder des R von transfiniten Selbstkondensationen begleitet wird. Im allgemeinen erscheinen die Selbstkondensationen als lokale transfinite Terme, sodaß sie auf diese Weise alle Strukturen der Kondensationen der Sonnenwelt R, in den transfiniten Weltbereich portieren. Die grundsätzliche Natur aller metrischen Kondensationsstufen geht dabei auf den imaginären Charakter der beiden transfiniten

Archiekräfteeinheiten gültig, denn wegen $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ werden die Eigenwerte des Koordinatenursprunges allein durch die imaginären Archiekräfteeinheiten die Welt bestimmen. Eine unmittelbare Konsequenz aus diesem Sachverhalt ist im Falle komplexer Kondensationen die Interpretation der ädischen Dimension in der R_4 als $\eta \equiv \frac{h}{mc'}$, was wiederum die ^{3} Unmöglichkeit einer ädischen Archiekraftwirkung demonstriert. Mit dieser eigentümlichen Sachverhalt findet Berücksichtigung der Natur der lokalen Feldpotenzen in Richtung der ädischen Dimension mit dem Verlauf der allgemeinen Spektralfunktion $m_{(\pm)}(n, q)$, sowie

die transfiniten Kopräskülarraumwerte $m^{(1)}_{(\pm)} = \mu \sqrt{2}$ vergleichen, denn dann das Zerfallsspektrum $n > 1$ bis maximal n_N anschließt, so wird deutlich, daß alle mehrfachen Archiekondensationen primär aus transfiniten Selbstkondensationen also lokalen Feldern jenseits der R_4, im Rahmen eines Kopräskülarraumschlusses hervorgehen, der über ein Grundsystem verwirklicht wird. Die primären Selbstkondensationen werden dabei eindeutig von vorhandenen ädischen Feldpotenzen ~~des~~ jeweils alle diese so individuellen Kondensationen haben aber ihre Entsprechung über eine endliche Hermetik

Stärke im transpiren Bereich und stehen so wegen der nachgewiesenen grundsätzlichen formalen Verwandtschaft mit dem entsprechenden Zustandsgrößen. die Wechselbeziehung zwischen der formalen Dimensionszahl und der entsprechenden Stärke ergibt sich unmittelbar aus der Proportionalität der transpiren Stärken in den π als η und ε, wobei die einzelne Faktorenzahl, von $\frac{\eta}{\varepsilon}$ im Raum (2,3), also $\eta = \frac{h}{2mc}$ und $\varepsilon = \frac{h^2}{\gamma m^3}$ zu verwenden ist. Substituiert man von hier aus die Beziehung $\varepsilon = \frac{8\eta^3 c^3}{\gamma h}$ oder $\gamma h = 8c^3 \frac{\eta^3}{\varepsilon}$. Dieses Produkt γh ist aber der

Zähler im Betrag $\tau = \frac{\gamma h}{2\omega c^2} = \frac{3\gamma h}{5c^3}$. Die Substitution ergibt dann $\tau = \frac{3\eta^3}{\varepsilon}$, also den Zusammenhang

$$\eta = \sqrt[3]{\frac{\tau}{3}\varepsilon}$$

Gedanken

der auch im transpiren Bereich gelten muß und aus dem unmittelbar hervorgeht, daß die Eigenfrequenz $\eta(\varepsilon)$ über R_4 verläuft. Die auf diese Weise 14.3.63 veränderte Entsprechung hat aber eine unmittelbare Rückwirkung auf die Stärke des R_4 und damit auf die gesetzliche Zuordnung eines Zustandes im R_3, da mit der Faktorenzahl $2\eta = \frac{h}{mc}$ gleichzeitig auch wenn man annimmt daß m die Ruhemasse eines Körpers ist

unter dieser Annahme gilt dann
$mc^2 = E_K = pc$ mit dem
gegen $\hat{A}$ invarianten Faktor
p einer Elementarkomponente.
Einsetzen liefert $p\eta = \frac{h}{2} = \pi\hbar$
nach Gleichung 131 gilt dann aber
$p = \frac{h}{2}\cdot\left(\frac{\tau}{3}\frac{\varepsilon}{V}\right)^{-\frac{1}{3}}$, woraus hervorgeht, daß p mit ε zunehmen muß und zwar proportional der Rückstrahlung grundsätzlich über ein Strahlkondensat bezw. Resonanzfeld weil $\varepsilon = \frac{\Lambda}{2} = \frac{h^2}{V m^3}$ als Resonanzvolumen interpretiert werden muß. Jede Strahlung im R_3 wird also nach dieser Beziehung über ein Strahlkondensat von der punktförmigen Fortsetzung des betreffenden Raumzeitkontinuums bestimmt. Bei dieser

Kopplungsmöglichkeit äußerster Teilchenpotenzen auf die R_4 = Diskontinuitätsstellen ist es offensichtlich, daß ein mikrocosmisches Kondensationssystem vorliegt, also eine Kollektivmechanik Typus. Im Falle des Kondensationssystems gilt für jede Strahlung $w = \oint p\,ds = 2\pi \int p\,dr$ und $w = N\hbar$ mit $N \geq 1$, also $\pi \int p\,dr = N\pi\hbar \geq \pi\hbar = p\eta$, woraus sich eine Ausschlußrelation, nämlich $\frac{w}{2p} \geq \eta$ ergibt, die aussagt, daß die äußersten Teilchenpotenzen grundsätzlich in akausaler Weise eine mechanische Kondensation über $p \sim \varepsilon^{-\frac{1}{3}}$ zeitlich aktualisieren. Auch $p\eta = \pi\hbar$, $p = \frac{h}{2}(\tau/3\cdot\varepsilon)^{-\frac{1}{3}}$, $\frac{w}{2p} \geq \eta$

Gleichung 134

wird der Prozeß der ädischen Aktualisierung des zeitlichen Geschehens einer metronomischen Kondensation, wie er aus methodischen Notwendigkeiten bei der Konstruktion der ädischen Welt exponiert werden müßte völlig transparent. Nach dem Vorhergehenden vollziehen die ädischen Selbstexpansionen nicht nur mit der entelechialen Dimension transzendente Selbstkondensationen als integrierte oder Komplexe Kondensationen zeitlich erscheinen vielleicht hat jede R_4-Struktur wegen der begleitenden transzendenten Nennektive eine transzendente Fortsetzung. Nach Gl. 131

ist aber die zur Kondensation gehörige entelechialstruktur grundsätzlich, wegen der nachgelassenen ädischen Nennektive mit $s_{(4)}$ gekoppelt, sodaß diese ädischen Selbstexpansionen die entelechialstruktur standig andern und im Rückfall $s_{(2)} = x_4$ zeitlich neu aktualisieren, was nach Gl. 131a im R_3 als zeitliches Geschehen erscheint dessen Zuordnung wegen der Interpretation von ε immer über ein Gradkoeffizientsystem vermittelt werden. Auch müßte es im Falle einer metronomischen Kondensation zu einer aktualen aktualisierung kommen d. h. zu jedem Ereignis des R_4 hinsichtlich der entsprechenden

Korpuskel gibt es als Fundamentalpotenz ein ganzes Spektrum faktischer Möglichkeiten, durch welche die Wahl der Aktualisierung aus dem Aon lediglich grundsätzlich Reinem Kausalgesetz, weil immer $\frac{w}{2p} \geq 1$ bleibt. Hat denn eine große Zahl mikronischer Kondensationen eine statistische Kollektive Bildet, muß es gar Superposition aller akausalisierten Raumen sodaß die makroscopic Kollektive insbesondere auf die Peristase so aktualisiert wird wie es insbesondere auf diese Peristase dem Größten Wahrscheinlichkeitsgrad aller mikronischen Kondensationen entspricht. Auf diese Weise

existiert eine makronische Kausalität, deren besonderer Aktualisierungscharakter von der Peristase also der zugehörigen Korrespondenzstruktur entsprechenden Aktualisierung der Umgebung geprägt wird. Da jede mikronische Kondensation in der R_3-Projektion als mikronisches Struktursegment der Welt also auch der Raumpotenz Π_x aufzufassen ist und die räumliche aktualisierte Lage des jeweiligen Geschehens eines R_3-Aktuats in der Richtung x_4 erfolgt muß insbesondere (gesetzlos) bestehen, daß die Aktualisierung aller R_3-Aktuate des physischen Universums ein integrales räumliches Akt-

dividuumsprozess ist. Das geschichtliche Geschehen des ganzen Universums in seiner Geschichtlichkeit wird aber als kosmische Bewegung definiert, sodass festgestellt werden muss, dass eine universale äussere Teleologie existiert, welche jedoch die kosmische Bewegung des Universums als zeitliches geschichtliches Geschehen akzidiert.

IX

Symmetrie der Partialstrukturen ~~Korrelationen~~

1.) Strukturenkeime und Gitter-Keimselektoren

siehe Band XII Seite 122-138

Insbesondere nachgewiesene kosmische Keimeweite berücksichtigend und

Band XI S. 11

Anmerk. S. 333 6) Berücksichtigung der ausgezeichneten Keimselektoren

damit $\overline{\chi}_{(1)}$ ($\chi_{(3)}$, $\chi_{(4)}$) aber Seite 134 begründen: X S. 47 – 49, 40 – 45, S. 60 – 61, 13, 61

Formel χ B. $\frac{6}{X}$ S. 61

2.) Polarkoinzidenz durch Spinfeldselektoren

Band XI S. 75 – 96 19. 3. 63

Nach der Faktorisierung der Elementarkeime durch Strukturenkeimen erscheint es zunächst zweckmäßig im kosmischen Bereich U_{φ} des R_6 mit $\varphi \leq 6$ die antikommutativen Anteile der Elemente von $\overline{\chi}$ zu unterstreichen, denn auf diese Anteile sind die Antisymmetrisierungen der Fundamentalkondensatoren aller Partialstrukturen in der ~~symmetrischen Verkettung~~ Symmetrik integral auf den kosmischen Kondensator des Kompositionsfeldes zurückgeführt. Zur Kürzung $\overline{\chi}_{(\mu,\nu)} = \overline{\chi}_{\mu\nu}$ für ein Element aus $\overline{\chi}$ gesetzt, dann

Kann nach der Analyse von Spinorfeldintegralen metrischer Hyperstrukturen, gemäß $\overset{2}{\mathfrak{F}}_e = \overset{2}{\mathfrak{P}} = \frac{1}{2} \overset{(x)}{\mathrm{ROT}} \overset{1}{\Phi}$ der antihermitesche Anteil $\overset{2}{\mathfrak{F}}_e = \overset{2}{\mathfrak{F}}_e^+ + \overset{2}{\mathfrak{F}}_e^-$ einer durch den Spinselektor, also durch den metrischen Feldtor (hinsichtlich der Gitterselektoren $C_{ik} = \alpha_k (\,)_k$) eines Spinfeldselektors ausgedrückt werden, was für den hermiteschen Anteil die Darstellung $\mathfrak{F}^+_{\tilde{k},l} = \mathfrak{F}_{\tilde{k}} \Phi_l$ für antihermitesche Komponenten zur Folge hat. Hierbei ist eine Indizierung auf jeden Fall antihermitesch während die andere zum $V_{\mathfrak{P}^+}$ gehören kann. Die Komponenten von $\overset{2}{\mathfrak{F}}_e^+$, die

vollständig im $V_{\mathfrak{P}^+}$ liegen, können morgen nicht durch Φ ausgedrückt werden. Wegen der Antikommutativität von $\overset{2}{\mathfrak{F}}_e^+$, gilt also im antihermitesch Bereich $\mathfrak{F}_{\tilde{k}} \Phi_l - \mathfrak{F}_l \Phi_{\tilde{k}} = 0$ während im $V_{\mathfrak{P}^+}$ dagegen $\mathfrak{F}_p \Phi_q - \mathfrak{F}_q \Phi_p = \mathfrak{F}_{-p,q} \neq 0$ bleibt, weil im $V_{\mathfrak{P}^+}$ der hermitesche Anteil nicht durch den Spinfeldselektor dargestellt werden kann, woraus folgt, daß dieser Feldtor im engen Zusammenhang mit der hermetischen Stärke des betreffenden Elementes aus $\mathfrak{F}$ stehen muß, da die Hyperstärke eines metrischen Tensorfeldes metrisch durch die Hyperselektoren definiert ist, was das Selektorfeld $\overset{2}{\mathfrak{F}}_e$ zur Folge

hat, denn eine Spinorentwicklung abbricht, wenn eine antiherm. Basis des Fundamentalspinors existiert aber andererseits diese Spinorentwicklung als Verjüngung des metrischen Feldes aufgefaßt wird, mit der metrischen Rotation des Spinorfeldselektors im $\mathfrak{V}_{\Psi^+}$ die hermetrische Funktion $\overset{z}{f}{}^+$ verjüngen oder zumindest aktivieren, sodaß die Bezeichnungen Feld-aktivator für $\overset{z}{f}{}^-$ bezw. Potential für $\overset{z}{f}{}^+$ gerechtfertigt erscheint. Nach der Hermetie-bedingung ist $\overset{z}{f}{}^+ \cdot n = \text{const}$ invariant auf die antihermetischen Gitterselektoren, sodaß im antihermetischen Bereich

auch $\underset{\tilde{\kappa}}{\mathfrak{f}} \Phi_{\tilde{l}} = \text{const}$ sein müß. Ist auch $l = \tilde{l}$ antihermetisch so kann $\underset{\tilde{\kappa}}{\mathfrak{f}} \Phi_{\tilde{l}} = \text{const}$ nur wenn $\Phi_{\tilde{l}} = \sum_{m=1}^{6} \Phi_{(\tilde{l})m} (\mathfrak{V}_{\Psi^+}) z^{m}$ erfüllt werden, wenn $z^{m} = \ldots = \alpha_m ()^{m}$ ein kontravariantes Gitterselektor ist. Wegen der Hermi-tezität des Potentiales ergibt sich unmittelbar die Symmetrie $\Phi_{(\tilde{l})m} = \Phi_{(m)\tilde{l}}$, weil dann $\mathfrak{f}_{+\tilde{\kappa}\tilde{l}} = \underset{\tilde{\kappa}}{\mathfrak{f}} \Phi_{\tilde{l}}$ gilt. Dieses Gesetz gilt aber nur solange $\tilde{l}$ wirklich im antihermetischen Bereich liegt, nicht aber wenn l ein Element von $\mathfrak{V}_{\Psi^+}$ ist, was wegen $\mathfrak{f}_{+\tilde{\kappa}l} = \underset{\tilde{\kappa}}{\mathfrak{f}} \Phi_{l}$ möglich sein kann. In diesem Fall wäre $\mathfrak{f}_{+\tilde{\kappa},l}$ ein Linearaggregat der antihermetischen Gitterselektoren, was einen

Widerspruch zu der Hermitizität gefordert wird außerhalb des $\mathfrak{B}_{g\pm}$ bildet. Die einzige Möglichkeit ist durch $\varphi^{(l)}_{m} = a_{l,m} = \text{const}$ gegeben, was im antihermitischen Bereich zu

$\mathcal{F}_{+\bar{\kappa},l} = a_{\bar{\kappa},l} = a_{l\bar{\kappa}} = \text{const}$

mit $\mathcal{F}_{-\bar{\kappa}l} = 0$ führt, während im $\mathfrak{B}_{g+}$ hingegen $\mathcal{F}_{+\kappa,l}$ ($\mathfrak{B}_{g\pm}$) aber

$\mathcal{F}_{-\kappa,l} = a_{\kappa,l} - a_{l,\kappa} = \text{const} \neq 0$

gilt. Für die Kovarianten im $\mathfrak{B}_{g+}$ muß also eine Unsymmetrie von $a_{\kappa,l}$ zugelassen werden, was keines Widerspruch zu

$\mathcal{F}^{(l)}_{(m)} = \mathcal{F}^{(m)}_{(l)}$ bildet, denn diese Symmetrie gilt nur im antihermitischen Bereich.

Grundsätzlich gilt also für jedes Element aus $\mathcal{F}$ nach der Spaltung $\mathcal{F} = \overset{+}{\mathcal{F}} + \overset{-}{\mathcal{F}}$, wo das Positive

fehl im antihermitischen Bereich konstant aber im $\mathfrak{B}_{g+}$ eine Hermitefunktion der hermitischen Gittersektoren ist, während der Feldaktivator im antihermitischen Bereich überhaupt nicht, im $\mathfrak{B}_{g+}$ aber nur als Konstante existiert. Dieses Verhalten hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Fundamentalkovarianten, die Komponenten von $\left[\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right] \neq$

$\neq \left[\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right]^{*}$ sind $[i\,k\,e]^{(\kappa,\lambda)}_{(\mu,\nu)} =$

$= \mathcal{F}^{i\,s}_{(\kappa,\lambda)}\,(\,)\,[s,\kappa,e]_{(\mu,\nu)}$ und

sein Kovariant

$2\,[s,\kappa,e]_{(\mu,\nu)} = \underset{\kappa}{\mathcal{F}}\,\mathcal{F}_{s,e} + \underset{l}{\mathcal{F}}\,\mathcal{F}_{\kappa,s} -$

$- \underset{s}{\mathcal{F}}\,\mathcal{F}_{\kappa,e} = \underset{\kappa}{\mathcal{F}}\,\mathcal{F}_{+s,e} + \underset{l}{\mathcal{F}}\,\mathcal{F}_{+\kappa,s} -$

$- \underset{s}{\mathcal{F}}\,\mathcal{F}_{+\kappa e} = 2\,[s,\kappa,e]_{(\mu,\nu)+}$ weil

immer $\mathcal{F}_{-\kappa,e} = \text{const}$ das

$\mathcal{F}_{-\bar{\kappa},e} \overset{!}{=} 0$ ist. Dies bedeutet aber auch $\mathcal{F}^{i,s}_{(\kappa,\lambda)}\,;\,(\,)\,[s\kappa e]_{(\mu\nu)} =$

$= [\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\ell}{\underset{\nu}{}}]^{(\kappa,\lambda)}_{(\mu,\nu)+}$, oder $[\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\lambda}{\underset{\nu}{}}] = [\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\lambda}{\underset{\nu}{}}]_+$, weil die Kovariante Symmetrie nicht von einer evtl. Antihermitezität der Kontrasignatur beeinflußt wird. Die kanonische Folge der Feldaktionen durch Spinfeldoperatoren ist also $[\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\lambda}{\underset{\nu}{}}]_- = \hat{0}$, ausführlich $\sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda=1}^{3} \left([\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\lambda}{\underset{\nu}{}}]_+ + sp\, \overset{2}{R}{}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu,\nu)} \times [\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\lambda}{\underset{\nu}{}}]_- \right) = \overset{3}{0}$ der symmetrischen Superposition $[\,] = \sum_{\mu,\nu,\kappa,\lambda=1}^{3} \left([\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\lambda}{\underset{\nu}{}}]_+ + sp\, \overset{2}{R}{}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times [\overset{\kappa}{\underset{\mu}{}}\ \overset{\lambda}{\underset{\nu}{}}]_+ \right)$ identisch erfüllt wird.

Da $f_{+\tilde{\kappa}\ell} = const$ und $f_{-\tilde{\kappa}\ell} = 0$ ist wird die Eigenschaft aller Fundamentalkondensoren $[\tilde{\kappa}\,\tilde{\ell}]^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = 0$ im antihermetischen Bereich hinsichtlich der Kovarianten Integrierungen von selbst erfüllt, weil in $[s\,\tilde{\kappa}\,\ell]_{(\mu\nu)}$ die

Summanden entweder hermitische Funktionale f (hermetisch auf $f_{+\tilde{\kappa}\rho}$ oder $f_{-\tilde{\kappa}}$ (antihermetisch auf $f_{+s\ell}$ (ρ, s) einwirken sodaß in jedem Fall eine Konstante hinsichtlich des partiellen Funktionendifferentials besteht. Bei der §3.3.63 formulierten des Symmetrischen Fundamentalproblems hat man also (siehe 132 bis 141a) von den Eigenschaften der Feldaktivatoren und Feldaktionatoren nämlich

$\overset{2}{K}{}^{(1)} = \overset{2}{K}{}^{(1)}(\overset{\nu}{Z}, \overset{6}{Z})$, $\overset{2}{K}{}^{(2)} = \overset{2}{K}{}^{(2)}(\overset{\mu}{Z})$,

$\overset{2}{K}{}^{(3)} = \overset{2}{K}{}^{(3)}(\overset{\kappa}{Z})^{3}_{\tau}$, $f^{(\mu,\nu)} = sp\, \overset{2}{K} \times \overset{2}{K}{}^{(2)}$

$f^{\tilde{\kappa}\ell}_{(\mu,\nu)+} = const.$, $f^{\kappa\ell}_{(\mu,\nu)+} = f^{(\kappa\ell)^{(4)}}_{(\mu,\nu)+}(\rho, s)$,

$f^{\tilde{\kappa},\ell}_{(\mu,\nu)-} = 0$, $f^{\kappa,\ell}_{(\mu,\nu)-} = const.$ 142

Gleichung

ausgedrückt, deren linke Seite

Konsequenz die Eigenschaft der Kovarianten Hermitezität aller Fundamentalkonnexoren

$$\left[\frac{\varkappa}{\mu}\,\frac{\lambda}{\nu}\right] = \left[\frac{\varkappa}{\mu}\,\frac{\lambda}{\nu}\right]_+ = \left[\frac{\varkappa}{\mu}\,\frac{\lambda}{\nu}\right]^*$$

Gleichung 142a

ist. Mit dieser hermiteschen Symmetrie kann also der zusammenhängende symmetrische Raum ~~Koordinatenraum~~ Weltgeometrie ~~postuliert~~ werden.

~~Ergänzende Anmerkung zu Bd XI S. 21~~

Nach der symmetrischen Metrik-theorie aus A VIII gibt es in R_6 endlich $\omega = 3$ Parallelstrukturen, die in einer wechselseitigen Korrelation stehen und das Kompositionsfeld strukturieren. Die darstellende durch hermitesche Strukturen

~~definiert nach Cl. L~~ derartige Parallelstrukturen dürfen drei Alternativselektoren und das damit verbundene Ensemble exkludierender Korrelativvariablen in Frage, da es auch bei den Korrelatoren um die Zusammenfassung verschiedener metrischer Strukturen im Kompositionsfeld handelt. Der verhaltene Raum deshalb als symmetrisch bezeichnet werden, weil es darauf reduzierbare in einer Alternativ-hermiteschen Raum. Während die symmetrischen Korrelationen nach A VIII durch einen konsorziellen Korrelationsselektor $\overline{\mathfrak{Z}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ übergeführt auf $\left[\frac{\varkappa}{\mu}\,\frac{\lambda}{\nu}\right]$ ausgedrückt

$\overline{V_{III}}$

gilt nach A ~~(4)~~ für die Superposition der Fundamentalkonnexoren zum Konnexor des Kompositionsfeldes

$$\widehat{[\,]} = \sum_{\varepsilon=1}^{3} \left(\widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]} + sp\ {}^{2}\overline{\mathfrak{Q}}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]} \right)$$

wenn für Kürzung $\varepsilon = (\kappa, \lambda, \mu, \nu)$ gesetzt wird. Nach den vorangegangenen Ergebnissen ist die Wirkung dieser metrischen Superposition stets $\overline{{}^{2}y} = \overline{{}^{2}y}^{\times}$ aber

$\overline{{}^{2}y}_{(\mu,\nu)} \neq \overline{{}^{2}y}^{\times}_{(\mu,\nu)}$, was $[\,] = [\,]^{\times}$ impliziert

$$\widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]} = \widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{+} + \widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{-} \neq \left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]^{\times}$$

Invarianten der Konnexoren Basisvektoren zur Folge hat. Dieses Symmetrieverhalten in der symmetrischen Grundbeziehung kann aber nur dann erfüllt werden, sofern für die

(Fortsetzung unter 142 a identisch mit Fall 1)

symmetrische Grundbeziehung im Falle der metrischen Form der Welt

$$\widehat{[\,]} = \sum_{\varepsilon=1}^{3} \left(\widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{+} + sp\ {}^{2}\overline{\mathfrak{R}}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu,\nu)} \times \widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{+} \right),$$

~~$\sum_{\varepsilon=1}^{3} \left(\widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{-} + sp\ {}^{2}\overline{\mathfrak{R}}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu,\nu)} \times \widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{-} \right) = \overline{0}$,~~

$\varepsilon \equiv (\mu, \nu, \kappa, \lambda)$

Gleichung 143 ~~98~~

zu verwenden ~~ist~~. Es kann (zur 3.2.2.3) mit Gl. 143 ~~98~~ die Kompositions-Weltgleichung ~~115~~

~~$\widehat{[\,]} = \overline{0}$~~ zu spalten und demgegenüber, sofern eine symmetrische Weltgleichung existiert. Zu diesem Zweck wird $L = K - \overline{\lambda x}()$, also die Darstellung durch den Raum-Konnexor

$$\widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{-} \times \widehat{\left[{}^{\kappa\ \lambda}_{\mu\ \nu} \right]}_{-} = \overline{0}$$

$\lambda \times [\,] = \mathcal{K}$; $[\,]$ ist der Koordinatenform $\lambda_m (K,\ell) \cdot [K^i, e] = / K_m ; [K^i, \ell] = \dots$

$= \sum_{\varepsilon=1}^{3} \left([K^i, e]^{(\varkappa,\lambda)}_{(\mu,\nu)} + Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu,\nu)\,t} [K^t, \ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu,\nu)} \right)$ verwendet. / auf diese Weise folgt

$K_m ; [K^i, \ell] = \sum_{\varepsilon=1}^{3} \Big(\dots$

$+ \mathcal{C}^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,K,\ell,m} \Big) = \sum_{\varepsilon=1}^{3} \Big(\Big(\Big(\frac{K\lambda}{\mu\nu} \Big)^{(+,-)}_{(-)\ell} \cdot \delta(\underline{\ell}, m) - \Big(\frac{K\lambda}{\mu\nu} \Big)^{(+,-)}_{(-)m} \Big) ; [K^i, \ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} + \Big(\Big(\frac{K\lambda}{\mu\nu} \Big)^{(+,-)}_{(-)\ell} \cdot \delta(\underline{\ell}, m) - \Big(\frac{K\lambda}{\mu\nu} \Big)^{(+,-)}_{(-)m} \Big) \cdot Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} [K^t, \ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} + \mathcal{C}^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,K,\ell,m} \Big)$ oder $K \cdot [\,] =$

$= \sum_{\varepsilon=1}^{3} \Big(K^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} ; \big[E + \delta p \, \mathcal{Q}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \chi(\,) \big] ; \big[\frac{\varkappa\lambda}{\mu\nu} \big] + \dots$

$+ \mathcal{C}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$). Hierin bedeutet die Koordinatenform von $\mathcal{C}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ als quadratische Matrix (Adjunkte der Koeffizienten-Koordinatenform).

Für diese quadratische Korrelation gilt

26.3.6 (3)

$\mathcal{C}^{(\varkappa,\lambda)\,i}_{(\mu,\nu)\,K,\ell,m} = [S^i, \ell]^{(\varkappa,\lambda)}_{(\mu,\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, m]^{(\gamma,\delta)}_{(\alpha,\beta)} (1-\delta)$

$- [S^i, m]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu,\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, \ell]^{(\gamma,\delta)}_{(\alpha,\beta)} (1-\delta) + Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \cdot$

$\cdot [S^t, \ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu,\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma,\delta)\,S}_{(\alpha,\beta)\,t} [K^t, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}$

$- Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu,\nu)\,t} [S^t, m]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha,\beta)\,t} [K^t, \ell]^{(\gamma,\delta)}_{(\alpha\beta)} +$

$\cdot \Big([S^i, \ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha,\beta)\,t} [K^t, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}$

$- [S^i, m]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} [K^t, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) -$

$- Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} [S^t, m]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, \ell]^{(\gamma,\delta)}_{(\alpha,\beta)} (1-\delta) =$

$= \Big\{ \delta(\underline{K}, S) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) -$

$- \delta(\underline{K}\,\underline{\ell}, S m) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) +$

$+ Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \mathcal{S}^{*} \big(\underline{i}\,\underline{K}, t\,S \big) \cdot (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} [K^i, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}$

$- Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \delta(\underline{i}\,\underline{K}\,\underline{\ell}, t S m) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} \cdot$

$\cdot [K, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} + \delta(\underline{K}\,\underline{S}) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} \cdot$

$\cdot [K^t, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} - \delta(\underline{K}\,\underline{\ell}, S m) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} [K^t, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} +$

$+ [S^i, \ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha,\beta)\,t} [K^t, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}$

$- [S^i, m]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} [K^t, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} +$

$+ Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} [S^t, \ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, m]^{(\gamma,\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) -$

$- Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} [S^t, m]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, \ell]^{(\gamma,\delta)}_{(\alpha,\beta)} (1-\delta) =$

$= \Big\{ \delta(\underline{K}, S) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) -$

$- \delta(\underline{K}\,\underline{\ell}, S m) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} [K^S, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) +$

$+ Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \mathcal{S}^{*} \big(\underline{i}\,\underline{K}, t\,S \big) \cdot (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} [K^i, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}$

$- Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \delta(\underline{i}\,\underline{K}\,\underline{\ell}, t S m) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} \cdot$

$\cdot [K, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} + \delta(\underline{K}\,\underline{S}) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} \cdot$

$\cdot [K^t, m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} - \delta(\underline{K}\,\underline{\ell}, S m) ; (\,) \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)\,S}_{(\alpha\beta)\,t} [K^t, \ell]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} +$

$$+ Q^{(\varkappa\lambda)\underline{i}}_{(\mu\nu)t}\,\delta(\underline{i}\,\underline{k},ts);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}[\overline{k}^{s}_{m}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}(1-\delta) -$$
$$- Q^{(\varkappa\lambda)\underline{i}}_{(\mu\nu)t}\,\delta(\underline{i}\,\underline{k}\,\underline{l},tsm);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}[\overline{k}^{s}_{l}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}\Big\};$$

$$;\,[\overline{k}^{i}_{l}]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)m};[\overline{k}^{i}_{l}]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)},$$

also eine Darstellung $\overline{\mathcal{C}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]}$ mit der Eigenschaft Kontragredientvektor $D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ mit der Komponente

$$+ D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)m} = \delta(\underline{k},\underline{p}_m);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}[\overline{k}^{s}_{m}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}(1-\delta) -$$
$$- \delta(\underline{k}\,\underline{l},sm);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}[\overline{k}^{s}_{l}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}(1-\delta) +$$
$$+ Q^{(\varkappa\lambda)\underline{i}}_{(\mu\nu)t}\,\delta(\underline{i}\,\underline{k},ts);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}Q^{(\gamma\delta)\underline{s}}_{(\alpha\beta)t}\cdot[\overline{k}^{t}_{m}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} -$$
$$- Q^{(\varkappa\lambda)\underline{i}}_{(\mu\nu)t}\,\delta(\underline{i}\,\underline{k}\,\underline{l},tsm);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}Q^{(\gamma\delta)\underline{s}}_{(\alpha\beta)t}\cdot[\overline{k}^{t}_{l}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} +$$
$$+ \delta(\underline{k}\,\underline{s});_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}Q^{(\gamma\delta)\underline{s}}_{(\alpha\beta)t}[\overline{k}^{t}_{m}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} -$$
$$- \delta(\underline{k}\,\underline{l},sm);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}Q^{(\gamma\delta)\underline{s}}_{(\alpha\beta)t}[\overline{k}^{t}_{l}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} +$$
$$+ Q^{(\varkappa\lambda)\underline{i}}_{(\mu\nu)t}\,\delta(\underline{i}\,\underline{k},ts);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}[\overline{k}^{s}_{m}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}(1-\delta) -$$
$$- Q^{(\varkappa\lambda)\underline{i}}_{(\mu\nu)t}\,\delta(\underline{i}\,\underline{k}\,\underline{l},tsm);_{()}\sum_{\varepsilon=1}^{3}[\overline{k}^{s}_{l}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)}(1-\delta),$$

δ)-ten Teil zur Knüpfung ein tensorieller Zusammenhang und

$\delta = \delta_{\mu\alpha}\cdot\delta_{\nu\beta}\cdot\delta_{\varkappa\gamma}\cdot\delta_{\lambda\delta}$ verwendet, wird. Einsetzen liefert also

$$\overline{\lambda}\times\overbrace{[\,]} = \sum_{\varepsilon=1}^{3}\Big(\overline{\mathcal{K}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};\big((E+\delta p\,\overline{{}^{2}\mathcal{R}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\times$$
$$\times\,()\big) + D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\Big);\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]} =$$
$$= \sum_{\varepsilon=1}^{3}\overline{\Lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]},$$

was zu K analoge Zusammensetzung liefert $\overline{\Lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = \overline{\mathcal{K}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};(E+\delta p\,\overline{{}^{2}\mathcal{R}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\times()) + D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ Infinitesimal wird. Wegen der kontravarianten von $\sum_{\varepsilon=1}^{3}\overline{\Lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]} = \overline{\lambda}\times\overbrace{[\,]}$ liefert

$$\overline{\lambda}\cdot\overbrace{[\,]} = \sum_{\varepsilon=1}^{3}\overline{\lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\Big(\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]} + \delta p\,\overline{{}^{2}\mathcal{R}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\times$$
$$\times\,\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]}\Big) = \sum_{\varepsilon=1}^{3}\overline{\lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\big(E+\delta p\,\overline{{}^{2}\mathcal{R}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\times()\big);$$
$$;\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]}, \text{ weil } \overline{\mathcal{K}}\cdot\overline{\mathcal{R}} \text{ selbst. Einsetzen}$$
liefert $\sum_{\varepsilon=1}^{3}\big(\delta p\,\overline{\Lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} - \overline{\lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}(E+\delta p\,\overline{{}^{2}\mathcal{R}}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}\times$
$\times\,()\big);\overbrace{[\overline{\mu}^{\varkappa}\,\overline{\nu}^{\lambda}]} = \overline{20}^{(\mu\nu)}$, was wegen der Linearkombination der Elemente $\overline{\lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ verschwindet, sofern nur δp, sodaß

$$\overline{{}^2O} = \left(sp\, \Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} - \overline{\lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \cdot \left(E + sp\, \overline{{}^2Q}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \right.\right.$$

$$\left.\left. \times (\,)\right)\right) ; \left[\overline{\begin{matrix}\varkappa & \lambda \\ \mu & \nu\end{matrix}}\right] = sp\,(\Lambda^{(\varkappa\lambda)} -$$

$$- \lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \left(E + sp\, {}^2Q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right)) ; \left[\overline{\begin{matrix}\varkappa & \lambda \\ \mu & \nu\end{matrix}}\right]$$

Sind auch hier Kanonische Invariante selekta antikommutierende Art existieren, sodass sich mit ihnen symmetrische Weltselektor $L^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ =

$$= \Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} - \lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \left(E + sp\, {}^2Q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right)$$

nach Kürzestem als Antikommutatoren symmetrische Weltselektion

$$L^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} ; \left[\overline{\begin{matrix}\varkappa & \lambda \\ \mu & \nu\end{matrix}}\right] = \overline{{}^4O}$$

Lösung 344

Lösung.

Da diese Vertauschung mit der symmetrischen Weltselektor im wesentlichen dieselbe Analogie zum Kommutator wie der quadratischen Kombination

Antisymmetrische beschränken, was durch

$$L^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = \Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} - \overline{\lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \left(E + sp\, {}^2Q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right),$$

$$\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = K^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} ; \left(E + sp\, {}^2Q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right) + D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)},$$

$$K^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)m} = \left(\overline{\begin{matrix}\varkappa & \lambda \\ \mu & \nu\end{matrix}}\right)^{(1,6)}_{(-)\ell} \cdot \delta(\underline{\ell}, m) - \left(\overline{\begin{matrix}\varkappa & \lambda \\ \mu & \nu\end{matrix}}\right)^{(1,6)}_{(-)m},$$

$$D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)m} = \delta(\underline{\kappa}\,\underline{\sigma}) ; () \sum_{\varepsilon=1}^{3} [\overset{\Delta}{\kappa m}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) -$$

$$- \delta(\underline{\kappa\ell}, \sigma m) \cdot () \sum_{\varepsilon=1}^{3} [\overset{\Delta}{\kappa\ell}]^{(\gamma\delta)} (1-\delta) +$$

$$+ Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \delta(\underline{i}\,\underline{\kappa}, t\rho) ; () \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\alpha\beta)}_{(\alpha\beta)\,t}{}^{(\gamma\delta)} \overset{\Delta}{[\kappa m]}^{(\varkappa\delta)}_{(\alpha\beta)} -$$

$$- Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \delta(\underline{i}\,\underline{\kappa}\,\underline{\ell}, t\rho m) \cdot () \sum_{\varepsilon=1}^{3} (Q^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)\,t}{}^{\Delta} \overset{\Delta}{[\kappa\ell]}^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} +$$

$$+ \delta(\underline{\kappa}\,\underline{\rho}) ; () \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)\,t}{}^{\Delta} [\kappa^t m]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} -$$

$$- \delta(\underline{\kappa\ell}, \sigma m) \cdot () \sum_{\varepsilon=1}^{3} Q^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)\,t}{}^{\Delta} [\kappa^t \ell]^{(\gamma\delta)} +$$

$$+ Q^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)\,t} \delta(\underline{i}\,\underline{\kappa}, t\lambda) ; () \sum_{\varepsilon=1}^{3} [\overset{\Delta}{\kappa m}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta) -$$

$$- Q^{(\mu\nu)\,t}_{(\varkappa\lambda)\,i} \delta(\underline{i}\,\underline{\kappa}\,\underline{\ell}, t\rho m) ; () \sum_{\varepsilon=1}^{3} [\overset{\Delta}{\kappa\ell}]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} (1-\delta),$$

$$\delta = \delta_{\mu\alpha} \cdot \delta_{\nu\beta} \cdot \delta_{\varkappa\gamma} \cdot \delta_{\lambda\delta}$$

Lösung 144a

Lösung.

Studienk. z. Bd. XI S. 92 bis 93

Es kommt nämlich darauf an, in analoger Weise zur Kompositionsregel eine zu finden, ob auch im spinorischen Fall für $\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ eine metrische Funktionaldarstellung existiert. Zunächst kann festgestellt werden, daß die Koeffizienten auf jeden Fall Konvergenzen insofern sind, als die $\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_+$ nach Gl. 143/98 die Funktion $[\,]$ abgeben und die Konvergenz im Funktionsraum für $[\,]$ bereits gegeben ist. Nach Gl. 143/98 ist $\sum_{\varepsilon=1}^{3}\left(\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_- + \operatorname{sp}\overset{2}{R}{}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_-\right) = \overline{3\mathfrak{O}}$ und nach Gl. 143/98 auch $\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_- + \operatorname{sp}\overset{2}{R}{}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_- = \overline{3\mathfrak{O}}$, daher $\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_+ = \Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \left(E + \operatorname{sp}\overset{2}{R}{}^{(\mu\nu)}_{(\varkappa\lambda)} \times ()\right);\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_+$ gesetzt werden kann. da $\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ als

$\varkappa\ 7.\ 3.\ 6.\ 3.$ Funktion des Integrals

Raum $\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_- = \overline{3\mathfrak{O}}$ ist,

Kondensationsstufen immer beschränkt ist, folgt $\sum_{0}^{\infty}\left(\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]^{x} \Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]^{+} - \left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]\left(\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)};\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]^{+}\right)\right) \mathfrak{F}\Omega =$

$= \sum_{0}^{\infty}\left(\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]^{x} - \left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]\right) \cdot \Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times (E + \operatorname{sp}\overset{2}{R}{}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ());\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]^{+}; () \mathfrak{F}\Omega =$

$= \overline{0}$ aber wegen $\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]^{x} - \left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right] = \overline{3\mathfrak{O}}$ ist was aber andererseits $\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_- = \overline{3\mathfrak{O}}$ bedeutet. Ω gibt im Raum metrischen Kontinuitätsintegrale das metrische Verhalten der R_6 an. Die metrische Funktionaldarstellung der $\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ als Funktionalelektat des R_6 kann gezeichnet, existiert also nur dann, wenn in Gl. 143/98 die Beziehung $\sum_{\varepsilon=1}^{3}\left(\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_- + \operatorname{sp}\overset{2}{R}{}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_-\right) = \overline{3\mathfrak{O}}$ stets $\left[\frac{\varkappa\ \lambda}{\mu\ \nu}\right]_- = \overline{3\mathfrak{O}}$ identisch erfüllt, was in

$$\widehat{\left[\frac{\varkappa}{\mu}\frac{\lambda}{\pm\nu}\right]}_{-} = \overline{0}, \quad \sum_{0}^{\infty} \widehat{\left[\frac{\varkappa}{\mu}\frac{\lambda}{\pm\nu}\right]}; () \widehat{\left[\frac{\varkappa}{\mu}\frac{\lambda}{\pm\nu}\right]}^{+}; () \int \Omega < \infty,$$

$$\sum_{0}^{\infty} sp\, \overline{Q}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \widehat{\left[\frac{\varkappa}{\mu}\frac{\lambda}{\pm\nu}\right]}; () \left(sp\, \overline{Q}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times \widehat{\left[\frac{\varkappa}{\mu}\frac{\lambda}{\pm\nu}\right]} \right)^{+}; () \int \Omega < \infty,$$

$$\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = \left(\Lambda^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \right)^{+}$$

Gleichung 146

Die Existenzbedingung des metronischen Funktionenraumes für das System symmetrischer Zustandselektoren (beschrieben durch 142a und 142b) wird durch die symmetrische Vollgleichung in Analogie zur Kompositionsform in doppelter Weise der Bildung eines hermitesch-spektralen Funktionalraumes, nämlich

$$sp\, \overline{L}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}; \widehat{\left[\frac{\varkappa}{\mu}\frac{\lambda}{\pm\nu}\right]} = \overline{0},$$

$$\left(\overline{L}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}; sp \right); \widehat{\left[\frac{\varkappa}{\mu}\frac{\lambda}{\pm\nu}\right]} = \overline{0},$$

Gleichung 146a

das zur Lösung des Fundamentalproblems der Hilbert-Korrelationen verwendet werden kann, weil sie die Existenzbedingung (gegeben durch 142 und 146) erfüllt ist. Schließlich wird noch gefordert, daß die symmetrische Vollgleichung 144 die Kompositive implizieren, was es keine operativ variierten Korrelationen der Elemente von $\overline{J}_{\overline{20}}$ gibt. Dann wird $\overline{2Q}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} =$ und $\overline{L}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = \overline{K}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} - \overline{\lambda}^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ( ) +$

$+ D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ mit $D^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = \delta(\underline{k}\,s) \cdot ( ) \cdot \sum_{\varepsilon=1}^{3} [k^{\varepsilon} m]^{(\gamma\delta)} (1-\delta) -$
$- \delta(\underline{k}\,\underline{\ell}, s\,m) \cdot ( ) \sum_{\varepsilon=1}^{3} [k^{\varepsilon} e]^{(\gamma\delta)}_{(\alpha\beta)} \cdot (1-\delta).$

Wenn auch keine Korrelation in der Fundamentalkonfiguration besteht, d.h. also wenn es nur einen Gitter-Konnektor $\overset{3}{K}_{(\mu)}$ und in je nur ein Element $\overset{3}{y}_{(\mu\mu)}$ gibt, dann wird $D^{(\mu\mu)}_{(\mu\mu)} = \delta$; ferner $K^{(\mu\mu)}_{(\mu\mu)} = (\mu)^{(1,6)}_{(-)} \delta(\underline{\mu}, m) - (\mu)^{(1,6)}_{(-)} m$ und $[\hat{\mu}] \neq [\hat{\mu}]^{\times}$; dann muß noch angenommen werden Gl 99 b gibt dann Konnex, es wegen $(\mu)^{(1,6)}_{(-)} \equiv ( )^{(+,-)}_{(-)}$ und $[\hat{\mu}] \equiv [\,]$. Zur vollständigen Identifizierung mit $L \cdot [\,] = \overset{4}{0}$, sowie formal die Bedingung 99 besagt, daß Gl 97 impliziert, wenn Gl 99 b gilt und mit eine Parkonstante ist angenommen daß.

Ergänzung 3.) Das symmetrische Fundamentalproblem
Datum 30.3.63 Bd XII Seite 139 bis 142 (oben) 145 bis 153 voranstellen

Die Darstellbarkeit der antihermiteschen Anteile der Fundamentalselektoren als Feldaktivatoren, die mit den metrischen Spurselektoren identisch sind, führt unter Berücksichtigung der metrischen Aktivatoreigenschaften der Gleichung $\overset{3}{K}_{(\mu)} = \overset{3}{y}_{(\mu\mu)}$ (142a 2,1) welche die Korrelationsfreiheit der Fundamentalkonnektoren also nach Gl. 146 99 b die notwendige Existenzbedingung des metrischen Funktionalen ergibt. Weil also der Hyperstruktur der metro-

dischen Volltensorraumes R_6 eine metrische Spinorien- klasse übertragen ist, er- weisen sich die Fundamental- konduktoren der Partialstrom- fäden als Konvergenz und $\Lambda^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)}$ als Zustandsselektor eines metrischen Faktoren- raumes, dessen Trägerraum das Volltensorraum ist. Da im Fall $\overbrace{\left[\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right]}^{}_{+}$ immer $\left(\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right)^{(+,6)}_{(\pm)} = \left(\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right)^{(+,-)}_{(\pm)}$ ist, muß für den symmetro- dischen Volltensorteil $L^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+}$ ge- setzt werden. Das symmetrische Fundamentalproblem wird daher durch Berück- sichtigung der Gl 142a in Gl 144, die präzisiert gestal- tet

$$L^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+}\,;\ \overbrace{\left[\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right]}^{}_{+} = \overline{0}$$

Gleichung 147,

worin

$$L^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} = \left(K^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} - \overline{\lambda}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right) ; \left(E + \operatorname{sp} {}^{2}\overline{R}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right) + D^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)},$$

$$\Lambda^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} = K^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+}\,;\ \left(E + \operatorname{sp} {}^{2}\overline{R}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right) + D^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)},$$

$$K^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+m} = \left(\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right)^{(+,-)}_{(-)\,l}\, \delta(l,m) - \left(\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right)^{(+,-)}_{(-)\,m}$$

Gleichung 147a

gilt, wodurch das symmetro- dische Fundamentalproblem gestellt worden ist. Zunächst folgt aus der Kennzeichnung der Selek- toren, daß es gilt $K^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+}\,;\ \operatorname{sp}\left(E + \operatorname{sp} {}^{2}\overline{R}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()\right)\,;\ \overbrace{\left[\begin{smallmatrix}\kappa & \lambda\\ \mu & \nu\end{smallmatrix}\right]}^{}_{+} = \frac{i}{2}\,\delta$ und

sowie $D^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+}$; $sp = \overline{\lambda}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times sp\,(E + sp\,{}^2\overline{Q}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ())$. sowie den zweiten Faktor der (Gl. ~~146~~ 146a) Faktorisierung, wenn man sich für den Kommutator-Korrelationsoperator $sp\,K^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+}$; $(E + sp\,{}^2\overline{Q}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ()) + (sp. \times D^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+})^{-} = (sp \times \overline{\lambda}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ())_{-}$; $(E + sp\,{}^2\overline{Q}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ())$

Gleichung ~~115~~ 148

Zur Faktorisierung der ~~Gl 117~~ 147, also für Kopplung, verursachen Fundamentalprozessen werden Anordnungen zugelassen der Kürzungen $\overline{T}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} = \overline{T}$ für die Faktorisierungen und $(E + sp\,{}^2\overline{Q}^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)} \times ())\,; [\overline{F}^{\kappa\lambda}_{\mu\nu}]_{+} = \overline{F}$ für die Faktorisierungen sowie Gl. ~~147~~ mit ~~147a~~ die Form

$\overline{K}\,; \overline{F} + \overline{D}\,; [\overline{F}^{\kappa\lambda}_{\mu\nu}]_{+} = \overline{\lambda} \times \overline{F}$, die in Komponentenform Faktorisierungsanordnung der Kaskadenfolge $\overline{F}^{i}_{km} - \overline{F}^{i}_{m\kappa\ell} + \overline{F}^{is}_{s\ell} [F^{s}_{km}]^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} - \overline{F}^{is}_{sm} [K^{s}_{\kappa\ell}]^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} + \overline{D}_{mj} [K^{i}_{\kappa\ell}]^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} = \overline{\lambda}_{m}(\kappa,\ell)\, \overline{F}^{i}_{\kappa\ell}$. Hierin kann Faktorisierung von ~~Gl 143~~ und (Gl. ~~144a~~ 144a) der quadratische Korrelationsoperator auf den Kompositionsgrad Fundamentalkoeffizient $[\,]$ reduziert werden. Es folgt $\overline{D}_{mj} [K^{i}_{\kappa\ell}]^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} = \overline{F}^{is}_{sm} [F^{s}_{km}] - \overline{F}^{is}_{sm} [K^{s}_{\kappa\ell}] - \overline{F}^{is}_{s\ell} [K^{s}_{km}]^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} + \overline{F}^{is}_{sm} [K^{s}_{\kappa\ell}]^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)+}$ was eingesetzt $\overline{F}^{i}_{km} - \overline{F}^{i}_{m\kappa\ell} + \overline{F}^{is}_{s\ell} [F^{s}_{km}] - \overline{F}^{is}_{sm} [K^{s}_{\kappa\ell}] = \overline{\lambda}_{m}(\kappa,\ell)\, \overline{F}^{i}_{\kappa\ell}$ als reduzierte Form liefert. Aus dieser Darstellung wird ersichtlich $\overline{\lambda}_{m}(\kappa,\ell) = \overline{\lambda}_{m}(\kappa,\tilde{\ell}) = \overline{\lambda}_{m}(\tilde{\kappa},\tilde{\ell}) = 0$ für alle m und $\overline{\lambda}_{\tilde{m}}(\kappa,\ell) = 0$ für alle κ und ℓ, sowie

$\underline{\lambda}_m(m,m) = 0$ als im Kompositionen Fall existiert. Auch die symmetrischen eigentensperren Räumen kommen als metrische Kondensationsstufen Reine Komponente in der antikommutativen Algebra vor. Auch zwischen bildet $\underline{\lambda}_m(\ell,m) = 0$ ein Analogon zum Kompositionsfeld. Eine weitere Analogie zu Kompositionen Tensoren ergibt sich, wenn die reziproken Form für $\underline{\lambda}_m(m,\ell)$ und $\underline{\lambda}_\ell(m\,m)$ angesetzt, und beide Tensorgleichungen addiert werden. Diese Addition ergibt dann $\underline{\lambda}_m(m\ell)\cdot \underline{F}^{i}_{m\ell} + \underline{\lambda}_\ell(m,m)\,\underline{F}^{i}_{m,m} = 0$ also $\underline{F}^{i}_{m\ell} \sim \underline{F}^{i}_{m\,m}$ und $\underline{F}^{i}_{kq} \sim \underline{F}^{i}_{kl}$ als Folge der Tensorgleichungen. Mit dem Produktsatz Komponenten eine abelsche

$\underline{F}^{i}_{km} = \underline{a}_m(k,\ell)\cdot \underline{F}^{i}_{k\ell}$ sowie $\underline{F}^{i}_{s\ell} = a_{(1)}\,\underline{F}^{i}_{k\ell}$ und $\underline{F}^{i}_{sm} = a_{(2)}\,\underline{F}^{i}_{k\ell}$ erreicht werden. Damit wird aber $(\underline{a}_m(k,\ell)\cdot \underline{\delta}_\ell - \underline{\delta}_m)\,\underline{F}^{i}_{k\ell} + (a_{(1)}[k^s m] - a_{(2)}[k^s\ell])\,\underline{F}^{i}_{k\ell} = \underline{\lambda}^{\#}_m(k,\ell)\,\underline{F}^{i}_{k\ell}$. Für die Kompositionen von Π gelten aber ganz analoge Produktbeziehungen, sodass $a_{(1)}[k^s m] - a_{(2)}[k^s\ell] = \underline{b}_{m\,s}(k,\ell)\,[k^s\ell]$ erreichbar ist, was nach Summation über den metrischen Index $1 \leq m \leq q$ mit den Einheiten $\sum_{m=1}^{q} \underline{a}_m(k,\ell) = \underline{a}(k,\ell)$, sowie $\sum_{m=1}^{q} \underline{b}_{m\,s}(k,\ell) = \underline{b}_s(k,\ell)$ und $\sum_{m=1}^{q} \underline{\lambda}_m(k\ell) = \underline{\lambda}(k,\ell)$ zur inhaltlichen Fassung $((\underline{a}(k,\ell) - \lambda)\,\underline{\delta}_\ell - \sum_{m\neq\ell} \underline{\delta}_m)\,\underline{F}^{i}_{k\ell} + \underline{b}_s(k,\ell)\,[k^s\ell]$; $()\,\underline{F}^{i}_{k,\ell} = \underline{\lambda}(k,\ell)\cdot \underline{F}^{i}_{k\ell}$ führt. Mit $\underline{a} = \frac{x_i\cdot \underline{e}}{\underline{a}(k\ell) - \lambda} - \sum_{m\neq\ell} a_m\,\underline{e}_m$ und dem metrischen Orthogonal-

System $(\underline{\bar{e}}_i, \underline{\bar{e}}_k)_q = \hat{E}$ und
ähnlich $((\underline{a}(ke) - \lambda)\underline{\mathfrak{F}}_e - \sum_{m \neq e} \underline{\mathfrak{F}}_m); F^{ik}_{ke}$
$= \underline{\bar{a}}^{-1} \cdot \mathrm{GRAD}_q F^{ik}_{ke}$, also $\mathrm{GRAD}_q F^{ik}_{ke} =$
$= \underline{\bar{a}}(\underline{\lambda}(ke) - \underline{b}_s(ke)[k^s e]) F^{ik}_{ke}$,
mit $\overline{\overline{Z}} = \sum_{k=1}^{q} \underline{\bar{e}}_k ()_k$ vereinbart,
dann folgt $\mathrm{GRAD}_q F^{ik}_{ke} \cdot \mathfrak{F}\overline{\overline{Z}} =$
$= \mathfrak{F} F^{ik}_{ke}$, also $\mathfrak{F} \ln F^{ik}_{ke} =$
$= (\underline{\lambda}(k,e) - \underline{b}_s(k,e)[k^s e])\underline{\bar{a}}\mathfrak{F}\overline{\overline{Z}}$.
Hier das lineare Aggregat von
Differentialformen Rang, also
bei der Integration von $\mathfrak{F}\overline{\overline{Z}}$ 118
wieder $\mu = \sum_{k=1}^{q} a_k ()_k$ vereinbart
werden, was $\underline{\bar{a}}\mathfrak{F}\overline{\overline{Z}} = \underline{a}_{ke}\mathfrak{F}\mu$
mit $\underline{a}_{ke} = (\underline{a}(ke) - 1)^{-1} + 1 - q$
liefert. Setzt man weiter $\underline{a}_{ke}\underline{\lambda}(ke) =$
$= \underline{\Lambda}_{ke}$ und $\underline{a}_{ke}\underline{b}_s(ke) = \underline{c}_s$, dann
gilt $\mathfrak{F} \ln F^{ik}_{ke} = (\underline{\Lambda}_{ke} - \underline{c}_s[k^s e])\mathfrak{F}\mu$
oder nach metrischer Faktorisierung mit anschließender Potenzierung $F^{ik}_{ke} = \underline{A}^{ik}_{ke} \exp(\underline{\Lambda}_{ke}\mu - \underline{c}_s S[k^s e]; ()\mathfrak{F}\mu)$,

wobei $\underline{A}^{ik}_{ke}$ = const die Faktorisierungs-
konstante ausdrückt, werden
für F^{ik}_{ke} wieder die Feldgrößen gesetzt, dann gilt für die Lösung
des symmetrischen Fundamental-
problems

$$\underline{\bar{e}}^{ik}_{ke}[(xx)]^{(kx)}_{(ux)+} + \underline{R}^{(xx)ik}_{(ux)m}[k^m e]^{(kx)}_{(ux)+} =$$
$$= \underline{A}^{(xx)ik}_{(ux)ke} \exp(\underline{\Lambda}_{ke}\mu - \underline{c}_s S[k^s e]; ()\mathfrak{F}\mu)$$

$\overline{\overline{Z}}$.

Geschätzt 149 ~~116~~,

d. h. dieses Fundamentalproblem würde auf $S[k^s e]; ()\mathfrak{F}\mu$
der Kompositionsfeldes reduziert.
die Lösung 149 Rang ~~eingeführt~~
dann angegeben werden, wenn
die Metrocasesifferenzbeziehung
~~und die gleichen Normalverhältnisse wie [ ] hat~~
bilden, also bei zweite Approxi-
mationsbereich in Anwendung
gebracht werden kann.
In diesem Approximationsfall

berech. sich nämlich für das Kon-
positionsfeld das lineare Kombi-
nationsprodukt $b_s(k\ell)\,[k^s\ell] = (E - e^{-\lambda_{k\ell}\mu})^{-1}\cdot\lambda(k\ell)$.
Mit diesen das monodrome Verhalten
mäßiger geschieht sind
$\bar{b} = \sum_{s=1}^{q} \bar{c}_s\, b_s(k\ell)$ [illegible], sowie
$\bar{c} = \sum_{s=1}^{q} \bar{c}_s\, c_s$ gesetzt, dann
folgt
$\bar{c}_s\,[k^s\ell] = \frac{\bar{c}}{\bar{b}}\,\lambda(k\ell)\,(E - e^{-\lambda_{k\ell}\mu})^{-1}$,
da $\frac{\bar{c}}{\bar{b}} = $ [illegible] const eine der Kon-
positionen Komplexheits Konstante
ist, und $\lambda(k\ell) = \frac{\lambda_{k\ell}}{a_{k\ell}}$ mit $a_{k\ell} =$
$= (a(k\ell) - 1)^{-1} + 1 = q$ ist, kann
als die Kontinuitätskonstante $\frac{\alpha_{k,\ell}}{\bar{b}\,a_{k\ell}}$
[illegible] integriert werden.
Dann die Fakultäten
äquivalent werden. Mit dem Le-
bektor $x = \lambda_{k\ell}\cdot\mu$ wird
$\sum_s [k^s\ell]\cdot() \int\mu = \frac{x}{\lambda_{k\ell}}$ [illegible]
$(E - e^{-\lambda_{k\ell}\mu})^{-1} \int\mu \pm \int \frac{-\alpha_{k\ell}+x}{E - e^{-x}}$ =

$= \alpha \int \frac{e^{-x}\,dx}{e^{-x} - E} = \alpha \ln (e^{\lambda_{k\ell}\mu} - E) + \text{const}$
$= \ln B_{k\ell} (e^{\lambda_{k\ell}\mu} - E)^{\alpha}$, wobei
dieses Faktorial in Gl. 149
einzusetzt und berechnet
man als neue Faktorialkonstante
$\bar{C}^{i}_{k\ell} = \frac{A^{i}_{k\ell}}{B_{k\ell}}$, dann ähnlich
die Kombination zweier Approxima-
tionsberechnungen die verschiedene
Fassungen
$[k^i\ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} + \alpha^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)m}\,[k^m\ell]^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)+} =$
$= C^{(\varkappa\lambda)\,i}_{(\mu\nu)k\ell}\; e^{\lambda_{k\ell}\mu}\,(e^{\lambda_{k\ell}\mu} - E)^{-\alpha_{k\ell}}$,
$\alpha_{k\ell} = $ const, $T^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)} = T$.
Gleichung 149a
an, in welcher mit α die
Faktorialkonstante α be-
stimmen ist. Für die Bestimmung
4.3.63 folgt die Bedingung
$\int F^{i}_{k\ell} = 0$, wenn wieder $F^{i}_{k,\ell}$
Kürzung $F^{i}_{k,\ell}$ berechnet [illegible].

nach Gl 149 ~~116~~ ist aber $\mathfrak{F}\underline{F}^{i}_{k\ell} = (\underline{\lambda}_{k\ell} - \underline{c}_s [k^s \ell]) \underline{F}^{i}_{k\ell}$

sodaß $\mathfrak{F}\underline{F}^{i}_{k\ell} = 0$ wegen $\mathfrak{F}\mu \neq 0$ mit

$\underline{F}^{i}_{k\ell} = 0$ oder $\underline{c}_s [k^s \ell] = \underline{\lambda}_{k\ell}$

erfüllt werden kann. $\underline{F}^{i}_{k\ell} = 0$

sagt zwei Wedrhan die einem

eigenwertspektrum, dem imaginären Anteile in μ entsprechen

sind, und dieses Spektrum ist

formal identisch mit dem

singulären des Kompositionsfeldes.

Die andere Forderung $\underline{c}_s [k^s \ell] = \underline{\lambda}_{k\ell}$

bedeutet, wegen $\underline{\lambda}_{k\ell} = \text{const}$ und

$\underline{c}_s = \text{const} \neq 0$, daß die Aussage

$\mathfrak{F}[k^s \ell] = 0$ also $\underline{\lambda}_{k\ell} = \underline{c}_s [k^s \ell]_{\text{eig}}$

und zwar für jeden Faktor $\lambda(k\ell)$ ~~=~~

$= p_i(k,\ell) [k^i \ell]_{\text{eig}} = \frac{\underline{\lambda}_{k\ell}}{\underline{c}} = \frac{\underline{\lambda}_{k\ell}}{\underline{\alpha}\, \underline{a}_{k\ell}}$ oder $\underline{\lambda}_{k\ell} - \underline{\alpha}\lambda_{k\ell} = 0$, d.h.

das Eigenwertspektrum des singulären

metrischen Kontinuum unterscheidet sich nur durch den

$$\boxed{\mathfrak{F}\underline{F}^{i}_{k\ell} = (\underline{\lambda}_{k\ell} - \underline{c}_s [k^s \ell]) \underline{F}^{i}_{k\ell} \mathfrak{F}\mu,}$$

Faktor $\underline{\alpha}_{k\ell}$ vom Spektrum der Kondensatio

singulären des Kompositionsfeld

sind also mit diesem für $\underline{\alpha}_{k\ell} =$

identisch. Mit $\underline{c}_s \cdot \underline{\mathfrak{b}}^{s}_{-k\ell} =$

$= \underline{\mathfrak{b}}_{k,\ell}$ sind dem zugehörigen

Zustandsvektor $\underline{\psi}_{k\ell} = \underline{\mathfrak{b}}_{k,\ell} \underline{F}^{s}_{k,\ell}$

auch dem $\underline{\psi}_{k,\ell} = e^{\underline{\lambda}_{k\ell}\mu} (e^{\underline{\lambda}_{k\ell}\mu} - E)$

$= \exp(\underline{\lambda}_{k\ell} - \underline{\alpha}\lambda_{k\ell})\mu (E - e^{-\lambda_{k\ell}\mu})$

im zweiten asymptotischen Bereich

nach Gl. 149a ~~116a~~. da aber

$\underline{\lambda}_{k\ell} - \underline{\alpha}\lambda_{k\ell} = 0$ ist somit

$\underline{\psi}_{k\ell} = (E - e^{-\lambda_{k\ell}\mu}) - \underline{\alpha}$ worin

aber $(E - e^{-\lambda_{k\ell}\mu})^{-1} = \underline{\psi}^{k\ell}$ der ent-

sprechende Zustandsselektor des

Kompositionsfeldes ist, dieses

bedeutet aber $\underline{\psi}_{k\ell} = \underline{\psi}^{\underline{\alpha}_{k\ell}}_{k\ell}$ im

zweiten metrischen asymptotischen Bereich. Dieses

bedeutet Identität der Eigen

sowie über der Korrelation ist also zerlegbar in

$\underline{\psi}_{\kappa,\varepsilon} = \underline{\psi}^{\underline{\alpha}_{\kappa\varepsilon}}_{\kappa,\varepsilon}$, $\underline{\lambda}_{\kappa,\varepsilon} = \underline{\alpha}_{\kappa\varepsilon}\lambda_{\kappa,\varepsilon}$

Gleichung 150

sowohl unmittelbar hervorgeht, daß das symmetronische Fundamentalproblem für $\underline{\alpha} = 1$ mit dem Kompositiven identisch wird, während alle $\underline{\alpha} \neq 1$ irgendein Korrelationssystem beschreiben. Die Größe $\underline{\alpha}$ übernimmt also als Korrelationsexponent die gesamte symmetronische Feldkorrelation, sodaß jedes quantitative symmetronische Problem im starken Approximationsbereich auf eine Bestimmung dieses Korrelationsexponenten $\underline{\alpha}$

hinausläuft. (~~Der Band XII S. 143–155 ist einfach, jedoch Wiederholungen und Textänderungen vermeidend.~~)

11.4.63 Der Zusammenhang $\underline{\lambda}_{\kappa\varepsilon} = \underline{\alpha}_{\kappa\varepsilon} \cdot \lambda_{\kappa\varepsilon}$ ergab sich aus $\underline{\lambda}_{\kappa\varepsilon} - \underline{\varepsilon}_s [\kappa^s \varepsilon] = 0$ von $\oint F^{\underline{i}}_{\kappa\varepsilon} = 0$, doch kann diese Eichinvariante auch durch $F^{\underline{i}}_{\kappa,\varepsilon} = 0$ erfüllt werden, wenn im $\exp(\underline{\lambda}_{\kappa\varepsilon}\mu) = 0$ der Exponent $\underline{\lambda}_{\kappa\varepsilon}\mu = \underline{\alpha} + i\underline{\beta}$ kommt. Dies ist sodann $e^{\underline{\lambda}_{\kappa\varepsilon}\mu} = e^{\underline{\alpha}}(\cos\underline{\beta} + i\sin\underline{\beta}) = 0$ durch $\cos\underline{\beta} = 0$ und $\sin\underline{\beta} = 0$ für den Real- und Imaginärteil zu erfüllen ist. Dies führt aber zu der gleichen Eigenwertspektren, wie im Fall der Partialbrüche des Kompositionsfeldes 118a nämlich

$\underline{\beta}^{(\pm)}_{+} = \pm\frac{\pi}{2}(2\underline{\ell}_{+} + \underline{\ell})$, $\underline{\beta}^{(\pm)}_{-} = \pm\pi\underline{(\ell)}_{-}$

Gleichung 151

kommt besteht die Möglichkeit mit $\tau \to 0$ ~~weit~~ [illegible] also mit kleinem Bereich zu approximieren. Es gilt, wie beim Kompositionsfeld, $\lim_{\tau \to 0} \mu ; n = \pm i\gamma$ mit $\gamma^2 = \xi^2 - \rho^2$, wobei $\rho^2 = \sum_{k=1}^{3} x_k^2$ und $\xi^2 = -\sum_{k>3} x_k^2$. Dies hat aber $\lim_{\tau \to 0} \psi_{ke} ; n = \psi_{ke}(y)$ zur Folge. Ganz entsprechend ergeben sich im Raum Fall die Eigenwertspektren als Funktionen ganzzahliger Indizes (es sind die Quantenzahlen der Kondensationsstufen) und aus dem Korrelationsexponenten wird dann

$$\underline{\alpha}_{ke} = \frac{\underline{\lambda}_{ke}}{\lambda_{ke}} = \frac{(\pm i \underline{\lambda}_{ke} y)_{exakt}}{(\pm i \lambda_{ke} y)_{exakt}} =$$

$$= \frac{\beta_{\pm}^{(\pm)}}{\beta_{\pm}^{(\pm)}} \quad \text{~~was die beiden möglichen Werte~~} \left(\underline{\alpha}_{ke}\right)_{(1)} =$$

$$= \frac{2\underline{n} + 1}{2n + 1} \; ; \quad \text{~~dann im mikroskopischen~~}$$

~~Bereich muß ebenfalls die Auswahlregel~~ $\beta_{-}^{(\pm)} = \pm \pi (2\underline{n}_{-} + 1)$ ~~gilt~~ ~~demnach~~ singuläre Anschlußstellen in Anregung gebracht werden. Der Korrelationsexponent wird demnach durch die Quantenzahlen der Kondensationsstufen in der Form

$$\underline{\alpha}_{ke} = \frac{2\underline{n}_{\pm} + 1}{2n_{\pm} + 1}$$

~~Gleichung 118a~~

~~beschrieben~~.

25.5.63 Das die beiden Möglichkeiten $(\underline{\alpha}_{ke})_{(1)} = \underline{n}_{ke} \cdot (2n_{ke} + 1)^{-1}$ und $(\underline{\alpha}_{ke})_{(2)} = (2\underline{n}_{ke} + 1) \cdot (2n_{ke} + 1)^{-1}$ liefert. Da (1) die Möglichkeit (2) impliziert, kann allgemein $(\underline{\alpha}_{ke})_{(1)} = \underline{\alpha}_{ke}$ gesetzt werden, sodaß sich für den Korrelationsexponenten

$$\underline{\alpha}_{ke} = \underline{n}_{ke} \cdot (2n_{ke} + 1)^{-1} \qquad 151a$$

~~Gleichung 118a~~

ergibt

die Größe Ψ_{ke} =
$= (\Psi_{ke})^{+\alpha_{ke}}$ heißt als reelles
Multiplikator für den Charak-
ter einer Parkallösung. Zu-
ständig des zweiten Mo-
ments ist man
geschrieben von der Faktor-
$\bar{C}^{i}_{ke}\,[k^{i}e]^{(\chi\lambda)} + \bar{Q}^{i}_{m}\,[ke]^{(\chi\lambda)} =$
$= \bar{C}^{i}_{ke}\,(E^{(\mu\nu)+} - e^{\lambda_{ke}\rho})^{-\alpha_{ke}}$ Faser
Parkallösung aus. Hierbei
ist $\bar{C}^{i}_{ke}\,(E - e^{\lambda_{ke}\rho})^{-\alpha_{ke}} =$
$= \bar{C}^{i}_{ke}\,(\Psi_{ke})^{\alpha_{ke}} = \bar{f}^{i}_{ke}$ ein
bekannter Faktor. Weiter
kann $\rho^{i\,s} = \gamma^{i\,s}_{(\chi\lambda)} + \bar{Q}^{i}_{m}\,\gamma^{m\,s}_{(\chi\lambda)}$
für Kürzung eingeführt werden
dann $[k^{i}\ell]^{(\chi\lambda)}_{(\mu\nu)+} + \bar{Q}^{i}_{m}\,[k^{m}\ell]^{(\chi\lambda)}_{(\mu\nu)+} =$
$= (\gamma^{i\,s}_{(\chi\lambda)} + \bar{Q}^{i}_{m}\,\gamma^{m\,s}_{(\chi\lambda)})\,[s\,k\ell]^{(\mu\nu)+} =$
$= |\,\rho^{i\,s}\,[s\,k\ell]^{(\mu\nu)+} = \bar{f}^{i}_{k\ell}$

ergibt. Mit $\sum_{i} \rho^{i\,s} = \rho^{s}$ und
$\sum_{i} \gamma^{i}_{k\ell} = (\Psi_{k\ell})^{-\alpha_{k\ell}} \sum_{i} \bar{C}^{i}_{k\ell} =$
$= \gamma_{k\ell}$ heißt der komplexe
Impedanzfaktor, $\rho^{s}\,[s\,k\ell] =$
$= \rho_{ki}$ mit mit dem mo-
mentanen Orthogonalsystem
$\bar{e}_{k} \cdot \bar{e}_{k} = \delta_{ik}$ sowie $\rho^{-1} =$
$= \sum_{s} \rho^{s}$ dabei $\rho^{s}\,[s\,k\ell] =$
$= \rho^{s}\,\varepsilon^{s}\,[s\,k\ell]^{(\mu\nu)+}$ oder
$\varepsilon^{s}\,[s\,k\ell]^{(\mu\nu)+} = \rho \cdot \gamma_{k\ell}$
Multiplikation mit einem
anderen Einheitsvektor $\bar{e}_{i}$
ergibt $\rho_{mi}\,\gamma_{k\ell} = \delta_{mi}\,[s\,k\ell] =$
$= [m\,k\ell]^{(\mu\nu)+} = \tfrac{1}{2}\,(\delta_{k}\,\gamma^{(\mu\nu)+}_{m\ell} +$
$+ \delta_{\ell k}\,\gamma^{(\mu\nu)+}_{mk} - \delta_{m}\,\gamma^{(\mu\nu)+}_{k\ell})$.

Die Impedanzfaktoren des elek-
trischen Fahrzeugmotors
m, k und ℓ ergeben dann
für Kürzung $\sum_{m} \rho_{m} = \rho$, sodass

$\sum_{ke} \gamma_{ke} = \gamma$ und $\sum_{ke} \gamma_{ke}^{(\mu\nu)} =$
$= \gamma_{(\mu\nu)}$ abgekürzt, also
$2p\gamma + \gamma_{(\mu\nu)}$. Nach den
Regeln der Matrizenrechnung
ist aber $\gamma = \sum_s \frac{1}{\alpha_s} \gamma_s =$
$= \bar{\alpha}^{-1}$ GRAD, also GRAD $\gamma_{(\mu\nu)} =$
$= 2p\gamma\bar{\alpha}$. Mit dem absoluten
Koordinatenvektor $\bar{\Sigma} = \sum_s \bar{e}_s ()_s$
wird aber GRAD() $\gamma \bar{\Sigma} = \gamma()$, wobei
$\bar{\alpha}\gamma\bar{\Sigma} = \gamma\mu$ das Matrizendif-
ferential der Linearform =
$\mathrm{Lakes}\ \mu = \sum_s \alpha_s ()_s$ heißt =
Ritzsches Differentialsymbol mit.
Multiplikation mit $\gamma\bar{\Sigma}$ liefert
dasjenige für metrische Inva-
riante Form $\gamma\gamma_{(\mu\nu)} = 2p\gamma_{(\mu\nu)}$
also $\gamma_{(\mu\nu)} = 2\sum p\gamma\gamma\mu =$
$= 2\sum p \sum_{ke} \gamma_{ke}\gamma\mu = \sum_{ke} 2\sum p\gamma_{ke}\gamma\mu$
da nach μ $= \sum_{ke} \gamma_{ke}$ gilt
(mit der kontravarianten Komponenten

den der Basisvektoren des
Koordinatensystems), folgt
$0 = \sum_{ke} \gamma_{ke}^{(\mu\nu)} - 2\sum_{ke} \sum p\gamma_{ke}\gamma\mu$
$= \sum_{ke} (\gamma_{ke}^{(\mu\nu)} - 2\sum p\gamma_{ke}\gamma\mu)$
was, wegen der Linearunabhängig-
keit jedes der Differentiale $\gamma\mu$
verschwinden, also $\gamma_{ke}^{(\mu\nu)} =$
$= 2\sum p\gamma_{ke}\gamma\mu$ gültig ist.
Da dieser implizierte Lösungs-
ist $\gamma_{ke} = \sum_i b_{ke}^i (\gamma_{ke})^{\alpha_{ke}} =$
$= \gamma_{ke} \sum_i b_{ke}^i$, sodass $p\sum_i b_{ke}^i =$
$= q_{ke}$ als ein reelles Skalar-
produkt der Fraenkel-Kotte-
Matrizen, die aber nicht Kam-
mer-Fraenkel-Kotte-
Matrizen sind, sondern Kosinus
Typ sind, wie Fraenkel-Kotte

der Kontrastierende das betrachteten Koordinaten und dem gewählten variablen Kontrastfaktor R^2 das betrachteten Koordinatenpaar abhängig wählen die Beziehung Fourierkoeffizienten gerechtfertigt sind. In diesem Falle Gleichung von f liefert auf irgendeinen Fundamentalbereich Koordinaten exakt liefert eine Klassifikation Fehlerrate die Extrema und Wendebereiche von f da die Extrema bei $f'(x) = 0$ liegen und $f \sum g_{ke} \cdot \gamma_{ke} f_\mu =$ $= / g_{ke} \gamma_{ke} f_\mu = 0$ setzt durch $\gamma_{ke} = 0$ erreichbar ist, folgt unmittelbar daß die Extrema von f mit den

Nullstellen der linearen Koordinatenfunktionen $\gamma_{ke} = 0$ zusammenfallen. $f g''(x) =$ $= f \frac{g_{ke}}{\gamma_{ke}}$ wird gleichzeitig mit Extrema γ_{ke} erreicht und Partialkorrelationen oder Korrelationen zu Räumen Komponentenfunktionen von Räumen das die Dimensionalität sodaß $g_{ke} \neq 0$ bleibt und die Kinematik der Differentialgleichungen $f_\mu = const \neq 0$ ist für die Wendebereiche der Ellipse von f gilt folgende $0 \quad f^2 g''(x) = 0$ oder 0 $= f^2 \sum g_{ke} \gamma_{ke} f_\mu = f(g_{ke} \gamma_{ke} f$ $= f_\mu (g_{ke} f \gamma_{ke} + \gamma_{ke} f g_{ke} - f g_{ke} f$ wobei $f_\mu = const \neq 0$ weil $f g_{ke} = 0$ und $f \gamma_{ke} = 0$ erfüllt werden Ketten.

Die Randbedingung von $\bar{\varphi}$ liegen also genau wie bei der Bestimmung des Feldfaktors χ und daher ein Bestimmungsstück des Linearen Randwertproblems.
(Fortsetzung, siehe Seite 375)

V Zu Bd VIII Seite 153

4.6.63 Diese Forderung resultiert geschwindigkeitsverlust, denn $\bar{p} = \frac{\dot{M}}{F}(1-b\rho)$ bedeutet, daß der Gleichdruck überpassen ist, in welchem $(\rho - b\rho)$ der Korrektionsfaktor des Verlustes $\frac{\dot{M}}{S}$ wegen $\frac{\dot{M}}{S} = \dot{M}\,b$ resultiert, so daß schon deutlich eine weitere Minderung gegen $\bar{p} = \frac{\dot{M}}{S}(1-b\rho)$, wobei sich für die gesamte

Impulsdifferenz $\Phi = \bar{p} - p = \frac{\dot{M}}{S}(1-b\rho) - \left(\frac{\dot{M}}{S} - \frac{\dot{M}}{F}\right)(1-b\rho) = \frac{\dot{M}}{F}(1-b\rho)^2$ wobei $b\rho = 1$ ist, die Impulsdifferenz von $\bar{p}$ gegen p bei der Annahme $\bar{p}$ konstant über F gegen $M(\rho)$ in p' gestattet.

Anmerkung zu Band VII Seite 52

Das bei der Beschreibung stoßfreier Verdichtungsstöße angewendete Energieintegral $mc^2 + \frac{\varkappa}{2}\int F^2 dV = \text{const.}$ kann ~~somit~~ mit der aus 92 ~~$\frac{\varkappa}{2}\int \bar{q}^2 dV = \lambda \times \frac{\varkappa}{2}$ des mittleren~~ ~~Verlustes~~ ~~Berechnung~~ ~~R~~ gebildeten Beziehung $\frac{\varkappa}{2}\int \bar{q}^2 dV$ erweitert werden, doch ist bei dieser Er-

Variation zu berücksichtigen
resp. im Fall freier Gravitations-
wellen $\frac{\alpha}{2}(\alpha F^2 - \beta \bar{\mu}^2) =$
$= -2\alpha\beta F^{\mu\nu} \times \bar{\mu}$ resp. wenn
es mir zu Radien Gravitations-
wellenemission kommt, wenn
ist die $F \times \bar{\mu} = 0$, also
$\frac{\alpha}{2} \int F^2 dV - \frac{\beta}{2} \int \bar{\mu}^2 dV = \text{const}$
was man das Korrektur hinter
Gl. 99 auch $\frac{\alpha}{2} \int \bar{q}^2 dV - \frac{\beta}{2} \int \bar{\mu}^2 dV =$
$= \text{const}$, und dies bedeutet
resp. im Fall des statischen
Gleichgewichts zwischen Ruheenergie $E = Mc^2$
und der gravitativen Feldenergie
$E_g = \frac{\alpha}{2} \int \bar{q}^2 dV$ wenn nun Term
von Mesofeldenergie $E_m = -\frac{\beta}{2} \int \bar{\mu}^2 dV$
existieren resp. V resp in starker
Form für das Energiepotential
eines Materiefeldquants $E_0 + E_m + E_g$

V Anmerkung Band VIII
Seite 137

= const geschrieben werden kann
wobei für den Feldtypen entsprechend
die speziellen Korrelationen zu
setzen stehen. Wenn es gelingt
E_m überzuführen in E_0 oder E_g
entweder kann man die
Energiepotentiale eine Differenzbeziehung
gleichung entwickeln werden,
welche den Verlauf $\Phi(r)$ und
somit von $M(r)$ und $m(r)$
im Fall der zeitlichen Stabilität
wiedergibt. Mit dieser Ergebnis
$S = \frac{\lambda'}{2}$ ist Lagrangefunktion aus Gl. 55 $\lambda \times \xi$
folgt aber, daß es eine Fläche
$F = 4\pi \cdot \xi^2$ des absoluten
Kugelfläche, des Verlaufes $\Phi(r)$
geben muß, da wobei die Radialfläche der Mesofeldenergie
$\eta_m = -\frac{\beta}{2} \bar{\mu}^2 < 0$ ist und

$\operatorname{div} \mu_0 = w(a - a_0)$ also

$w \int (a - a_0)\, dV = \int \operatorname{div} \mu\, dV =$

$= \oint \mu\, d\bar{F}$ gibt, wenn η_m in

$\sim -\frac{dM}{dr}$ sind. Nach dem

allgemeinen Äquivalent $E = mc^2$

Raum über der Proportionalitäts-

faktor mit c^2 sein sodaß

$\eta_m = -\frac{c^2}{F_0}, \frac{dM}{dr}$ also

$E_m = -\frac{c^2}{F_0} \int \frac{dM}{dr}\, dV$ integriert

folgt. Wird diesen Ausdruck

zusammen mit $E_g = \frac{\alpha}{2} \int q^2 dV$

und $E_0 = Mc^2$ in $E + E_m + E_g =$

$= \text{const}$ eingesetzt, worin

wieder dieses Energieprinzip

die Form $Mc^2 + \frac{\alpha}{2} \int q^2 dV -$

$- \varkappa \frac{c^2}{F_0} \int \frac{dM}{dr} dV = \text{const}$.

für die statische Gleichheit und

die Bewegungsfreiheit voraus-

gesetzt wird, daß M und Φ,

also auch q nur von r abhän-

gig, sowie in Polarkoordi-

naten, wobei transparent wer-

den kann. Wegen der

sphärischen Symmetrie ist

dann $dV = 4\pi r^2 dr$ und

$q = \operatorname{grad} \Phi = \frac{r}{r} \frac{d\Phi}{dr}$. Nach

dieser Transformation kann

das Energieprinzip nun r

differenziert werden was nach

einer Division durch c^2 mit

$F = 4\pi \varkappa^2$ die Differen-

zialgleichung $\frac{2\pi\alpha}{c^2} r^2 \left(\frac{d\Phi}{dr}\right)^2 +$

$+ \frac{dM}{dr}\left(1 - \beta^2 r^2\right) = 0$ liefert, mit

der Abkürzung $\beta r = x$

und $\beta^2 = (1 - x)^{-2}$ somit

$M = \frac{1}{\gamma} \int \rho\, \Phi$ nach r 99

also $\gamma \frac{dm}{dr} = \rho \frac{ds}{dr} + \left(\rho + r \frac{d\rho}{dr}\right) \Phi$.

In die Differenzial $2\pi\alpha \frac{\gamma}{c^2} =$

$= \frac{3}{32 c^2}$ folgt $r^2 \left(\frac{d\Phi}{dr}\right)^2 + \frac{32}{3} c^2 (1 - x^2)$,

$\cdot \rho \left(r \frac{d\Phi}{dr} + \left(1 + \frac{r}{\rho} \frac{d\rho}{dr}\right) \Phi\right) =$

$= 0$. Es ist $\frac{dp}{dx} = 2b(1-x)^{-3}$ also $1 + \frac{x}{p}\frac{dp}{dx} = 1 + 2x(1-x)^{-1} = \frac{1+x}{1-x}$, was rasch eine Integration gibt, denn Faktor $(1-x^2)p = \frac{1+x}{1-x}$, sodass es zweckmässig erscheint $F = \frac{1+x}{1-x}$ als Integrationsfaktor zu verwenden. Damit wird aus der nichtlinearen Differentialgleichung $p^2\left(\frac{d\varphi}{dx}\right)^2 + \frac{32}{3}c^2 F\left(p\frac{d^2\varphi}{dx^2} + F'p\frac{d\varphi}{dx}\right) = 0$, und in dieser Fassung das volle Argument $\lambda = p$ annehmen, wenn zweckmässig $\frac{\Sigma}{\Sigma} = \frac{3p}{8c^2}$ und $\Sigma' = \frac{d\Sigma}{d\ln p}$ eine homogen-quadratische $\Sigma^2 + 4F(\Sigma' + F\Sigma) = 0$ in Form einer quadratischen Gleichung für Σ. Deren Lösungen $\frac{\Sigma}{\Sigma'} = -2F(1 \pm \sqrt{1-\Sigma})$ folgt. Diese Gestalt

kann auch die Transformation $q = 1 \pm \sqrt{1-\Sigma}$ in eine Integration überführen, wenn Zähler oder Nenner weglassen, denn es ist $\Sigma = 1-(q-1)^2$, und daher $-2F\,d\ln p = (1 \pm \sqrt{1-\Sigma})^{-1} d\Sigma = -2(q-1)\frac{dq}{q} = -2(d\ln q - q) = 2\,d\ln q\, e^{\mp q}$. Auf der anderen Seite kann auch p gewählt werden, sodass $d\ln p = \frac{dx}{p} = \frac{dx}{x}$ und $d\ln q\, e^{-q} = -\int F\frac{dx}{x} = -\frac{1+x}{1-x}\frac{dx}{x} = \frac{dx}{x} + \frac{dx}{x-1} = d\ln(x-1) + \frac{dx}{x^2-x} = d\ln(x-1) - 2\,d\,\mathrm{ARTG}(2x-1) = d(\ln(x-1) + \ln(1-x) - \ln x) = d\ln -\frac{1}{x}(1-x)^2$. Diese Bedeutung ist ohne weiteres festzuhalten. Für B eine Integrationskonstante kann sogar auch $q e^{\mp q} = -\frac{B}{x}(1-x)^2$ oder auch $x = b \cdot p$ und der ganzen Konstanten

$A = -\frac{B}{6}$ Die zweideutige Lösung
$\rho q \cdot e^{-q} = A(1-b\rho)^2$, womit
die Zweideutigkeit in $q = 1 \pm \sqrt{1-\xi}$
mit $\xi = \frac{3\pi}{8c^2}$ ihren Ursprung
findet. Für den Abstand $\rho = s = \frac{1}{k}$
wird $\xi = \frac{\lambda'}{2} \neq 0$. Wenn
$q e^{-q} = 0$, was nur für
$q \to \infty$ bzw. $q = 0$ erreichbar
ist, $q \to \infty$ bedingt aber
$\rho(s) \to -\infty$ für jede
sonst mögliche $\rho \geq 0$ für alle
$s > 0$ des physikalischen
Kosmos, also sodann mit auch
$q = 0$ stets bleibt. Für
beide Zweige ergibt sich
aber $\rho(s) = 0$ wenn $q = 0$
ist, was bekanntlich den
beiden verschiedenen Zweig $q = q_{1,2} =$
$= 1 \mp \sqrt{1-\xi}$ wegen der
Eindeutigkeit entsteht ist.

Als einheitliche Lösung kann
demnach

$\rho_q e^{-q} = A\left(1 - \frac{s}{s_0}\right)^2$, $A = \text{const} > 0$,
$q = 1 - \sqrt{1 - \frac{3\pi}{8c^2}}$

Gleichung ~~+6100~~
ausgehen werden, welche den
Verlauf der Felder ρ des Gl ~~99~~
im R_3 angibt, wenn eine
gewisse spezifische Anfangs-
ohne Feldstörungen vorliegt.
5.6.63 Man setzt vorausgesetzt
kann ~~Gl 46~~ als eine approximative
Projektion des mesotarischen Systems
$\dot{\rho}, \dot{\xi} = \lambda \times \dot{\xi}$, also dem R_4 in
den reellen R_3 übergeführt werden.
Gleiche Approximation
von $\rho_q e^{-q} = A\left(1 - \frac{s}{s_0}\right)^2$ macht,
$\chi = \frac{s}{s_0}$ setzt, wenn $q e^{-q} =$
$= \frac{A}{s_0} \frac{1}{\chi}(1-\chi)^2$ obenzu wird
$(1-q) \cdot e^{-q} \cdot \frac{dq}{d\chi} = -\frac{A}{s_0 \chi^2}(1-\chi^2)$.

Hieraus ist $\frac{dq}{dx} = \frac{1}{2}(1-\xi)^{-1/2}\frac{d\xi}{dx}$
$= \frac{1}{2}\frac{d\xi}{dx}(1-q)^{-1}$ und $\frac{1}{2}\frac{d\xi}{dx} = \frac{3\xi}{16c^2}\frac{dq}{dx}$
Nun ist aber nach Gl. 45 immer,
wenn ξ die Koordinate von
$q = 1-\sqrt{1-\xi}$ ist, der Feldvektor
$|\mathrm{grad}\,\varphi| = g$ gesetzt wird
$g = \frac{d\varphi}{dr}$, also $g = -\frac{A}{r^2}e^{q}\left(1-\frac{r^2}{\xi^2}\right)$
Es handelt sich bei dieser Betrachtung um den Betrag des elektrischen Feldbeschleunigung, welche im Fall $r \ll \xi$ der in B beschriebenen anziehenden Kraft $g = -\frac{\gamma M_0}{r^2}$ entgegen wirkt, sodaß die Gesamtbeschleunigung abgeschätzt werden kann. Setzt man nämlich für den minimalen Radius den Bereich $\lambda = \frac{\hbar}{m_0 c} \ll r \ll \xi$ dann bleibt außer $r \ll \xi^2$, und

daher im Falle kleiner $q \approx 0$,
sowie $r^2/\xi^2 \ll 1$, während
$g \approx g_n$ gesetzt werden darf.
Man hat demnach $-\frac{A}{r^2} = \frac{3g_n}{16c^2} =$
$= -\frac{3\gamma M_0}{16c^2 r^2}$, also $A = \frac{3\gamma M_0}{16c^2}$, wenn
$M_0 = N m_0$ das $N \geq 1$, also $= \frac{16}{3}c^2$
mal soviel wie m_0 ausmacht ist, die Raumprojektion
der Kante also kleiner als ein Atom
$A \sim \frac{3\gamma N m_0}{16 c^2}$, $g = -\frac{\gamma N m_0}{r^2}\left(1-\frac{r^2}{\xi^2}\right)$

Gleichung
geeignet werden, welche die
obige Beschleunigung
beschreibt. Die Kante und
Kante einerseits, das Wesen
von $\xi = \frac{\lambda'}{2}$ abgelesen werden.
ξ = const. Konzentriert im R_3
eine Kugelfläche in deren Mittelpunkt sich die Feldquelle befindet.

da $\rho > 0$ stets positiv bleibt, ist $\varphi e^{-\varphi} > 0$ für $\rho < \infty$ und $\rho > \infty$, doch wird $\varphi e^{-\varphi} = 0$ für $\rho = \infty$. diese Kugeloberflächen bedeuten aber, weil immer $e^{-\varphi} > 0$ ist $\rho(\rho) > 0$ für $\rho \neq \infty$ aber $\rho(\infty) = 0$. die Kugelfläche $\rho = \infty$ hat demnach für ρ den Charakter eines Hilfsstelle deren Bedeutung für die Feldstärke gleich 4πσ beträgt. Auch φ hat im $\rho = \infty$ wegen $\varphi(\infty) = 0$ die Hilfsstelle doch wird hier ∞ der K. in zwei verschiedene Feldstärke geteilt. Für $\rho < \infty$ ist $\varphi < 0$ die Beschleunigung eines gravitativen Punktes, dessen Größe bei $\varphi(\infty)$

Null, von Null zu Paraboloid ist, weil für ∞ die Geschwindigkeit $\infty = \frac{\lambda'}{2}$ wird. Jenseits dieser Gravitationsgrenze $\rho < \infty$ bleibt zwar das Vorzeichen positiv $\varphi > 0$ gut Beschleunigung eines abstoßenden Punktes dieses Abstoßungsfeld, beschrieben durch $\varphi = \frac{f \cdot M_0}{\rho^2} - \frac{f M_0}{\rho^2}$ für $\rho > \infty$, wobei $\frac{f M_0}{\rho^2}$ = const. Auch $\rho \to \infty$ anziehen noch ist das Feld auf, doch ρ jenseits ∞ wird abstoßend. Dieses Anziehungsfeld aber nicht Beschleunigung weitergeben, weil in Gleichgewichtslage. Für $\frac{A}{\rho}(\rho - \frac{\rho}{\infty})^2 = 0$ und somit auch φ null bleibt, haben ∞ verschiedene also auch eine solche Ge-

Innere Grenze der Raumstruktur eines gravitierenden Feldsystems, welche noch zu analysieren ist.

2.) Die mechanischen Eigenschaften der Projektrice.

6.6.63 In $\mathfrak{H}^{(3)}$ ist $A(1-\frac{r}{a})^2$ für alle r eine positive reelle Zahl und auch r ist als Abstand im reellen R^3 selbst positiv und reell. Diese Realität bedeutet aber doch auch g_{rr}^{-1} für alle r reell bleibt solange $P(r)$ nicht auch für alle r verschwindet sein Raum dann ist $g_{rr}^{-1}=0$ oder äquivalent $g_{rr}=0$ fordert die Schranke $1-\frac{3P}{8c^2} \geq 0$ für die Existenz für P wenn dasselbe bei

$1-\frac{3P}{8c^2}=0$, sonst auch im Fall der Gleichung $\frac{99}{75}$ Rad $\frac{100}{76}$ die gleiche Extremalverhältnisse herrschen wie bei der approximativen Beschreibung gravitativer Feldstörungen. Für die Abstandsfläche geschwindigkeit Rest solcher Feldstörungen gilt dabei auch das gleiche Quantum was diese Kontraktion verschwinden zu $c'=iw$ mit $w=\frac{4}{3}c$ fordert. Andererseits kann aus jener Existenz $P_{ext}=\frac{8}{3}c^2=2w^2$ auf den Abstand R geschlossen werden, jenseits dessen weder eine gravitative Anziehung noch eine Abstoßung defiziert ist dann es gilt $P_{ext}=P(R)$. mit $g_{rr}^{-1}=0$ oder daraus

$\frac{M}{R}\left(1-\frac{R}{S}\right)^2 = 2\omega^2\frac{c}{\gamma}$, also mit $\chi = \frac{R}{S}$ auch $\frac{1}{\chi}(1-\chi)^2 = \frac{2\omega^2 S}{\gamma M} = 2\alpha$. Für die Lösungen dieser quadratischen Gleichung folgt dann $\chi = (1+\alpha)\left(1 \pm \sqrt{1-(1+\alpha)^{-2}}\right)$ mit $\alpha = \frac{\omega^2 S}{3\gamma M}$. Ersetzt man diesen Ausdruck χ erst dann interessiert werden, wenn S vorgegeben werden kann. Für Beschleunigungen ω und $S = \frac{\lambda'}{2}$ wird, wenn wie in §6 die Feldmasse des S reichenden attraktiven Gravitationsfeldes punktuell und über die Einsteinmasse äquivalent eine Kugelschale der Masse des Fallmenschen vorgegeben wird, somit es möglich sein λ' und

damit S ersetzbar zu bestimmen. Da nach §6 S bekannt ist, kann versucht werden χ zu berechnen. Für alle $\frac{\lambda'}{S} \ll \chi$ sowohl im Bereich $\rho > S$ als auch $\rho < S$ ist $\gamma \ll c^2$ erfüllt, sodass $\left(\frac{3\gamma}{8c^2}\right)^2 \approx 0$ für alle ganzen Zahlen $\nu > 2$ erfüllt ist. Hier entsteht die Rekursionsformel für q und ρ^{-q} und diese Rekursionsbeziehungen ergeben $\frac{3}{16}\frac{\lambda}{c^2}\gamma\left(1-\frac{3}{16}\frac{\gamma}{c^2}\right) = A\left(1-\frac{\lambda'}{S}\right)^2$, was für alle $\rho \geq \frac{\lambda'}{2} = \frac{h}{2m_0 c}$ gilt. Für $\rho = \frac{\lambda'}{2}$ folgt eine weitere Bedingung für A, wenn $L = 1$ ist. Es ist $A \approx \frac{3\gamma}{16c^2} m_0\left(1-\frac{3}{16}\frac{\gamma}{c^2}\frac{2m_0}{\lambda}\left(1-\frac{\lambda}{2S}\right)^2\right)$, also $3\omega^2 A \approx \gamma m_0\left(1-\frac{2\gamma m_0}{3\omega^2\lambda}\left(1-\frac{\lambda}{2S}\right)^2\right)$ mit $\omega = \frac{\pi}{3}c$. Aus der Approximation folgt dann die Näherung $f = \frac{1}{\rho}\left(1-\frac{\lambda'}{S}\right)^2$

verwendet wird $3\omega^2 \frac{A}{f^2} = M\left(1 - \frac{f^2}{3\omega^2} M f\right) = -\frac{f^2}{3\omega^2}\left(M^2 - \frac{3\omega^2}{f^2} M\right)$ oder $M(\chi) = \frac{3\omega^2}{2f^2}\cdot\left(1 \pm \sqrt{1 - 4Af}\right)$ wonach aber nur das negative Zeichen für $\chi \to 0$ zu einem nicht divergierenden Selbstenergieterm führt. Die Feldmasse des attraktiven Gravitationsfeldes ist demnach durch den Limes $\mu_g = \lim_{\chi \to 0}(M - m_0)$ gegeben. Aus dem negativen Zeichen folgt nach einer Rechenumformung für diesen Limes $\mu_g = \frac{3\omega^2}{f^2} A - m_0 = -\frac{f^2 m_0^2}{2\omega c \lambda}\left(1 - \frac{\lambda}{2s}\right)^2 < 0$. Diese negative Feldmasse muß positiv gegenüber der positiven Resofeldmasse $\mu_m = -\mu_g > 0$ haben, sodaß auch im Falle des Gl. 46 die Feldkomplementarität $\mu_g + \mu_m = 0$ gilt. Die Gravitationsfeldmasse μ_g

muß dann noch durch $\lambda' = 2s$ ausgezeichnet werden. In der räumlichen Interpretation von μ durch die Eigenschwingung $\mu \sim \omega_0 - \omega$ und $\mu_m \ll m_0$ ergibt sich weiters und $\lambda' = 2s$ ist offenbar mit dem Index R_{dem} identisch, sodaß $\hat{\lambda}$ mit R_{+4} zur Unterscheidung kommen können. (Vgl. mit Bd. VIII S. 59-61) So gelten also für R_{+4} die Theorie $E_g = -\mu_g \omega^2$, $E_g = h\frac{\omega}{\lambda'}$, $\omega = \frac{4}{3}c$ gleichzeitig, die auf $\mu_g = -\frac{f^2 m_0^2}{2\omega c \lambda}\left(1 - \frac{\lambda}{2s}\right)^2$ angewendet werden kann. Da $\lambda = -\frac{h}{m_0 c}$ ist, folgt $E_0 = \frac{f^2 \omega m_0^2}{2c\lambda}\left(1 - \frac{\lambda}{2s}\right)^2 = -\sqrt{\frac{f^2 \omega m_0^3}{2h}}\left(1 - \frac{h}{2m_0 c s}\right)^2 = h\frac{\omega}{\lambda'} = \frac{h\omega}{2s}$ oder $2s\left(1 - \frac{h}{2m_0 c s}\right)^2 = \frac{h^2}{f^2 m_0^3}$. Da die gravitative Feldmasse und die Gravitationsenergie somit also bekannt

Bei Kirch

$\mu_g + \mu_m = 0$, $\mu_g = -\frac{\gamma m_0^2}{2ak}\left(1 - \frac{b}{2m_0 c^2}\right)^2$

$\frac{3}{5}\omega^2 A_{t=1} = \frac{k}{\gamma}(m_0 + \mu_g)\left(1 - \frac{k}{2m_0 c^2}\right)^2 = \frac{k^2}{\gamma m_0^3}$.

Gleichung X_b. 101

In dieser Beziehung für S ist m_0 stets die Masse eines Lichtquants und die Gleichung X_b ist für S abgeändert so beschaffen, daß für alle ihr Tail B empirisch bekannten Lichtquantenarten in jeder Art Lichtes konstant

$S = \frac{k^2}{\gamma m_0^3}$ gesetzt werden kann. Mit dieser $m_0 = N m_p$ auf die Protonenmasse bezogen kann $N^3 S = \frac{k^2}{\gamma m_p^3} \approx 53$ [MPß]. Mit dieser stark approximativen Formel $m_0 = N m_p$, $N^3 S \approx 53$ [MPß] 101a

Gleichung X_{b_1}

Können also die Quantitätsbeziehungen mathematisch Kirchhoffes absolut schwarz bzw. werden wenn ihr mittleres Absorptionsvermögen N bekannt ist. Es ist also die Möglichkeit gegeben mittels X_b die beiden Randdichten Grenzen $X = (1+\alpha)\left(1 \pm \sqrt{1-(1+\alpha)^{-2}}\right)$ der Realität [illegible] welche für ein Lichtquant bestimmten Gesetz werden. ~~Dieselbe~~ Mg. 6.63 Da in α die Masse $M(\chi)$ enthalten ist, erscheint es zweckmäßig χ mit $\Phi(\chi) = 2\omega c$ (aus $\gamma q e^{-\gamma} = A\left(1 - \frac{\chi}{2}\right)^2$ zu ersetzen, wenn $\Phi(\chi)$ Integral $q = 1$ und daher $\frac{1}{\chi}(1-\chi)^2 = 2\beta$ also $\chi = (1+\beta)\cdot\left(1 \pm \sqrt{1-(1+\beta)^{-2}}\right)$ mit $\beta = \frac{S}{2\cdot 2A}$ in Analogie zu α! In dieser Beziehung

$(R, \rho) = S(1+\beta)(1 \pm \sqrt{1-(1+\beta)^{-2}})$,
$2\varepsilon A\beta = S$, 102

Gleichung X_c

erscheint nicht mehr $M(X)$ sondern nur noch der aus X_c^{101} bekannte Wert S und A. Da stets $A \ll S$ bleibt ist immer $\beta \gg 1$ sodaß für R und ρ beider Abstandsgleichungen R und ρ abschätzungsweise ergeben. Es ist in sehr guter Näherung $R \approx 2\beta S = \frac{S^2}{\varepsilon A}$ und $\rho \approx \frac{S}{2\beta} = \varepsilon A$ sodaß nach X_b^{101} für beiden Ebenen nur noch Punkt m und die Feldmassen μ_g bezw. μ_m aufzudrücken sind. Für die Gl X_b^{101} ergibt sich demnach

F Anmerkung auf Seite 324

$R\rho = S^2$,
$\rho \approx \varepsilon A$,

Gleichung X_{102a}

aus deren Lage der Verlauf der Feldmasse für $r \geq S$ sowie $M(s)$ ermittelt werden kann. Aus $\varphi(\lambda) = 2\omega c$ folgt im Mittelwert $M(R) = \frac{2\omega c}{\gamma} \cdot R\left(\frac{R}{S}-1\right)^{-2} \approx 2\omega c/\gamma \cdot \frac{S^2}{R} \approx 2\omega c/\gamma \cdot \varepsilon A = \frac{\varepsilon}{2}(m_o + \mu_g)$ und $M(s) = \frac{2\omega c}{\gamma} s\left(1-\frac{s}{S}\right)^{-2} \approx 2\omega c/\gamma \cdot \varepsilon A = M(R)$ wegen $s \ll S$. Ebenso folgt also dort die in $r \leq s$ insgesamt ~~eingeschlossene~~ Masse μ_g sowie auch die ~~eingeschlossene~~ Masse μ_m sowie auch die gesamte Masse μ_g sowie

Feldmassen gilt also
$M(R) \approx M(S) \approx \frac{e}{2}(m_0 + \mu_g)$,

Gleichung (10.2)

Aus dieser Beziehung folgt
$M(R) - m_0 \approx \left(\frac{e}{2} - 1\right) m_0 + \mu_g \cdot \frac{e}{2}$
und dies bedeutet, daß für
$\left(\frac{e}{2} - 1\right) m_0 \geqq \mu_m \frac{e}{2}$ immer $M(R) - m_0 \geqq 0$ bleibt, da aber
$M(S) - m_0 < 0$ ist, kann
für $\left(\frac{e}{2} - 1\right) m_0 \geqq \mu_m \frac{e}{2}$ die Beziehung $M(R) - m_0 \geqq 0$
nur dann bestehen bleiben, wenn
$M(R) - M(S) > 0$ ist.
Im Bereich $r_0 = \frac{\lambda}{2} \leqq r \leqq S$
ist also der Defekt der Feldmasse negativ, aber im
Bereich gravitativer Abstoßung
$S < r \leqq R$ positiv, solange
$\left(\frac{e}{2} - 1\right) m_0 \geqq \mu_m \frac{e}{2}$ ist.

Wäre dagegen $\left(\frac{e}{2} - 1\right) m_0 < \frac{e}{2} \mu_m$,
dann müßte stets $M(R) - m_0 < 0$
und somit $M(R) - M(S) < m_0 -$
$- M(S)$ werden, sodaß
$\left(\frac{e}{2} - 1\right) m_0 = \frac{e}{2} \cdot \mu_m$ offensichtlich
den ganz Ruhmasse freien
Bereich der Feldmasse
aber $m_0^2 \left(1 - \frac{f m_0^2}{2 c b}\right) \leqq \frac{8}{3}\left(1 - \frac{2}{e}\right) \frac{c b}{f}$
oder mit $y = \frac{f m_0^2}{2 c b}$ und $\alpha = \frac{4}{3}\left(1 - \frac{2}{e}\right)$
die quadratische Beziehung

$m_0^2 \leqq \frac{8}{3}\left(1 - \frac{2}{e}\right) \frac{c b}{f}$ für
$M(R) - m_0 \geqq 0$ oder $m_0^2 >$
$> \frac{8}{3}\left(1 - \frac{2}{e}\right) \frac{c b}{f}$ für $M(R) - m_0 < 0$
wenn $\mu_m = \frac{f m_0^3}{2 c b} \cdot \left(1 - \frac{b}{2 m c^2}\right)^2 \approx$
$\approx \frac{f m_0^3}{2 c b}$ oder $\frac{2}{3} \frac{c b}{f}$ werden kann.

20.6.65 Die vorläufige Bestimmung
des Radius Ruhmasse m_0
mit $\mu_m(m_0)$ nach Kap. IX

diese Beziehung nicht durchgeführt werden, weil μ_0 eine Approximation ist, welche mit Hilfe der voraussetzung $\left(\frac{3p}{8c^2}\right)^n \to 0$ für $n > 2$ ist. Diese Approximationsbedingung ist aber für $p = \frac{\lambda}{2}$ bei $\left(\frac{e}{2}-1\right)m_0 = \frac{e}{2}\mu_m$ wegen des hohen Wertes der Ruhemasse nicht erfüllt.

3.) Die Existenz des Weltstromes

Siehe Bd VII Seite 63 bis Seite 79 verwendet und zwar unter Berücksichtigung der vorangegangenen Ergebnisse und der verwendeten Symbolsprache den Formalismus übertragen. Fortsetzung Bd VII S. 79:
Diese Relation würde aber bereits in A VIII durchgeführt. Die Dimensionszahl $p = 2$ des Weltstromes passt aber nach der kinematischen selektiven semantischen Invarianz in die möglichen metrischen Dimensionen, welche metrische Tensoren Relativitäts Raume skalarfreien Raumes. Wegen $p = 2$ des Weltstromes τ Raume wird ~~nicht~~ verändert werden muss das R_4, in welchem $\mathfrak{G}.\ \{\!\{\} = \lambda \times \{\!\{\}$ durch $\{\!\{\} \neq \{\!\{\}^A$ nicht kovariant beschrieben wird, eine Projektion des für Relativitäts Arena geeigneten Tensorraumes R_6 ist. Bei $p = 2$ oder sind in A VIII die Untersuchung für alle innerhalb der Relativitäts möglichen Dimensionszahlen p durchgeführt worden. Dort ist es nahe, einige spezielle Theoreme

für zweidimensionale Lektonen im R_3 zu verallgemeinern.

F Anmerkung zu Seite 318

25.6.63 Im Produkt $R \cdot s$ kompensieren sich die Approximationsfehler von R und s, denn wird $\frac{1}{s}(R, s) = (1+\beta)(1 \pm \sqrt{1-(1+\beta)^{-2}})$ exakt in das Produkt eingesetzt, dann folgt $\frac{1}{s^2} R s = (1+\beta)^2 (1+\sqrt{1-(1+\beta)^{-2}})(1-\sqrt{1-(1+\beta)^{-2}}) = (1+\beta)^2 (1+\beta)^{-2} = 1$, also $R \cdot s = s^2$ exakt.

4) Lektronische Theoreme räumlich projektiver Welt-Strukturen

Aus Bd VII von S. 80 bis S. 89.

Lektonen-Postulat: Daß alle lektronischen Theoreme aus A VIII für die zulässige lektronische Dimensionszahl $\nu_p = 2$ des Weltlektrons übernommen werden können. Insbesondere zeigt sich, daß die Faktoren vor den Koordinatenausselektoren innerhalb der linearen Gitterselektoren nur $\sqrt{\tau}$ oder $i\sqrt{\tau}$ für die imaginäre Koordinate $\sqrt{\tau}$ des R_6 beim Komma. Die Gitterselektoren des R_6 sind also gegeben durch

$$\mathfrak{C}_K = \sqrt{\tau}\,(\;)_K, \quad \mathfrak{C}_{xm} = i\sqrt{\tau}\,(\;)_{xm}, \quad 1 \leqq K \leqq 3, \; 4 \leqq m \leqq 6$$

105

Gleichung (4).

Zusammen mit dem Theorem der extremalen Raumprojektionen ergibt sich ein weiteres merkwürdiges Theorem dieser Projektionen, nämlich $s = eA$ wird $s^2 = Rs = eRA$ und werden

mit RA mittels eines linearen Selektor ~~darstellt~~ darstellbar sein. Es ist $A = \frac{3\gamma}{16 c^2}(m_0 + \mu_g) \approx$
$\approx \frac{3\gamma m_0}{16 c^2} = \frac{\tau}{2\lambda}$, wenn
$E_0 = m_0 c^2$ und $E_0' = h\frac{c}{\lambda}$ angewendet wird. R ist seiner Interpretation entsprechend ein durch die Realitätsforderung bedingtes Abstandsextremum in R_3. Einsetzen von $A = \frac{\tau}{2\lambda}$ liefert $\varrho R \tau = 2\lambda \varepsilon^2$ und hieraus mit das Postulat $2\lambda \varepsilon^2 \sim 6; n$ und dem (projektiven) reellen Gütefaktor $\varepsilon = \varepsilon\sqrt{\tau}$ (!) sein, wobei die Metronenziffer n durch die Feldquelle $\mathfrak{F}$ also durch R, bestimmt wird. Da n nur von R abhängt kommt als Proportionalitätsfaktor allein die Dreieckfläche F ~~in Betracht~~

F Anmerkung auf S. 327

~~Den R projizierten Kreisflächen~~
~~des R_3~~ R^2 in Betracht. Denn also beispielsweise diese Kreisflächen sphärisch sind denn Raum $F = \pi$ mit der Einheitskreis sein u. s. w. Mithin gilt $\varrho R \tau = F' 6$; $n = \varepsilon F' \sqrt{\tau}$ n oder $\varrho R \sqrt{\tau} = \varepsilon n F$, $\varepsilon^2 \sqrt{F} = s_0$, Gleichung (106)
als weiteres metronisches Theorem räumlicher Wirkungsprojektionen.
4.7.63 Fortsetzung ~~in~~ Bd. VIII. S. 42

Anmerkung zu Seite 326

Der Selektor 6 ist dabei reell weil $2\lambda\varepsilon^2$ im R_3 liegt doch handelt es sich um die Projektion eines reellen Gütefaktors, was durch den projektiven Faktor ε zum Ausdruck gebracht

wird. Ist F diejenige Einheitsfläche, die nach einer Projektion aller räumlichen Niveauflächen der Feldstärke für die den Ebenen R_2 von einer Höhenlinie begrenzt wird, dann muß $\varepsilon^2 \sqrt{F} = S_0 = 1\,[m]$ für den Projektionsfaktor gelten.

Anmerkung zu Seite 223

sodaß das elektrische Theorem $\varepsilon R \sqrt{\pi} = \varepsilon F n$ aus § VI, 4 angewendet werden kann. Für die Elektronengruppe wird das Maximum n_N erreicht, wenn $m = m_q^{(\pm)}$ für q die Elektronenladung ist. Für dieses Extremum kann aber R der absolut größte Radius in R_3

überhaupt sein, denn für alle anderen Terme der Spektralfunktion liegt wegen $m^{\pm} > m_q^{(\pm)}$ die Realitätsgrenze der Feldstärken unter diesem Wert. Die Niveauflächen aller Terme sind nach $\varkappa q\, e^{-q} \sim \left(1 - \frac{\varkappa}{3}\right)^2$ Kugeln, $\varkappa$ = const. als sphärische Flächen gekennzeichnet, deren Höhenlinien stets nach einer Projektion in R_2 eine Schar konzentrischer Kreise bilden. In $\varepsilon R \sqrt{\pi} = \varepsilon F n_N$ ist also $F = \pi S_0^2 = \pi E$ und $\varepsilon = \sqrt{\frac{S_0}{\sqrt{F}}} = \pi^{-1/4}$, wenn $E = S_0^2 = 1\,[m^2]$ ist. Für diesen sphärischen Fall wenden wir das Theorem die Form $\varepsilon R \sqrt{\pi} = \pi^{\frac{3}{2}} n_N E$ an. Hierin ist $R = 2S^2 \frac{\omega c}{\chi m_{q(R)}}$, während $M_q = \frac{e}{2}$. $\left(m_q^{+} \mu_g\right) \approx \frac{e}{2} m_q$ ist, denn, da

m_q die untere Schranke des Massenspektrums ist, gilt $|\mu_q| \leq m_q$ stärker als für jeden anderen Term. Auch $\Sigma = \frac{k^2}{g m_q^3}$ erreicht wegen dieses massenmäßigen Verhaltens die beste Approximation. Es setzen liefert also $E n_N = \varepsilon \pi^{-\frac{3}{4}} R \sqrt{\pi} = \varepsilon \pi^{-\frac{3}{4}} \frac{2 \omega c}{g M_q} S^2 \sqrt{\pi} = 4 \pi^{-\frac{3}{4}} \frac{\omega c}{g m_q} \leq 2 \sqrt{\pi} = \frac{16}{3} \pi^{-3/4} \frac{k^2}{g} \frac{\mu^4}{m_q^4} \sqrt{\pi}$. Ist ε die Zahl aller Moduln in E, dann ist $\varepsilon \tau = \frac{E}{\mu^4 / m_q^4}$ und dies beträgt $2 n_N = \frac{32}{3} \pi^{-\frac{3}{4}} \frac{k}{g \varepsilon \sqrt{\pi}}$ Wirkt im Massenspektrum für Kürzung $1 + 4 \left(\frac{q}{\pi}\right)^4 = \alpha_q$ gesetzt, dann folgt nach einer Potenzierung unmittelbar $\alpha_q \left(\frac{m_q}{\mu}\right)^4 = \frac{2 n_N}{2 (2 n_N - 1)^2} \approx \frac{1}{2 n_N}$, also $2 n_N \approx \frac{1}{\alpha_q} \left(\frac{\mu}{m_q}\right)^4$, wenn ebenfalls für Kürzung $m_q^{(\pm)} = m_q$ verwendet wird. Diese Approximation ist gelassto weil $n_N \gg 1$ über jeder anderen

Quantenzahl der Spektralfunktion liegt. Für Vergleich liegt also $m_q^3 \approx \frac{32}{3} \pi^{-\frac{3}{4}} \frac{k^2 \alpha_q}{g \varepsilon \sqrt{\pi}} = 4 \pi^{-\frac{3}{4}} \frac{\alpha_q}{\varepsilon} \frac{k^3}{c^3}$ $= \left(\frac{k}{\beta c}\right)^3 \frac{4 \alpha_q}{\varepsilon}$, wenn abermals ($\tau^{-\frac{1}{2}} = \beta$ für Kürzung $\beta = \sqrt{\pi} \sqrt{\pi}$ Anwendung findet. Damit ist aber genähert $m_q^{(\pm)} \approx \frac{k}{\beta c} \cdot \sqrt[3]{4 \frac{\alpha_q}{\varepsilon}}$, $\beta = \sqrt{\pi} \sqrt{\pi}$, $\varepsilon \tau = E$, $\alpha_q = 1 + 4 \left(\frac{q}{\pi}\right)^4$, gleichfalls #129, für die einzelnen Ladungszahlen q gelten das massenmäßigen Verhalten. Für die Kleinstmasse welche eine elektrische Ladung trägt, ist offenbar $q = 1$ zu setzen, dann für $q > 1$ würde m_q anwachsen! Zu $m_e^{(\pm)} = \frac{k}{\beta c} \sqrt[3]{4 \frac{\alpha_1}{\varepsilon}}$ müßte es aber noch ein neutrales Komplement $m_{(e)0}^{(\pm)} = m_e^{(\pm)} \sqrt[4]{\alpha_1}$ geben, das noch trägt die absolut kleinste ponderable

Masse bei $q = 0$, denn hier ist $\alpha_q = 1$ und dies wiederum bedeutet $m_0^{(\mp)} = \frac{h}{\beta c}\sqrt[3]{\frac{4}{\varepsilon}} < m_e^{(\mp)} < m_{(e)0}^{(\mp)}$. Auf diese Minimalmasse können also die beiden anderen Elementarmassen bezogen werden, was zu

$$m_{\overset{0}{(\mp)}} = \frac{h}{\beta c}\sqrt[3]{\frac{4}{\varepsilon}}, \qquad m_e^{(\mp)} = m_0^{(\mp)}\left(1+\left(\frac{2}{\pi^2}\right)^2\right)^{\frac{1}{3}},$$

$$m_{(e)0} = m_e^{(\mp)}\left(1+\left(\frac{2}{\pi^2}\right)^2\right)^{\frac{1}{4}}$$

führt.

Löschung ~~X~~ 129a

Ersetzen der Naturkonstanten $h = 6{,}624 \cdot 10^{-34}$ [Wattsec^2] und $\gamma = 6{,}674 \cdot 10^{-11}$ [$m^3 Kg^{-1} sec^{-2}$], also $\tau = 6{,}1475 \cdot 10^{-70}$ [m^2]. Setzt man die Massenwerte $m_0^{(\mp)} \approx 9{,}03 \cdot 10^{-31}$ sowie $m_e^{(\mp)} \approx 9{,}147 \cdot 10^{-31}$ [Kg] und $m_{(e)0}^{(\mp)} \approx 9{,}26 \cdot 10^{-31}$ [Kg] für die Lösung des Problems des Spektralfaktors.

Anmerkung zu Seite 229

Neben dieser Neutrino als Neutro-elektron müsse es aber noch das in der Masse höhere Neutrino $m_0^{(\mp)}$ mit dem entsprechenden Antineutrino als absolut kleinere Grenze des Massenspektrums geben. Es sind also zwei verschiedene Neutrinoarten zu erwarten, zu deren Unterscheidung $m_{(e)0}^{(\mp)} = m_b^{(\mp)}$ als baryonisches und $m_0^{(\mp)}$ als Leptonenneutrino bezeichnet werden soll.

Anm. zu S. 228 Nah zu 5

~~6.) Herleitung der empirischen Elementarkonstanten~~

6.7.63 Die in allen vorangegangenen Betrachtungen immer wieder auftretenden Naturkonstanten sind empirische Naturkonstanten [Kg],

Messung in B beschrieben wurde oder aber es handelt sich dabei um Konstanten wie z.B. ω, α und β der Gravitationswellenemission u.s.w., welche theoretisch aus den empirischen Elementarkonstanten abgeleitet werden. Als solche Konstanten aber nur jene Konstanten angesprochen werden, welche ε_0 und μ_0 das Faktum und Faktion, sowie h als Wirkungsquantum γ als Gravitations Konstante. Diese Elementarkonstanten drücken aber grosse metrische Elementarbeziehungen der metrischen Konstanten aus, sodass versucht werden kann, mit Hilfe dieser

Konstanten die empirischen Elementarkonstanten zu metrisieren. Da das Ruhmassenquantum $m_0^{(\pm)} = m_0$ mit der zu ihm symmetrischen Ruhmasse des antiquantums klassisch der Masse gemäss $m_0 = \frac{h}{c^2} \sqrt{\frac{3}{4}}$ als untere Grenze der Kosmischen Massen der Kompositionen Spektralfunktion bekannt ist, können zunächst die beiden absoluten Grenzen des gravitativen Radiusbereiches $R_0 = R(m_0)$ und $s_0 = s(m_0)$ durch natürl. Konstanten ausgedrückt werden. R_0 ist dabei als der im R_3 überhaupt grösstmögliche Radius aufgefasst werden, sodass $2R_0 = D$ als Durchmesser des Universums R_3

interpretiert werden mit R_0 das andere absolute Extremum s_0 wiederum mit s_0 die Kleinstmögliche Distanz im R_3 sein d. h. wie auch immer die Konfigurationen der einzelnen Massen bei Kondensationszustand gewählt sein mögen, es kann kein Weltensystem, jedes STERNKondensationen geben bei welcher die Massen in irgendeiner Weise s_0 unterschreiten.

R_0 und s_0 sind also absolute mechanische Hilfsmittel Konstanten der betrachteten Raumart. Nach Gl. IV[29] ist m_0 die schwache Kondensation, sodass für diese Masse die Approximation $R_0 \approx 2\frac{ac}{\gamma M_0} s_0^2$ im genau-

ren Approximationsfalter also Terme der Spektralfunktion aufgefasst. Das gleiche Folgerungsmittel mit R_0 kann auch für $s_0 = \frac{h^2}{\gamma m_0^3}$ sowie $M_0 = \frac{e}{2} m_0$ und $s_0 = eA = e \cdot \frac{3\gamma m_0}{16 c^2}$ gelten. Dies bedeutet aber, dass in R_0 und s_0 der Wert $m_0 = \frac{h}{3c} \cdot \sqrt[3]{\frac{4}{\varepsilon}}$ eingesetzt werden kann. Aus den Bedingungen R_0, s_0 und m_0 wird sofort deutlich, dass sich in R_0 und s_0 die Konstanten h und c kompensieren, wenn mit dem Faktor $\varepsilon = \frac{\gamma h}{2\omega c^2}$ die Gravitationskonstante $\gamma = \frac{2}{a} \omega c^2 \varepsilon = \frac{8}{3h} \pi^3 \varepsilon$ substituiert wird. Auf diese Weise ergeben sich das Durchmesserminimum $R_0 = \frac{9\pi^2}{64^2 \varepsilon^{1/3}} \cdot \frac{1}{\pi^{11/6}}$

$= \frac{(3\pi \cdot 2^{-5})^{2/3} \sqrt{2}}{2\sqrt{\pi}} \cdot \varepsilon^{1/3} \cdot \varepsilon^{-1/6} \cdot \pi^{-1/6} \cdot (\cdot(2\varepsilon)^{1/3} \varepsilon^{-1/6} \pi^{-1/6} =$

$$\rho_0 = \frac{e\,E^{-\frac{1}{3}}}{\sqrt[4]{\pi}\,\sqrt{2}}\,\tau^{\frac{5}{6}},$$ d. h. mit jeder Raumstoßdichte

steigt ~~der~~ die wächst der ~~Abstand~~ minimale Abstand der durch τ gemessenen

~~Zahl~~ $\rho_0 = b\,\tau^{\frac{5}{6}}$,

~~$\alpha = \frac{1}{2}(\ldots)$~~

$$b = \frac{e\,E^{-\frac{1}{3}}}{\sqrt[4]{\pi}\,\sqrt{2}}$$

132 Gleichung

ausgedrückt, weil stets $\xi \cdot \tau = E = 1\,[m^2]$ ist, die größtmögliche Geschwindigkeit im R_3, die eine physikalische Wirkung haben kann, ist offensichtlich $\omega = \frac{4}{3}c$, sodaß $\rho_0 = \omega\,\vartheta$ ein Elementarvolumen ϑ im R_4 setzt. Es kann also die metrische Elementarkonstante ρ_0 durch eine Elementarvolumsgröße $\vartheta = \frac{3b}{4c}\,\tau^{5/6}$ ersetzt werden, die als metrische Größe des R_3 bereits $\tau = \frac{\gamma\,h}{2\,\omega\,c^2}$ existiert. Neben diesen beiden metrischen Elementarkonstanten ϑ und τ des R_4 gibt es aber noch zwei unmittelbare metrische Kondensatorkonstanten, nämlich die Kondensatorkonstanten $\mu = \sqrt{\frac{c\,k}{\gamma}}$ der Raumkondensatoren und $\varkappa = |c \pm 1| = \frac{3}{\pi^2}\sqrt{\frac{k}{R_-}}$ komplexer Raumzeitkondensationen. Es gibt also drei Beziehungen zwischen empirischen Naturkonstanten und den theoretischen Konstanten aller metrischen Elementarkondensatoren. Mit Verwendung des elementaren metrischen Zeitintervalles

$$\nu = \frac{3b}{4\varepsilon}\,\tau^{\frac{5}{6}}$$

132a

Gleichung

wird also die

Bestimmung der empirischen

Elementarkonstanten möglich.

Zunächst folgt aus 132a sowie $\chi = \frac{2}{\hbar}\,\omega\,c^2\,\tau$ und $\mu = \sqrt{\frac{c\,h}{\chi^2}}$ mit

$\omega = \frac{4}{3}\,c$ zunächst $c = \frac{3b}{4\vartheta}\,\tau^{5/6}$ und $h = 2\mu c\sqrt{\frac{2}{3}}\tau = \frac{\mu b}{\vartheta}\sqrt{\frac{3}{2}}\,\tau^{4/3}$ womit bereits h bestimmt wurde. Ferner erhält man ~~$\chi = \frac{8}{3}\,c^3/h\,\tau$~~ $\chi = \frac{8}{3}\,c^3/h\,\tau = 2\sqrt{\frac{2}{3}}\,\frac{c^2}{\mu}\sqrt{\tau} = \frac{9}{8}\sqrt{\frac{2}{3}}\,b^2\,\frac{\tau^2\sqrt{\tau}}{\mu\vartheta^2} = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{3}{2}}\,b^2\,\frac{\tau^2\sqrt{\tau}}{\mu\vartheta^2}$ und mit $c\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} = 1$ in Gl 132a mit $\frac{\varkappa}{3}\,\pi^2 = \sqrt{\frac{\hbar}{R}}$ schließlich $\frac{2}{9}\,\pi^5\varkappa^2 = \frac{\hbar}{R} = c\,h\,\varepsilon_0 = \varepsilon_0\mu^2\chi = \varepsilon_0\,\frac{3}{4}\sqrt{\frac{3}{2}}\,b^2\left(\frac{\tau}{\vartheta}\right)^2\mu\sqrt{\tau}$ also

$\varepsilon_0 = (\pi\varkappa)^2\left(\frac{2}{3\pi}\right)^3\sqrt{\frac{2}{3}}\left(\frac{\vartheta}{b\tau}\right)^2\frac{1}{\mu\sqrt{\tau}}$.

Dieser Wert widerspricht Kaum in $c^2\,\varepsilon_0\,\mu_0 = 1$ oder $\frac{1}{\mu_0} = c^2\,\varepsilon_0$ mit c

eingesetzt werden, was dann $\frac{1}{\mu_0} = c^2\,\varepsilon_0 = \frac{9}{16}\,\frac{b^2}{\vartheta^2}\,\tau^{5/3}\,\varepsilon_0 = \frac{1}{3}\pi^3(\pi\varkappa)^2\sqrt{\frac{2}{3}}\,\frac{1}{\mu\sqrt{\tau}} = \frac{1}{3}\pi^5\varkappa^2\sqrt{\frac{2}{3}}\,\frac{1}{\mu\sqrt{\tau}}$ oder $\mu_0 = \frac{3}{\pi^5}\sqrt{\frac{3}{2}}\,\frac{\mu\sqrt{\tau}}{\varkappa^2}$ ergibt. Damit sind aber alle empirischen Elementarkonstanten durch die mechanischen Elementarkonstanten der Urelektronkondensationen innerhalb des Weltsubstrates ausgedrückt worden. Für diese Bestimmung gilt also das System

$$\hbar = b\sqrt{\frac{3}{2}}\,\frac{\mu}{\vartheta}\,\tau^{\frac{4}{3}}$$

$$\chi = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{3}{2}}\left(\frac{b\tau}{\vartheta}\right)^2\frac{\sqrt[6]{\tau}}{\mu},$$

$$\varepsilon_0 = (\pi\varkappa)^2\left(\frac{2}{3\pi}\right)^3\sqrt{\frac{2}{3}}\left(\frac{\vartheta}{b\tau}\right)^2\frac{1}{\mu\sqrt{\tau}},$$

$$\mu_0 = \frac{3}{\pi^5}\sqrt{\frac{3}{2}}\,\frac{\mu\sqrt{\tau}}{\varkappa^2},$$

~~$\varkappa = \frac{1}{\pi}$~~

133

Gleichung

Nach zeitlicher Weltelementarität

8.7.63 4Uc Entsprechend R_0 ist der gravitologische Radius im physischen R_3 und somit $y = 2R_0$ der gravitologische Abstand in diesem

Kann sodass D als Durchmesser des reellen R_3 – also des Universums – interpretiert werden (vgl. hierzu z.B. KV S. 110)? Nach Gl. (2) wird D allein durch τ bestimmt. Daraus folgt, dass der Durchmesser des R_3 durch die submikroskopische Abmessung des Weltraums bestimmt wird und nicht umgekehrt. Da a in Gl. (2) ein reiner Dimensionsfaktor ist folgt, dass D nur von τ also nicht von den übrigen drei universellen Konstanten abhängt. Die empirisch beobachtete Rotverschiebung extragalaktischer Spiralnebelspektren lässt eine Abhängigkeit $D(t)$ vom Alter des R_3 vermuten. Diese Zeitabhängigkeit kann

aber nach Gl. (134) mit $\tau(t)$ zur Folge haben, während μ, $\varkappa$ und β universelle t-Konstante bleiben. Die empirischen Elementarkonstanten dagegen werden wegen ihrer Abhängigkeit von τ, ebenfalls zu Funktionen des Weltalters des Universums. Dieser Sachverhalt wird deutlich, wenn mit $D = 2R_0$ Gl. (133) in die Form $\tau = (\alpha D)^{-\frac{8}{11}} \sim D^{-\frac{8}{11}}$ gebracht und damit in Gl. (133) substituiert wird. Wegen des zeitlichen Verlaufs von μ, $\varkappa$ und β ergeben sich daraus die Proportionalitäten

$$h \sim D^{-\frac{8}{11}}, \quad \gamma \sim D^{-\frac{13}{11}},$$
$$\varepsilon_0 \sim D^{\frac{13}{11}}, \quad \mu_0 \sim D^{-\frac{3}{11}},$$
$$D = 2R_0$$

Gleichung (135)

Wenn nun $D(t)$ ist, dann kann versucht werden, diejenige Verhältnis empirischer Elementar-Konstanten zu finden welches sich im höchsten Grade mit D verändert. Ist diese Grösse n und η das diesen gehörige Verhältnis, dann muß $\eta \sim D^n$ sein. Wenn nun die Möglichkeit besteht, η so mit geeigneten Konstanten Faktoren A zu versehen daß $\eta A = y \sim D^n$ zu einem Verhältnis physikalisch messbarer Größen wird, dann folgt nach einer Logarithmierung $\ln y = n \ln D + \text{const.}$ oder nach zeitlicher Differentiation $\frac{\dot{y}}{y} = n \cdot \frac{\dot{D}}{D}$. Wenn also $\dot{y} \neq 0$ nachweisbar ist, dann muß

auch $\dot{D} \neq 0$ bleiben, d. h. eine weitere Messung wie sie jüngst gezeigt ob sich D des R_3 im Verlauf der Kosmischen Bewegung ändert oder nicht. Der gesuchte Zusammenhang beschreibt durch

$$D \cdot \dot{y} = n \dot{D} y$$

Gedanken 135a

Können eine empirische Basis für eindeutige exakte Beschreibung der Kosmischen Bewegung innerhalb der Weltarchitektur liefern

Nichtalkalien und Metalle sind Elemente ohne spezifische Substanzen

16.7.63 Für ein Photon der Wellenlänge λ und der Feldmasse m gilt die empirische Ruheenergiebeziehung des Photonenquants $E = h\nu = \frac{1}{\lambda} ch$ oder $E\lambda = ch \sim D^{-\frac{13}{11}}$ also ein absolut

faktion der kosmischen Bande
@ines. Demnach ist $\Delta(ch) \neq 0$
mit $\Sigma \neq 0$
Wahrscheinlich $\Delta(ch) = \Delta E \lambda + E \Delta \lambda$ *
und hierin ist ΔE ein Energie-
verlust des Photons, der auf
$\omega > c$ und daher $\Gamma \times \vec{\mu} \neq 0$ der Photonenbahn
zurückgeht, dann wegen
wieder ungangbarkeit imaginär
ω dann wird das Photon von
einem Gravitons begleitet, wel-
ches mit $\omega - c > 0$ das Photon
überholt und von diesem nach-
gebildet wird. Nach dem Äqui-
valenzprinzip äquivalent im R_{+4} ist
aber $\Delta E = + \mu_g \omega^2$, worin $\mu_g =$
$- \frac{3\gamma}{16 c^2} \frac{m^2}{r_0} \left(1 - \frac{r_c}{r_0}\right)^2$ zu setzen ist.
Da $r_0 = \frac{\lambda}{2} \ll \frac{2\gamma}{c^2}$ ist folgt
$\mu_g = - \frac{2}{3} \cdot \frac{\gamma}{\omega^2} \frac{m^2}{\lambda}$ und $\Delta E =$
$= - \frac{2}{3} \gamma \frac{m^2}{\lambda} = - \frac{2}{3} \gamma \frac{h^2}{c^2} \lambda^{-3}$, weil
für das Photon $m = \frac{h}{\lambda c}$ gilt.
ΔE wird während der ganzen Zeit ~~emitt~~
als Gravitonen emittiert, welche das

Gravitonbündel um dem Photon
um den Betrag λ vergrößern.
Es ist also $\frac{\Delta E}{\Delta t} = - \frac{2}{3} \gamma \frac{h^2}{c^2} (\omega - c) \lambda^{-4} =$
$= - \frac{4}{3} \omega \tau h (\omega - c) \lambda^{-4} = - \frac{1}{3} \omega^2 \tau h \lambda^{-4}$
weil $\Delta t \cdot (\omega - c) = \lambda$ ist. Einsetzen
in $\frac{\Delta}{\Delta t}(ch) = \lambda \frac{\Delta E}{\Delta t} + E \frac{\Delta \lambda}{\Delta t}$ mit
$E = \frac{ch}{\lambda}$ und Division durch ch
liefert $- \frac{4}{9} \omega \tau \lambda^{-3} + \frac{1}{\lambda} \frac{\Delta \lambda}{\Delta t} =$
$= \frac{1}{ch} \frac{\Delta}{\Delta t}(ch) = D^{\frac{13}{11}} \frac{\Delta}{\Delta t} D^{-\frac{13}{11}}$ und
hierin kann, wegen $\lambda \ll D$ der
infinitessimale Einfluß vernach-
lässigt werden, was nach einer
Multiplikation mit λ^3 die
differentialgleichung $- \frac{4}{9} \omega \tau +$
$+ \lambda^2 \dot{\lambda} = - \lambda^3 \cdot \frac{13}{11} \frac{d}{dt} \ln D$ liefert.
Mit hierin $y = \lambda^3$ sowie
$p = + \frac{39}{11} \frac{d}{dt} \ln D$ und $q = + \frac{4}{3} \omega \tau$
gesetzt, dann ergibt sich die
lineare inhomogene Form
$\dot{y} + yp = q$, für welche sich die

Lösung $y = e^{-\int p\,dt}\left(\int q e^{\int p\,dt}\,dt + A\right)$ mit dem Faktor Konstanten A ergibt. Da $p = \frac{39}{11}\frac{d}{dt}\ln D$ und $\int p\,dt = \frac{39}{11}\ln D$ ist und $q = +\frac{4}{3}a\hat{c} \sim D^{-1}$ ist folgt, wenn α den Proportionalitätsfaktor von q darstellt

$$y = D^{-\frac{39}{11}}\left(\alpha \int D^{\frac{28}{11}}\,dt + A\right).$$

20. 7. 63 Dieses Faktorial kann jedoch nicht ausgeführt werden weil der Verlauf $D(t)$ über Kosmischen Bereich unbekannt ist. Dagegen besteht die Möglichkeit $\dot{D}$ abzuschätzen. Für eine Spektrallinienverschiebung $\Delta\lambda$ als Folge von $D(t)$ und $v > c$ ergibt sich

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = +\left(\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}\frac{\dot{D}}{D} + \left(+\frac{16}{9}\frac{E}{\lambda^2}\right)\right) = -\left(\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}\frac{\dot{D}}{D} + \frac{16}{9}a^{-\frac{6}{11}}D^{-\frac{6}{11}}\frac{1}{\lambda^2}\right) \quad (1)$$

also im allgemeinen eine sehr schwache Rotverschiebung mit Dispersion. Hieraus folgt deutlich, daß die auf $v > c$ fortschreitende Lichtverschiebung allein bei $D = \text{konst.}$ als Rotverschiebung mit Dispersion durch eine Rotverschiebung für $D(t)$ ohne gravitative Lichtablenkung übertragen wird. Diese Lichtverschiebung zusammen mit der Rotverschiebung ist in $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ enthalten. Doch sind tatsächlich eine Rotverschiebung enthaltende spektroskopische Beobachtungen, welche mit dem absoluten λ im R_3 arbeiten und mit einer Expansionsbewegung des R_3 als Folge von $D(t)$ zu rechnen kann. Diese Expansion bedingt aber $\dot{D} > 0$ und eine mit λ wachsende Fluchtbewegung v aller Galaxien

auf $v > c$ fortschreitende Lichtverschiebung allein bei $D = \text{konst.}$ als Rotverschiebung mit Dispersion durch eine Blauverschiebung für $D(t)$ ohne gravitative Lichtablenkung übertragen wird. Diese Lichtverschiebung zusammen mit der Blauverschiebung ist in $\frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ enthalten. Doch sind tatsächlich eine Rotverschiebung enthaltende spektroskopische Beobachtungen, welche mit dem absoluten λ im R_3 arbeiten und mit einer Expansionsbewegung des R_3 als Folge von $D(t)$ zu rechnen kann. Diese Expansion bedingt aber $\dot{D} > 0$ und eine mit λ wachsende Fluchtbewegung v aller Galaxien

das R_3 und damit eine Dirac'sche Flächbewegung bedingte Rot-verschiebung $\frac{\Delta_2 \lambda}{\lambda} = \frac{\beta}{1-\beta}$ mit $\beta = \frac{v}{c}$. Beide Rotverschiebungen müssen addiert

$$\varkappa = \frac{\delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} + \frac{\Delta_2\lambda}{\lambda} = \frac{\beta}{1-\beta} - \left(\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}\frac{\dot D}{D} + \frac{16}{9} a^{-\frac{6}{11}} D^{-\frac{6}{11}} \lambda^{-2}\right)$$

für beobachteten Rotverschiebung $\varkappa$ überlagern wobei allerdings der Dispersionsanteil [illegible] der Beobachtungsreihe linear mit wachst D des R_3, dem bekannten Gesetz $\frac{v}{s} = \frac{\dot D}{D}$ oder $\beta = \frac{\dot D}{D}\frac{s}{c}$ was vereinfacht $\varkappa = \frac{\dot D s}{Dc - \dot D s} - \left(\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}\frac{\dot D}{D} + \frac{16}{9} a^{-\frac{6}{11}} D^{-\frac{6}{11}} \lambda^{-2}\right)$ liefert, d. h. hier wird die [illegible] Bewegung $\dot D$ als Funktion des relativen Abstandes s im R durch die beobachtete Spektralliniens

verschiebung $\varkappa$ für den jeweiligen Abstand s ausgedrückt.

17.8.63 Insgesamt setzt sich also $\varkappa$ aus drei Anteilen zusammen, nämlich aus der Verschiebung infolge der Flächbewegung $\varkappa_1 = \frac{\Delta_2\lambda}{\lambda} = \frac{\dot D s}{Dc - \dot D s}$, einer Blauverschiebung [illegible] Rot $\varkappa_2 = \frac{\Delta_1\lambda}{\lambda} = -\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}\frac{\dot D}{D}$ als Folge [illegible] Wechselwirkung durch $\dot D > 0$ und einer Rotverschiebung $\varkappa_3 = \frac{\Delta_+\lambda}{\lambda} = \frac{16}{9}\frac{\tau}{\lambda^2}$ als Folge der gradlinigen Lichtausbreitung wegen $w > c$ total

$$\varkappa = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sum_{k=1}^{3} \varkappa_k \,,$$

$$\varkappa_1 = \frac{\dot D s}{Dc - \dot D s}\,, \quad \varkappa_2 = -\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}\frac{\dot D}{D}\,,$$

$$\varkappa_3 = \frac{16}{9}\frac{\tau}{\lambda^2}$$

Gleichung 13b für die gesamte Spektralliniens-verschiebung, q.e.d.

19.8.63 Die Interpretation der Konstanten A, aus dem empirischen Zusammenhang $v = A \cdot s$ nach B. einer Flüchtbewegung im R_3 v. Hubble durch $A = \frac{\dot{D}}{D}$ gestattet eine Weiterführung der Überlegungen. Zunächst folgt unmittelbar, daß unmöglich $\dot{D} = \text{const} \neq 0$ sein kann, denn wäre dies der Fall, so wäre $A = 0$ wegen $\dot{D} = 0$, was aber im Widerspruch zu der Erfahrung, $A > 0$ steht. Auch folgt sich $\dot{D} > 0$, denn nur auf diese Weise ist $A > 0$ realisierbar. Es wäre festzustellen, ob $A = \text{const}$ oder $A(t)$ ist, und wie im letzteren Falle die Zeitfunktion verläuft. Hierbei handelt es sich aber um eine fehlende

empirische Aussage, welche wenn sie vorhanden, wäre, eine Aussage über $D(t)$ gäbe, mit Mit Gl. 135a könnte diese empirische Aussage gewonnen werden. Ist α die vorgegebene Empfindlichkeit des Meßinstrumentes für y, dann muß für Δy als Auflösung während der Meßzeit Δt zwischen zwei messungen spürbares $\frac{\Delta y}{y} \geq \alpha$ sein wenn Δy registriert werden soll. Aus $\dot{y} D = n y \dot{D}$ folgt aber unmittelbar $\frac{\Delta y}{y} = n \frac{\dot{D}}{D} \Delta t = n A \Delta t$, also $n A \Delta t \geq \alpha$ das für die Zeit zwischen zwei Messungen $\Delta t \geq \frac{\alpha}{n A}$ fordert, da empirisch $A \approx 2{,}44 \cdot 10^{-18} [s^{-1}]$ fest liegt, wird Δt dann besonders klein, wenn y so gewählt wird,

dass n möglichst hoch und die Gerätekonstante α möglichst klein ausfallen. Wenn ein hinreichend kleiner Wert Δt erreicht werden kann, dann besteht die Möglichkeit, die Messpunkte $\frac{\Delta y}{y}$ im Diagramm über t aufzutragen und den empirischen Verlauf $\frac{y}{y}$ einer analytischen Funktion $\varphi(t)$ approximativ anzupassen. Mit dieser empirischen Zeitfunktion und $A = \frac{\dot{D}}{D}$ könnte dann $D(t)$ ermittelt werden.

Führt man das Integral $\psi = \frac{1}{n} \int \varphi(t)\, dt$ ein, welches auch den durch y bedingten Messpunkten n enthält, und misst man vom zeitlichen Ursprung $t = 0$ des R_3 bis zum Moment

kommen aber $t = T$ des physischen Universums erstreckt, dann folgt aus $\frac{\dot{D}}{D} = \frac{d}{dt} \ln D$ für das Gesetz $D(T) = D_0 \cdot e^{\psi}$, wenn $D_0 = D(0)$ der Durchmesser des R_3 im Weltanfang ist. Zusammengefasst gilt also

$$\Delta t \geq \frac{\alpha}{nA}, \quad A(T) \approx 2{,}44 \cdot 10^{-18}\ [\text{sec}^{-1}],$$

$$\psi = \frac{1}{n} \int \varphi(t)\, dt, \quad D(t) = D_0\, e^{\psi},$$

Gleichung 136a

für Werte, für unmittelbar $D_0 > 0$, weil stets $D > 0$ bleiben muss. Die unmittelbare Konsequenz

$$D_0 \neq 0$$

Gleichung 136b

bedeutet also, dass der R_3 beim Beginn der kosmischen Bewegung auf jeden Fall einen von Null verschiedenen Durch-

messen gehabt haben wir, was aber dem Relevanzkriterium aller Wirkungen des R_4 entspricht. Da aber dem der R_6 als Wechselwirkung vorliegt welches mit $\tau > 0$ zweidimensional wechselwirkt ist existieren selektive semantische Faktoren welche semantische Syntrizen als relevante Basiskuntropien relevanter Areale und zeitlich relevanter Tektonik indizieren. Das bedeutet aber dass eine syntrometrische Beschreibung der Welt als relevante Area möglich sein muß, d. h. es muß eine Fassung des Wechselwirkungs existieren, die dem Heisenbergschen Kriterium genügt.

Die Begriffe 136 Objekt noch andere Aussagen. Die Terme x_1 und x_3 sind punktuell an die Natur der Photonen gebunden nicht aber die Blaukomponente $x_2 = -\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}\frac{\dot{D}}{D} = -\frac{39}{11}\frac{\lambda}{c}A$; denn hierbei handelt es sich um eine allgemeinen Energiegesetzes jeder Wellenlänge sofern einer Expansion des x_3. Da im Fall des Photons auf $\Delta t = \frac{\lambda}{v-c} = \frac{3\lambda}{c}$ bezogen wird und $\frac{\Delta\lambda}{\Delta t} \to \dot{\lambda}$ gilt, folgt $\frac{1}{\lambda}\frac{\Delta\lambda}{\Delta t} = -\frac{13}{11}A \to \frac{\dot{\lambda}}{\lambda}$. Im Fall punktueller Quanten ergibt sich aus $\lambda = \frac{h}{mc}$ und gl. 135 die Information $\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = \frac{d}{dt}\ln\lambda = -\left(\frac{\dot{m}}{m} + \frac{\dot{c}}{c} - \frac{\dot{h}}{h}\right) = -\frac{13}{11}A$ oder

$\frac{\dot m}{m} = \frac{\dot h}{h} - \frac{\dot c}{c} + \frac{13}{11} A$. Nach Gl. 135 ist aber $\frac{\dot h}{h} = -\frac{8}{11}\frac{\dot D}{D} = -\frac{8}{11} A$ und $-\frac{\dot c}{c} = \frac{5}{11}\frac{\dot D}{D} = \frac{5}{11} A$. Also $\frac{\dot m}{m} = \frac{10}{11} A$. wegen $A = \frac{\dot D}{D}$ und Gl. 136a folgt $A = \dot\psi$ und dies nach die Integration $m = m_0 \cdot e^{\frac{10}{11}\psi} = m_0 \left(\frac{D}{D_0}\right)^{\frac{10}{11}}$ möglich wenn $m_0 = m(0)$ die Masse des Quarks bei Beginn der kosmischen Bewegung ist. Also

$$m = m_0 \left(\frac{D}{D_0}\right)^{\frac{10}{11}}$$ 136c

Gleichung

folgt, daß mit fortschreitender kosmischer Bewegung die Massen aller Elementarteilchen anwachsen. Für die Ausarbeitung der Bedingungen Gl. 136a und Gl. 136c, sowie aber weiterer Aussagen, welche $D(t)$ enthalten, siehe

F. Anmerkung siehe Bd XV S. 89

eine Grundkonstante von D_0 voraus. Noch ist darüber vorerst noch keine Aussage mit Ausnahme von Gl. 136b möglich. Es besteht aber die Möglichkeit nach derjenigen Rotationszahl λ_K eines Photons zu suchen, bei welcher die Raumkomponente R_2 durch die Rückstoßenergie R_3 kompensiert wird, d. h. bei welcher sich der durch $\dot D > 0$ bedingte Energiegewinn in ein vom laufenden Quantum transportiertes Quantum kompensiert. Die Bedingung der Kompensation wäre

$R_2 + R_3 = 0$ oder $\frac{10}{9}\frac{E}{\lambda_K^2} - \frac{39}{11}\frac{\lambda_K}{c} A = 0$ ein Zusammenhang des R_3, oder explizit

$\lambda_K \approx \sqrt[3]{\frac{c E}{2A}}$ 136d

Gleichung

Kopplung von c_{und} τ mit dem empirischen Wert $A \approx 2{,}44 \cdot 10^{-18}\,[\mathrm{sec}^{-1}]$ liefert dann $\lambda_K \approx 3{,}35 \cdot 10^{-15}\,[\mathrm{m}]$, also $\lambda_K \approx 2{,}54\,\lambda_p$, wenn $\lambda_p = \frac{h}{m_p \cdot c}$ die Wellenlänge des Protons ist. Anmerkung siehe Band XV S. 90 zu Kapitel I

7) Evolution der Populationen

28.8.63 Die empirisch als entwicklungsgeschichtete Wirkungsgefüge definierten organischen Leben u. a. stets die Eigenschaft, sich fortzupflanzen und einen vorgegebenen Biotop optimal als Population zu besetzen. Bei dieser Generationsfolge kommt es aber zu Mutationen der Genstrukturen, wodurch die Population, aber auch die Strukturen der organischen selbst zeitlich geändert werden kann. Dieser empirische Sachverhalt gestattet eine analytische Untersuchung, welche aufzeigen kann bis zu welchem Grad der Grundsatz aspekt auf den Lebensprozess anwendbar ist. Wenn B der vorgegebene Biotop und A eine Anfangspopulation in B^m, deren Organismen so beschaffen sind dass $q > 0$ eine Fortpflanzungsfähigkeit besitzen und jeweils q neue Fortpflanzungsfähigkeit produzieren, von denen aber $Z \leq p$ während ihrer ontogenetischen Evolution vor der Fortpflanzungsreife ausfallen, ist $A > q$ und gibt $\mathfrak{A}$ die jeweilige Populationsbesetzung an,

dann gilt $Q_0 = A$ aber in der ersten Generation $Q_1 = \frac{A}{q}(p-Z) = A\frac{N}{q}$, wenn $N = p - Z$ die Zahl der tatsächlich zur Fortpflanzung kommenden Individuen ist. In der zweiten Generation wird B mit $Q_2 = A\left(\frac{N}{q}\right)^2$ und nach der Schlußweise der vollständigen Induktion durch die Generation n mit $Q_n = A\left(\frac{N}{q}\right)^n$ besetzt. Diese Generationsbesetzung des B ist im logarithmischen Maß gegeben durch $\Phi_n = \ln Q_n = n \ln \frac{N}{q} + \ln A$, während als Generationsfunktion $\Phi = \Delta \Phi_n = \Phi_n - \Phi_{n-1} = \ln \frac{N}{q}$, also im logarithmischen Maß die Änderung der Population besetzung von einer Generation zur andern

verwendet werden kann. Für diese Generationsfunktion $\Phi = \ln \frac{N}{q}$ ist stets $N < p$ solange $Z > 0$ ist d.h. es kann $\frac{N}{p} = w$ als Fortpflanzungswahrscheinlichkeit und $w_0 = \frac{q}{p}$ als entsprechende Wahrscheinlichkeit eines Fortpflanzungsereignisses interpretiert werden, sodaß $\frac{N}{q} = \frac{w}{w_0}$ und $\Phi = \ln w - \ln w_0$ gilt. Das natürliche Logarithmus einer Wahrscheinlichkeit ist aber stets nach Boltzmann der Entropie S proportional, sodaß grundsätzlich $\Phi \sim \Delta S$ ist, d.h. die Generationsfunktion ist einer Entropiedifferenz proportional. Das diesem Sachverhalt

$$\Phi = \ln w - \ln w_0 \sim \Delta S,$$
$$\frac{w}{w_0} = \frac{1}{q}(p - Z)$$

41

folgt also unmittelbar das Entropieaustausch $\Delta S > 0$ für $p - \bar{z} > q$, während für $p - \bar{z} < q$ die Entropie $\Delta S < 0$ abfällt. Die Stabilität des Besatzens des B wird also durch $\Delta S = 0$ mit $p - \bar{z} = q$ gekennzeichnet weil dann $\Phi = 0$ keinen Populationsaustausch bedeutet. Die Entropie eines Populationen steigt also solange bis der Biotop optimal besetzt ist. Ist dann noch B geändert so ändert sich auch die Abundanz des Populationstypes erzwungen wird. Kommt es zu einer Entropieänderung hinsichtlich des ursprünglichen Biotops dann ist indessen auf den zeitlich veränderten Biotop zurückzu-

die Stabilität $\Delta S = 0$ einzustellen.

29.8.63 Mit $\frac{p}{q} = \gamma$ und $\frac{\bar{z}}{q} = \eta$ auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit bezogen, dann wird aus $\Phi = \ln(\gamma - \eta)$ deutlich, daß alle entsprechenden Wirkungsgefüge grundsätzlich als Doppelsysteme aufgefaßt werden müssen. Ein solches Doppelsystem, welches durch seine Stabilität gekennzeichnet wird einerseits durch jene Qualität Φ bestimmt welche mit der gesellschaftlichen Stabilität einsetzt, und andererseits durch jene Qualität η, welche mit abnehmender selektiver Verbindung abfällt. Es liegt in der Natur der organischen ihre Eigenschaften genetisch

durch die Generationsfolge dar-
gegeben was in der Lebens-
erhaltung aller Organis-
men begründet liegt. Bei
diesem Vorgang kommt es
aber zu geringen Mutationen
des Genotypus sodass sich
das Doppelsystem Φ und dann
auch $\overset{\text{oder die Bivariate Funktion } Y = f - z}{\Phi}$ und Y Zeiten än-
dern, wenn als Zeiteinheit
die Dauer einer Generation
angenommen wird. Da die ~~Mu~~
~~Mutationsbedingten~~ Evolutions-
epochen laufender Mutationen
aber wesentlich größer sind,
als die Dauer einzelner Gene-
rationen kann t in guter Näherung
als stetig angenommen werden
zumal die Mutationsfaktoren
ständig wirken und mit in

der jeweiligen ~~Generation~~ ~~Population~~
manifest werden. Empirisch gibt
es drei Typen von Mutations-
faktoren, nämlich

a) die den Biotop einpe-
zielten x, welche Funktio-
nen die jeweilige Umwelt
von B angeben sind.

b) endogene Mutationen y,
welche auf spezifische Körper-
funktionen des betr. Organismus
zurückgehen.

c) Spontanmutationen z,
welche auf die thermische
Molekularbewegung der
Genmoleküle zurückgehen.

Alle drei Größen $x(t)$ sowie $y(t)$
und $z(t)$ sind Zeitfunktionen
deren Verlauf, wegen ihres vor-
wiegend statistischen Charak-

ters analytisch nicht erfassbar ist. Diese drei Größen können aber als generalisierte Koordinaten eines abstrakten Evolutionsraumes E aufgefaßt werden, dessen Punkten sich mit t ändern. Ganz allgemein ist dann $\psi(x_1, x_2, x_3, t)$ und daher die lokale Zeitableitung

$$\frac{d\psi}{dt} = \dot{\psi} + \frac{\partial\psi}{\partial x}\dot{x}_1 + \frac{\partial\psi}{\partial x_2}\dot{x}_2 + \frac{\partial\psi}{\partial x_3}\dot{x}_3 =$$
$$= \dot{\psi} + \bar{v}\,\mathrm{grad}\,\psi, \quad \text{denn}$$

mit $(\bar{e}_i\,\bar{e}_k)_3 = \hat{E}$ ist $\bar{v}$ die orientierte Evolutionsgeschwindigkeit eines $\bar{v} = \bar{e}_1\dot{x}_1 + \bar{e}_2\dot{x}_2 + \bar{e}_3\dot{x}_3$ exemplifiziert wird. Auf jeden Fall gilt $\mathrm{div}\,\bar{v} = 0$, also

$$\bar{v}\,\mathrm{grad}\,\psi = \bar{v}\,\mathrm{grad}\,\psi + \psi\,\mathrm{div}\,\bar{v} =$$
$$= \mathrm{div}(\bar{v}\psi) \quad \text{aber} \quad d\psi/dt = 0.$$
$$= \dot{\psi} + \mathrm{div}(\bar{v}\psi).$$

Wird voraus gesetzt, daß mit diskreten

$\bar{v}$ die jeweilige Stabilität im B erreicht wird (Ausgeschlossen sind die Stabilität), dann gilt $\frac{d\psi}{dt} = 0$, also $\psi = \psi(x, y, z)$ und $\frac{d\psi}{dt} = \mathrm{div}(\bar{v}\psi)$, da sich die Population ständig den Biotopen anpasst, dann Stabilität angenommen werden d. h. es gibt ein Stabilen $\frac{d\psi}{dt} = \dot{\psi}$ und daher $\mathrm{div}(\bar{v}\psi) = 0$. Da der Evolutionsraum kartesisch ist, ist $\bar{v} \neq 0$ und $\psi(x_1, x_2, x_3)$, sodaß $\mathrm{div}(\bar{v}\psi) = 0$ im V_3 mit diskreten $\bar{v}\psi = \mathrm{rot}\,\bar{\mu}$ mit $\bar{\mu}(x_1, x_2, x_3)$ erreicht werden kann, womit sich die Stabilität ausdrückt. Skalarmultiplikation mit $\bar{v}$ und Subtraktion von $\bar{\mu}$ rot $\bar{v}$ ergibt $v^2\psi - \bar{\mu}\,\mathrm{rot}\,\bar{v} =$
$= \bar{v}\,\mathrm{rot}\,\bar{\mu} - \bar{\mu}\,\mathrm{rot}\,\bar{v} =$
$= -\mathrm{div}(\bar{v} \times \bar{\mu})$, was dann

über den Volumen des V_3 mit $dV = dx_1 \cdot dx_2 \cdot dx_3$ integriert

$$\int_V (v^2 \psi - \bar{\mu}\, \mathrm{rot}\, \bar{v})\, dV =$$

$$= -\int_V \mathrm{div}\, (\bar{v} \times \bar{\mu})\, dV = -\oint \bar{v} \times \bar{\mu}\, d\bar{F}$$

mit dem abstrakten Flächenelement $d\bar{F}$ liefert. Nach der Rabilikäkszerlegung können die Rotationen innerhalb des von F eingeschlossenen Volumens V stattfinden und über bedeutet analytisch $\bar{v} \times \bar{\mu} \perp d\bar{F}$ oder

$$\oint \bar{v} \times \bar{\mu}\, d\bar{F} = 0.$$ Also

$$\int_V (v^2 \psi - \bar{\mu}\, \mathrm{rot}\, \bar{v})\, dV = 0$$

was nur für $v^2 \psi = \bar{\mu}\, \mathrm{rot}\, \bar{v}$ möglich ist. Weil ist $\bar{v} \parallel \mathrm{rot}\, \bar{\mu}$ also $\bar{\mu} \perp \bar{v}$ und $\bar{\mu} \parallel \mathrm{rot}\, \bar{v}$ so daß die Rabilikäk auch durch $\bar{\mu} = v^2 \psi\, (\mathrm{rot}\, \bar{v})^{-1}$ ausgedrückt werden kann. Rabilikäk

in $\bar{v} \psi = \mathrm{rot}\, \bar{\mu}$ liefert somit das Differentialgesetz $\bar{v} \psi = \mathrm{rot}(v^2 \psi (\mathrm{rot}\, \bar{v})^{-1})$ in welchem ψ als Eigenfunktion durch die Evolution bestimmt wird. Wurde am 5.9.63 dieses Differentialgesetz schon zur Kürzung $(\mathrm{rot}\, \bar{v})^{-1} = f$ eingeführt, dann kann $\bar{v} \psi = \mathrm{rot}(v^2 \psi f) = v^2 \psi\, \mathrm{rot}\, f - \mathrm{grad}(v^2 \psi) \times f$ umgeformt werden. Division durch $v^2 \psi$ und Multiplikation mit $\bar{v}$ liefert dann $-\bar{v}\, \mathrm{grad}(\ln v^2 \psi) \times f = 1 - \bar{v}\, \mathrm{rot}\, f$ wenn $\frac{1}{v^2 \psi} \mathrm{grad}(v^2 \psi) = \mathrm{grad} \ln (v^2 \psi)$ berücksichtigt wird. Mit $\ln (v^2 \psi) = P$ wird dann nach dem Satz der Differentiation von Vektorprodukten im V_3, auch

$-\bar{v}\,\mathrm{grad}\,P \times \bar{f} = \mathrm{grad}\,P\,\bar{v} \times \bar{f}$,
also $\mathrm{grad}\,P = (\bar{v} \times \bar{f})^{-1}(1 - \bar{v}\,\mathrm{rot}\,\bar{f})$. Ferner $d\bar{s} = \bar{e}_1 \cdot dx_1 + \bar{e}_2\,dy + \bar{e}_3\,dz$ das Linienelement im $\bar{v}$, dann folgt $\mathrm{grad}\,P\,d\bar{s} = \frac{\bar{v} \times \bar{f}}{\bar{v}^3}(1 - \bar{v}\,\mathrm{rot}\,\bar{f})\,dt$ wegen $\bar{v} = \frac{d\bar{s}}{dt}$ und $\bar{f}$ konstant ist $\mathrm{grad}\,P \cdot d\bar{s} = dP = \frac{d(v^2\psi)}{\bar{v}^2\psi}$ also $d(v^2\psi) = v^2\psi \frac{\bar{v} \times \bar{f}}{\bar{v} \times \bar{f}}(1 - \bar{v}\,\mathrm{rot}\,\bar{f})\,dt$
$= \frac{\psi}{f}(1 - \bar{v}\,\mathrm{rot}\,\bar{f})\,\bar{v}(\bar{v} \times \bar{f})\,dt$
weil $\bar{v} \perp \bar{f}$ wegen $\bar{f} = (\mathrm{rot}\,\bar{v})^{-1}$ verläuft. In Hesse Bezeichnung ist aber $\bar{v}(\bar{v} \times \bar{f}) = \bar{v}\begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 & \dot{x}_3 \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix} =$
$= \begin{vmatrix} \dot{x}_1 & \dot{x}_2 & \dot{x}_3 \\ \dot{x}_1 & \dot{x}_2 & \dot{x}_3 \\ f_1 & f_2 & f_3 \end{vmatrix} = 0$ weil jede Determinante mit zwei identischen Reihen verschwindet. Einsetzen liefert $d(v^2\psi) = 0$, oder integriert $\psi \sim v^{-2}$, dem Kosinus des

Satzes 63 Problems.

$\psi(x_1, y_1, x_1, t)^3_1 = f - \eta \sim v^{-2}$,
$v^2 = \dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2$,
$f = \frac{r}{q}$, $\eta = \frac{Z}{q}$,
$x_{123} = \int \left((\dot{x}, \dot{y}, \frac{q}{2}) + (q_x, q_y, q_3) \right) d\,t$

Geltung β^{42}

gesetzt gebe Integrabel. Die Bivariante ψ ist nämlich die auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit q bezogene Zahl N der tatsächlich das Fortpflanzungsmedium kennzeichnenden Größen und drückt somit sowohl die Qualität als auch die Quantität des Doppelsystems aus. Wegen $\psi \sim v^{-2}$ nimmt ψ quadratisch mit wachsender Geschwindigkeit ab. Andererseits existiert aber der me-

Fläche Satz, womach zu einer
mit wachsender Ordinate =
zischen Differenzierung der
Ordinaten abfällt. Dies
bedeutet aber nur dann der
Konstanten der Integrierung
Integrale eine Parabel
die gewöhnliche Evolution stets
so vielfachen mehr Differen=
men höhere Ordnungszahlen =
stufen der einfachen ge=
schlossenen Wirkungsfläche
einstehen sofern $\delta z > 0$ ist
eine solche Bedingung ist
aber ordnungsmäßig erfüllt
denn selbst wenn der Extre=
dare Fall $x_1 = \frac{dx}{dz} = 0$ eintritt
so muß doch $\frac{d^2x}{dz^2} \neq 0$ bleiben
weil die Krümmung der Curve
Curvenstücke der Grenzkurve =

Länge ordnungsmäßig nicht verschwin=
den kann. Das Integral ordina=
mit die gewöhnliche Evolution stets
mischen Abständen von der ein=
geordneten Sphäre Kreislinie
Kreislinie über die Biosphäre
in die Mittlere Isosphäre
und die Isosphäre zu einer
konvexen Fläche, die sich aus
dem Prinzip des Schwerpunkts
Lesser ergibt.

Fortsetzung von Seite 296.

~~14.) Integrationsweise der Variationsaufgabe~~

14.) Integrationsweise und Lösung Fischer=
heit in

$$\delta \int_{+K,\ell}^{(\mu\pi)} y = 0, \qquad y^{(\varkappa\lambda)} = 0,$$

$$\delta^2 \int_{+K,\ell}^{(\mu,\pi)} y = 0, \qquad y^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\pi)K,\ell},$$

$$\delta \int \psi^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\pi)K,\ell} = 0, \qquad \delta q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\pi)K,\ell} = 0,$$

$$q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\pi)K,\ell} = \frac{\sum_{i=1}^{q} \beta^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\pi)K\ell}}{\sum_{\delta=1}^{q}} \left(\gamma^{ik}_{(\varkappa\lambda)} + R^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\pi)m} \gamma^{mk}_{(\varkappa\lambda)} \right)^{-1}$$

Fortsetzung +9 152

Kandis auf Di

doch ~~dass~~ dieses System noch keine explizite Aufspaltung des Metrikintegrals. Sind $(\varkappa,\lambda) \neq (\alpha,\beta)$ zwei verschiedene Kombinationen zur gleichen Basissignatur (μ,ν) dann folgt, wegen der Identität im Beweis $\sum q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \psi^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \mathfrak{F}\mu = \sum q^{(\alpha,\beta)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \psi^{(\alpha,\beta)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \mathfrak{F}\mu$ oder das Unverschwindensein der Feldkorrelatoren bei gleicher Basissignatur

$$q^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,e} = q^{(\alpha,\beta)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \psi^{(\alpha,\beta)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \psi^{(\varkappa,\lambda)-1}_{(\mu\nu)\kappa e}$$

152a

Gleichung ~~110a~~

nach Bildung des Metrikdifferentials! Ganz eindeutig mit diese Bezeichnung aber auch für $(\alpha,\beta) = (\mu,\nu)$ gelten, während $(\varkappa,\lambda) \neq (\mu,\nu)$ bleibt. ~~damit gilt~~

$$q^{(\varkappa,\lambda)}_{(\mu,\nu)\kappa,e} = q^{(\mu,\nu)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \psi^{(\mu\nu)}_{\kappa,e}\, (\psi^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,e})^{-1}$$

womit in $\mathfrak{F}\chi^{(\mu,\nu)}_{+\kappa,e} = 2\, q^{(\varkappa,\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \psi^{(\varkappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,e}\, \mathfrak{F}\mu$ übergeführt werden kann was $\mathfrak{F}q^{(\mu\nu)}_{+\kappa,e} = 2\, q^{(\mu,\nu)}_{(\mu\nu)\kappa e}\, \psi^{(\alpha\beta)}_{\kappa,e}\, \mathfrak{F}\mu$ liefert. Sind Koeffizienten- und Basissignaturindex, dann kann ein Kopplungstensor nur noch in der Form $\overset{\varkappa}{\mathcal{C}}{}^{(\mu,\nu)}_{\kappa e} = \overset{\varkappa}{E}{}^{(\mu,\nu)}_{\kappa e}$ existieren und $q^{(\mu,\nu)}_{(\mu,\nu)\kappa,e}$ bedeutet

$$q^{(\mu,\nu)}_{(\mu,\nu)\kappa,e} = \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa e}\left(\sum_{i\varsigma=1}^{q}\left(\gamma^{i\varsigma}_{(\mu\nu)} + Q^{(\mu\nu)i}_{(\mu\nu)m}\,\gamma^{m\varsigma}_{(\mu\nu)}\right)\right)^{-1} =$$

$$= \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa e}\left(\sum_{i\varsigma=1}^{q}\left(\gamma^{i\varsigma}_{(\mu\nu)} + \delta^{i}_{m}\,\gamma^{m\varsigma}_{(\mu\nu)}\right)\right)^{-1} =$$

$$= \tfrac{1}{2}\,\mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa e}\left(\sum_{i\varsigma=1}^{q}\gamma^{i\varsigma}_{(\mu\nu)}\right)^{-1} = \tfrac{1}{2}\,\mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa e}\left(\sum_{i\varsigma=1}^{q}\gamma^{i\varsigma}_{(\mu\nu)}\right)^{-1},$$

weil sich in der Summe die antisymmetrischen Anteile kompensieren. Hinzu liefert ~~das Metrikdifferential~~

$\mathcal{F}^{(\mu\nu)}_{+\kappa\ell} \sum_{s=1}^{q} \mathcal{G}^{\dot{\imath}s}_{(\mu\nu)+} - \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \psi^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \mathcal{F}\mu .$

16.9.63 Mit selbstgebildeten modifizierten Fundamentaltensor $[{}^{\nu}_{\mu}\ {}^{\mu}_{\nu}]_+ = [{}^{\mu}_{+}\ {}^{\nu}_{-}]_+$ angenommen, dann kann es keine Korrelation geben, sowohl der Kontravariations- als auch der Kovariationstensor $\overset{2}{Q}{}^{(\nu\mu)} = \overset{2}{E}$ wird. Für den Übergang $q^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,\ell} = q^{(\nu\mu)}_{(\mu\nu)\kappa,\ell} \psi^{(\nu\mu)}_{(\mu\nu)\kappa\ell} \left(\psi^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa\ell}\right)^{-1}$ gilt also für den Fundamentaltensor $q^{(\nu\mu)}_{(\mu\nu)\kappa,\ell} = \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \sum_{s=1}^{q} \left(\sum_{i=1}^{q} \left(\mathcal{G}^{\dot{s}\dot{\imath}}_{(\mu\nu)} + Q^{(\nu\mu)}_{(\mu\nu)m} \mathcal{G}^{\dot{m}\dot{\imath}}_{(\mu\nu)} \right) \right)^{-1} =$

$= \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \sum_{s=1}^{q} \left(\sum_{i=1}^{q} \left(\mathcal{G}^{\dot{s}\dot{\imath}}_{(\mu\nu)} + \delta^{\dot{s}}_{m} \mathcal{G}^{\dot{m}\dot{\imath}}_{(\mu\nu)} \right) \right)^{-1} =$

$= \tfrac{1}{2} \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \sum_{s=1}^{q} \left(\sum_{i=1}^{q} \mathcal{G}^{\dot{s}\dot{\imath}}_{(\mu\nu)} \right)^{-1} =$

$= \tfrac{1}{2} \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \sum_{s=1}^{q} \mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{s,s} \left(\sum_{i=1}^{q} \mathcal{G}^{\dot{s}\dot{\imath}}_{(\mu\nu)} \mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{s,s} \right)^{-1} =$

$= \tfrac{1}{2} \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \sum_{s=1}^{q} \mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{s,s} \left(\sum_{i=1}^{q} \delta^{\dot{\imath}}_{s} \right)^{-1} =$

$= \tfrac{1}{2} \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \sum_{s=1}^{q} \mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{s,s} = \tfrac{1}{2} \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa,\ell} \operatorname{Sp} \overset{2}{\mathcal{G}}{}^{(\mu\nu)},$

Während $\psi^{(\nu\mu)}_{(\mu\nu)\kappa,\ell} = \psi^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell}$ pseudo-Komposition werden muß, weil im Fundamentaltensor die Kontravariation zu $(+,-)$ transponiert ist. Einsetzen des Nachverhaltes in $\mathcal{F}\mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{+\kappa\ell} =$

$= 2\, q^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa,\ell} \psi^{(\kappa\lambda)}_{(\mu\nu)\kappa\ell} \mathcal{F}\mu =$

$= 2\, q^{(\nu,\mu)}_{(\mu\nu)\kappa,\ell} \psi^{(\mu\nu)}_{\kappa,\ell} \mathcal{F}\mu$ ergibt dann

$\mathcal{F}\mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{+\kappa\ell} = \operatorname{Sp} \overset{2}{\mathcal{G}}{}^{(\mu\nu)}_{(\mu\nu)\kappa,\ell} \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \psi^{(\mu\nu)}_{\kappa\ell} \mathcal{F}\mu ,$

Mischpolarisation mit $\delta_{\kappa,\ell}$ und Summation längs $1 \leq (\kappa,\ell) \leq q$ liefert dann wegen $\sum_{\kappa,\ell=1}^{q} \delta_{\kappa\ell} \mathcal{F}\mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{+\kappa\ell} =$

$= \mathcal{F} \sum_{\kappa,\ell=1}^{q} \delta_{\kappa\ell} \mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{+\kappa\ell} = \mathcal{F} \sum_{\ell=1}^{q} \mathcal{G}^{(\mu\nu)}_{+\ell\ell} =$

$= \mathcal{F} \operatorname{Sp} \overset{2}{\mathcal{G}}{}^{(\mu\nu)}$ weil $\operatorname{Sp} \overset{2}{\mathcal{G}}{}^{(\mu\nu)}_{(\mu\nu)} = 0$ ist

$\mathcal{F}$ in $\operatorname{Sp} \overset{2}{\mathcal{G}}{}^{(\mu\nu)} = \sum_{\ell=1}^{q} \mathcal{C}^{(\mu\nu)}_{\ell\ell} \psi^{(\mu\nu)}_{\ell\ell} \mathcal{F}\mu ,$

da hierbei $\psi^{(\mu\nu)}_{\ell\ell}$ pseudokompositiv ist, gilt im zweiten Approximationsbereich $\psi^{(\mu\nu)}_{\ell\ell} =$

$\mathcal{F}$ Anmerkung auf Umschlagdeckel

$= (E - e^{-\underline{\lambda}_{\ell,\ell}\mu})^{-1}$ mit $\underline{\lambda}_{\ell,\ell} = \lambda^{(\mu\nu)}_{\ell,\ell}$. Wird $\chi = \underline{\lambda}_{\ell,\ell}\mu$ und $\underline{a}_{\ell\ell} = a^{(\mu\nu)}_{\ell,\ell} = C^{(\mu\nu)}_{\ell,\ell}(\lambda^{(\mu\nu)}_{\ell,\ell})^{-1}$ verwendet, dann folgt $\psi^{(\mu\nu)}_{\ell\ell} f\mu = \underline{a}_{\ell\ell}(e^{\chi}-E)^{-1} f$

$= \underline{a}_{\ell\ell}(e^{\chi}-E)^{-1} f(e^{\chi}-E) = f\ln(e^{\chi}-E)^{\underline{a}_{\ell\ell}} = f\ln(e^{\underline{\lambda}_{\ell\ell}\mu}-E)^{\underline{a}_{\ell\ell}}$, was eingesetzt $f\,\mathrm{sp}\,{}^{2}\underline{\gamma}^{(\mu\nu)} = f\ln\prod_{\ell=1}^{q}(e^{\underline{\lambda}_{\ell\ell}\mu}-E)^{\underline{a}_{\ell\ell}}$ ergibt, nach Bildung des Integrals wird dann die Lösung beschrieben durch

$\mathrm{sp}\,{}^{2}\underline{\gamma}^{(\mu\nu)} = \underline{C}^{(\mu\nu)}\prod_{\ell=1}^{q}(e^{\underline{\lambda}_{\ell\ell}\mu}-E)^{\underline{a}_{\ell\ell}}$ mit $\underline{\lambda}_{\ell\ell} = \lambda^{(\mu\nu)}_{\ell\ell}$, $\underline{a}_{\ell,\ell} = a^{(\mu\nu)}_{\ell,\ell} = \mathrm{const}$

Gleichung 153/120

die Integration = Konstante ist. Diese entspricht der Lösung des symmetrischen

Fundamentalproblems Kosmos wegen $\prod_{\ell=1}^{q} A_\ell = |A_{\kappa\ell}\delta_{\kappa,\ell}|_q$ in die Fassung einer regulären Determinante gebracht werden, was die Integration von $e^{\chi} f\chi =$ $\mathrm{sp}\,{}^{2}\underline{\gamma}^{(\mu\nu)}$ gerecht wird. Zwar liefert $\underline{C}^{(\mu\nu)}$ gl 153/120 nicht die Elemente von $\hat{\gamma}$ explizit, wohl aber die Tensorspektren ihrer Elemente.

4) Symmetrik der Kondensationsformen

17.9.63

Die Elemente des Kollektivs $\hat{\gamma}$ werden einzeln ${}^{2}\underline{\gamma} = \mathrm{sp}\,{}^{2}\underline{\chi}^{(\mu)} \times {}^{2}\underline{\chi}^{(\nu)}$ durch die Vektoren ${}^{2}\underline{\chi}^{(\mu)}$ bestimmt, für welche nach gl IX, 1, die Abbildungsmatrizen ${}^{2}\underline{\chi}_{(1)}(\underline{Z}^{5}, \underline{Z}^{4})$ sowie ${}^{2}\underline{\chi}_{(2)}(\underline{Z}^{4})$ und ${}^{2}\underline{\chi}_{(3)}(\underline{Z}^{\chi})^{3}_{1}$ der symmetrischen Architektur =

suchen gelten. Diese Gitter-Ketten bestimmen wiederum die Elemente von je zwei der symmetrischen Fundamentalkondensatoren und Koppelungsfeldelektroden aufgebaut sind. Mit der Lösung I_{20}^{153} des symmetrischen Fundamentalproblems und der Matrix der Überkreuzelektroden kann nunmehr versucht werden, die symmetrischen Kapazitäten und Kopplungen innerhalb der hier möglichen Typen kompositorischer Kondensatoren und der nichtkompositorischen Kondensatoren zu beschreiben. Nach Cauer gibt es für die folgenden Kondensatorformen:

a) transfinite Selbstkondensatoren
(= Anmerkung ~~Bd. XV Seite 2~~ Bd. XI S. 129

bei einer Hermitte in $(S_{(4)}, S_{(3)}) \equiv \overline{{}^{2}K_{(1)}}$.

b) Zeitkondensatoren, bei einer Hermitte in $(S_{(4)}, S_{(3)}, S_{(2)}) \equiv (\overline{{}^{2}K_{(1)}}, \overline{{}^{2}K_{(2)}})$,

c) Raumkondensatoren, bei einer Hermitte in $(S_{(4)}, S_{(3)}, S_{(1)}) \equiv (\overline{{}^{2}K_{(1)}}, \overline{{}^{2}K_{(3)}})$.

d) Raumzeitkondensatoren bei einer Hermitte in $(S_{(4)})^{4} \equiv (\overline{{}^{2}K_{(4)}})^{3}$.

Zur Analyse dieser Kondensatorentypen läßt man eine der jeweiligen Kondensatorform angepaßte Siebkette auf den Korrelator derart wirken, daß anschließend die von ${}^{2}E$ verschiedenen Elemente als je nach dem Ergebnis der metrischen Siebkette zu analysieren.

Im einfachsten Fall der auch entkolloidisch als stetig (s. Bd. XI S. 129) bezeichnet werden kann, handelt es sich um transfinite Selbstkondensatoren

Lokaler Zocischer Zeitsprung von die Terme
das Kompositionsfeld Dach Hat = mehr müssen als lokale transfinite Terme jenseits des R_4 interpretiert werden welche im R_3 dann als Spaltkonus projiziert erscheinen, wenn ihre Weltlinien auf den R_{+4} projiziert zerfällt asymptotische Nullkurven sind. da sich die Hermitische mit im $\overline{{}^2X_{(1)}}$ aufspaltet und in den höheren Krümmungsdeterminanten $\nu = 2$ und $\nu = 3$ eine Antikommutative vorliegt, mit die auf $\hat{\mathcal{F}}$ wirkende Tiefbrache die Form $S(2,3) = S(2); S(3)$ haben das $S(2,3)$; $\hat{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} {}^2\mathcal{F}_{(1,1)} & {}^2\mathcal{F}'_{(1,2)} & {}^2\mathcal{F}'_{(1,3)} \\ {}^2\mathcal{F}'_{(2,1)} & \overline{{}^2E} & \overline{{}^2E} \\ {}^2\mathcal{F}'_{(3,1)} & \overline{{}^2E} & \overline{{}^2E} \end{pmatrix} =$

$= \begin{pmatrix} \overline{{}^2\mathcal{F}_{(1,1)}} & \overline{{}^2X_{(1)}} & \overline{{}^2X_{(1)}} \\ \overline{{}^2X_{(1)}} & \overline{{}^2E} & \overline{{}^2E} \\ \overline{{}^2X_{(1)}} & \overline{{}^2E} & \overline{{}^2E} \end{pmatrix} =$ ~~weil~~ $\hat{\mathcal{F}}_{(a)}$!

Fortsetzung Bd XV S. 1.

Anmerkung zu Seite 97

die Bestimmung von $C_{k,e}$ in Folgenden noch durchführen. Dies gilt für den Spezialfall imaginärer und komplexer Koordinatisierung in 3 und 4.

Anmerkung zu Seite 145

Zur Wahrung der Eindeutigkeit, statt $A_{k,e}$ immer $C_{k,e}$ verwenden.

Anmerkung zu Seite 157

Im metrischen Bereich $\tau > 0$ gelten in jedem Fall die beiden Komplementärtäten Eigenwertspektren der Gl. α nicht aber im Nahen Approximationsbereich $\tau \to 0$, dann hat Beispiel das reelle Spektrum als Folge von $\tau \to 0$ ausgezeichnete Quantisierungsbedingungen, die aber als Folge der Approximation diskontinuierlich sind. alle drei Koordinatisierungstypen $\lambda_{k,e} \sqrt{\varepsilon^2 - \mu^2}$ ergeben daher dem gleichen diskontinuierlichen Eigenwertspektrum $\beta_+^{(\pm)} = \pm \pi/2 (2n_+ + 1)$ ~~wobei~~ wobei im Bereich $\beta^{(\pm)} = \pm \lambda_{k,e} \cdot y$ die Einschränkung $\lambda_{k,e}^+ y \pm \frac{\pi}{2}(2n_+ + 1)$ erreicht wird. ~~wobei~~ $\beta_-^{(\pm)} = \pm \pi (2n_- + 1)$ desgleichen folgt ~~wobei~~ $\lambda_{k,e}^- \cdot y = 2\lambda_{k,e}^+ \cdot y$. da immer $S \perp R_3$ gilt folgt mit dem normierten Orthogonalsystem $\bar{e}_s \cdot \bar{e}_k = \delta_{s,k}$ nach Quadrieren $(\lambda_{k,e}^-)^2 \cdot (\varepsilon^2 - \mu^2) = (\lambda_{k,e}^-)^2 (\bar{\varepsilon} + i\bar{\mu})^2 = \pi^2 (\bar{\varepsilon}_s (2n_s + 1) + i \bar{\mu}_k (2n_k + 1))^2$ oder $\lambda_{k,e}^-(s,k) = \pi (2n_{s,k} + 1)$ und

analoge $\lambda_{n,k}^{+}(\varepsilon,k) \to \frac{\pi}{2}(2n_{\varepsilon,k}+1)$,
was nach Analogie Verschiedenheit für
beide Klassen von Eigenwerten
die obere Begrenzung ausmacht

$$r = \frac{2n_\varepsilon + 1}{2n_\varepsilon + 1} \cdot \varepsilon$$

Ferner 144

Lösung

Lösung $r < \varepsilon$ wird also auch
für die beiden Eigenwertreihen
n und n_ε die Bedingung $n < n_\varepsilon$
für die ganzen Zahlen gelten müssen.
Auch wird ausdrücklich Lösung u_n
so bestimmt sein, daß $r > 0$ posi-
tive Zahlen werden können, daß
dann für $r \to 0$ auch jeder
Eigenwert gegen Null und Lösung
$r < \varepsilon$ absolut $r > \varepsilon$ ein ab-
solutes Maximum bekommt.

Anmerkung zu Band IX Seite 191

23.9.63 Die Existenz der R_4 wurde nicht
für die Kreisringfläche und Kugelfläche
wesentlichen Gebrauch von R_4 gemacht
aber für die nächstliegenden Verallge-
meinerungen als Folge von $R_{\pm 2}$
und R_4 wenn Existenz für abnehmende
Folge der wesentlichen Bedingung für
$R_{\pm 4}$ oder R_4, sowie für R_6 auf diese
Weise zusammenhängende Kriterien zu suchen

Der Widerstand A soll nach Prof. Prandtl
empirisch Potenz der Reibungskoeffizienten
der Wechselwirkungen mehrerer Kugeln
Wechselwirkungen mehrerer Kugeln
Lösung beschreiben sollen
Reihenentwicklung der Lösung
Wechselwirkungen mehrerer Kugeln

Anmerkung zu Seite 370

Beim Formal $\sum a = \sum a_{s,s}$ der
Indices wird